1、以下是对城市污水处理厂污泥排放标准的描述，其中正确的是(　)

A.城市污水处理厂污泥应因地制宜采取经济合理的方法进行稳定处理

B.在厂内经稳定处理后的城市污水处理厂污泥宜进行脱水处理，其含水率宜大于 80%

C.处理后的城市污水处理厂污泥，用于农业时，不用符合任何标准用于其它方面时，应符合相应的有关现行规定

D.城市污水处理厂污泥处理后可以任意弃置

2、用稀酸稀碱处理后得到的粗纤维中不含有( )

A.纤维素

B.木质素

C.半纤维素

D.蛋白质

3、下列叙述中不正确的说法是（ ）

A.鉴别反应完成需要一定时间

B.鉴别反应不必考虑“量”的问题

C.鉴别反应需要有一定的专属性

D.鉴别反应需在一定条件下进行

E.温度对鉴别反应有影响

4、取 1.089g 煤样进行挥发份测定，经隔绝空气后进行加热，最终剩下 0.916g，则样品挥发份的产率为（ ）

A.15.9%

B.31.8%

C.63.6%

D.无法确定

5、某样品水分测定时，空铝合重 10.0000g，加入样品后重 12.0000g，经过一定时间的烘干后样品和铝合重 11.8000g，因此样品的水分含量是（ ）

A.90%

B.过程错了

C.10%

6、超高压锅炉饱和蒸汽受 Na2S04、Na3P04 和 Na2SiO3 污染的主要原因是()。

A.溶解携带

B.机械携带

C.机械携带小于溶解携带

D.溶解携带与机械携带之和

7、在滤纸上加 1 滴磷钼酸铵试剂，烘干，加 1 滴某食品的消化液，再加 1 滴磷钼酸铵试剂，如显兰色，示该样液中有(　)。

A.Hg2+

B.Sn2+

C.Pb2+

D.Cu2+

8、在煤堆上采样时，采样工具开口宽度应不小于煤最大粒度的（ ）倍。

A.1.5

B.2.5

C.3

D.2.5~3

9、生理情况下，嗜碱性粒细胞胞质内的颗粒的特征为（ ）。

A.量多，细小，分布均匀，布满胞质，浅紫红色

B.量多，粗大，圆而均匀，充满胞质，鲜橘红色

C.量多，细小，灰尘样紫红色颗粒，弥散分布于胞质中

D.量少，大小不等，分布不均，常覆盖核上，篮黑色

10、血粉的干燥方法及温度是影响其品质的最大因素，持续高温会造成大量（ ）的结合或失去活性，所以氨基酸的利用率是判断其品质好坏的重要指标。

A.氨基酸

B.蛋白质

C.脂肪酸

D.维生素

11、测定饲料中氟含量要求每个试样取两个平行样品进行测定，以其（ ）作为结果。

A.算术平均值

B.平方差

C.标准偏差

D.变异系数

12、　土壤是微生物污染食品的主要来源　其中微生物种类很多　但以( )为主　放线菌次之。

A.细菌

B.真菌

C.病毒

D.螺旋体

13、新饲料原料及产品的成分分析不包括下列那一项：(　　)。

A.水分

B.细菌总数

C.氨基酸

D.粗脂肪

14、饲料级磷酸氢钙的氟的要求是（　）。

A.≤0.15%

B.≤0.16%

C.≤0.17%

D.≤0.18%

15、凯氏定氮法粗蛋白测定所用的试剂有(　)

A.浓硫酸

B.磷酸

C.高氯酸

D.硝酸

16、《中国药典》采用高效液相色谱法测定含量的药物是（ ）

A.地西泮

B.硝苯地平

C.盐酸氯丙嗪注射液

D.左氧氟沙星

17、在某离子鉴定时，怀疑所用蒸馏水含有待检离子，此时应（ ）

A.另选鉴定方法

B.进行对照试验

C.改变溶液酸

D.进行空白试验

18、2，3-二氨基萘荧光法测定饲料中硒含量所用到的硒标准工作液浓度为( )。

A.0.2μg/mL

B.0.6μg/mL

C.0.9μg/mL

D.1.0μg/mL

19、用尿比重计测定尿液密度时应在（ ）的室温中进行。

A.15℃

B.10℃

C.5℃

D.4℃

20、颗粒饲料粉化率是指颗粒饲料在特定条件下所产生的粉末重量占其总重量的（ ）。

A.Kg/Kg

B.mg/Kg

C.ppm

D.百分比

21、需检查水杨酸的药物是

A.肾上腺素

B.氢化可的松

C.硫酸奎尼丁

D.对乙酰氨基酚

E.阿司匹林

22、下列不是碳水化合物营养功能的有（ ）。

A.机体的结构物质

B.机体的更新物质

C.机体的营养贮备物质

D.机体能量来源物质

23、元素周期律是指元素性质随着（ ）的递增呈周期性变化。

A.电子层数

B.核电荷数

C.原子核最外层电子数

D.质子数和中子数

24、下列数字中，有三位有效数字的是( )

A.pH 值为 4.30

B.滴定管内溶液消耗体积为 5.40mL

C.分析天平称量 5.3200g

D.台称称量 0.50g

25、澄清池正常取样点一般设在( )区。

A.混合;

B.反应;

C.进水;

D.出水。

26、对维生素 A/D3 微粒进行皂化反应需在( )下进行。

A.酸性

B.碱性

C.中性

D.不确定

27、饲料中粗蛋白的测定方法不适用于(　　)

A.浓缩饲料

B.配合饲料

C.维生素预饲料

D.大豆粕

28、引起家畜病理性红细胞增多的因素不包括（ ）。

A.呕吐

B.急性胃肠炎

C.腹泻

D.长期在高原地区饲养

29、若变量 x、y，存在严格的线性关系，则相关系数(　)。

A.等于 1

B.等于-1

C.少于 1

D.无法确定

30、高锰酸钾法测定饲料中的钙时，空白试验是用（ ），用高锰酸钾溶液滴定，记录消耗的高锰酸钾标准溶液的体积。

A.蒸馏水

B.试样溶液

C.一盒滤纸

D.一张滤纸

31、魏氏法测定血沉使用的抗凝剂是（ ）。

A.双草酸盐

B.枸橼酸钠

C.肝素

D.EDTA-K2

32、下面（ ）是用来测定饲料中粗灰分的(550℃灼烧法)。

A.分光光度汁

B.滴定管

C.烧杯

D.高温炉

33、重量法测定铁时，过滤时选用的滤纸是( )

A.快速

B.慢速

C.中速

D.无所谓

34、关于滴定管的使用，说法不正确的是（ ）。

A.有油污的酸式滴定管，需用烙酸洗液洗涤。

B.将碱式滴定管橡皮向上弯曲 90°，捏玻璃珠使溶液从玻璃珠和橡皮管之间的间隙缝中流出

以排出管下的气泡

C.使用碱式滴定管时，应捏玻璃珠的下半部

D.碱式滴定管中的玻璃珠外径应比橡皮管内径大些

35、粗脂肪测定过程中，提取后烘干称量时精确至（ ）

A.0.1mg

B.1mg

C.10mg

D.0.1g

36、使用甘汞电极时（ ）

A.把橡皮帽拔出，将其浸没在样液中

B.不要把橡皮帽拔出，将其浸没在样液中

C.把橡皮帽拔出，电极浸入样液时使电极内的溶液液面高于被测样液的液面

D.橡皮帽拔出后，再将陶瓷砂芯拨出，浸入样液中

37、下列添加剂中(　)属于营养性添加剂。

A.饲料级苏氨酸

B.饲料级抗氧化剂(乙氧基喹啉)

C.柠檬黄

D.粘合剂

38、烟煤黏结指数的测定中，压块的质量为（ ）

A.110～115g

B.100～115g

C.110～120g

D.105～115g

39、下列哪种物质不是酮体（ ）。

A.乙酰乙酸

B.β-羟丁酸

C.丙酮

D.丙酸

40、下列各组物质按等物质的量混合配成溶液后，（)具有 pH 缓冲能力。

A.NH3?H2O 和 NaOH

B.NH3?H2O 和 NH4Cl

C.NH3?H2O 和 HAc

D.NaOH 和 NH4Cl

41、天平内较适宜放置的干燥剂是（ ）。

A.变色硅胶

B.氯化钙

C.浓硫酸

D.以上三种都不理想

42、样品水分测定时，盛有样品的铝合应（ ）

A.将铝合的盖完全打开，便于水分的蒸发

B.将铝合的盖打开少许，以防杂物落入其中

C.将铝合的盖盖好，便于水分的蒸发

43、饲料粗脂肪含量测定是在（ ）中用乙醚提取试样的。

A.干燥器

B.振荡器

C.搅拌器

D.索氏脂肪提取器

44、酸洗过程中因有 H2 产生，应在酸洗现场挂( )牌子。

A.严禁入内;

B.严禁触摸;

C.严禁烟火;

D.禁止通行。

45、根据误差产生的原因，分析测试误差可分为（ ）。

A.系统误差

B.偶然误差

C.系统误差、偶然误差

D.系统误差、偶然误差、过失误差、极差

46、在碘化钾含量测定的反应中参与反应的离子为（ ）。

A.氯离子

B.碘离子

C.钾离子

D.钠离子

47、下列哪种煤种黏结性最好的是（ ）

A.长焰煤

B.肥煤

C.褐煤

D.无烟煤

48、在标准溶液的配制与标定时所用试剂的纯度应在（ ）以上。

A.实验试剂

B.分析纯

C.化学纯

D.优级纯

49、需要使用全血检测的标本，应使用含有什么成分的真空采血管（ ）。

A.防腐剂

B.溶血剂

C.促凝剂

D.抗凝剂

50、 少量氯化物对人体是没有毒害作用的，药典规定检查氯化物杂质主要是因为它（ ）

A.影响药物的测定的准确度

B.影响药物的测定的选择性

C.影响药物的测定的灵敏度

D.影响药物的纯度水平

E.以上都不对。

51、精密度是指在相同条件下，几次重复测定结果彼此相符合的程度，用（ ）偏差表示。

A.相对误差

B.偏差

C.误差

D.标准偏差

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/665010014241011120