

2024 湖南省零陵区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库带答案（考试直接用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 说明书中没有儿童用药剂量时，可以根据儿科用药换算方法进行计算。下列计算方法错误的是（）

- A: 儿童剂量=成人剂量 $\times$ 儿童体表面积(m^2)/1.73(m^2)
- B: Fried 公式, 婴儿药物剂量=月龄 $\times$ 成人剂量/150
- C: 小儿药物剂量=(年龄 $\times$ 成人剂量)/小儿体表面积(m^2)
- D: 儿童剂量=成人剂量 $\times$ 小儿体重(kg)/70

答案：C

2. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 血液系统疾病
- B: 肌病
- C: 胃肠道反应
- D: 神经系统疾病

答案：B

3. 可告知患者采取如穿戴宽松的鞋袜和手套，避免反复揉搓手脚，避免长时间阳光直射等措施预防药物不良反应的是

- A: 奥沙利铂
- B: 卡培他滨
- C: 顺铂
- D: 卡铂

答案：B

4. 静脉滴注速度过快或口服剂量过大，可引起急性肾衰竭的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 利巴韦林
- C: 脂肪乳
- D: 人促红素

答案：A

5. 下列临床试验分期中，上市后药品临床评价阶段属于

- A: III期临床试验
- B: IIa 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: IV期临床试验

答案：D

6. 下列药品中，不属于不宜选用葡萄糖注射液溶解的药品是

- A: 苯妥英钠
- B: 青霉素
- C: 阿昔洛韦
- D: 红霉素

答案：D

7. (有关物质中毒的特效解毒剂)，香豆素类灭鼠药中毒的特效解毒剂是

- A: 维生素 K
- B: 烯丙吗啡
- C: 乙酰胺

D: 氯解磷定

答案: A

8. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 膀胱炎

B: 急性肾盂肾炎

C: 压力性尿失禁

D: 急迫性尿失禁

答案: B

9. 伪膜性肠炎

A: 白细胞增多

B: 真菌

C: 红细胞

D: 上皮细胞

答案: D

10. 较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药物是

A: 比沙可啶

B: 环孢素

C: 布洛芬

D: 酮康环孢素唑

答案: D

11. 可作为轻度痤疮治疗单独一线用药的是

A: 水杨酸软膏

- B: 夫西地酸乳膏
- C: 维 A 酸凝胶
- D: 过氧化苯甲酰凝胶

答案: C

12. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15\times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 首选针对革兰氏阳性菌的药物
- B: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物
- C: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素
- D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案: A

13. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间是

- A: 1~3 日
- B: 3~5 日
- C: 10 日
- D: 3~7 日

答案: D

14. 药品临床评价具有"公正性和科学性"是基于

- A: 在多学科新进展的基础上进行
- B: 应用医药学理论和实践的前沿知识
- C: 药品临床评价重在实践
- D: 药品临床评价采用多中心、大样本、随机、双盲、对照的方法，经数理统计得出结论

答案: D

15. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 胺碘酮？
- B: 普罗帕酮？
- C: 普萘洛尔？
- D: 西地兰？

答案：D

16. 可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

- A: 非甾体抗炎药
- B: 吸入型糖皮质激素
- C: 短效 β_2 -受体激动剂
- D: β -受体阻断剂

答案：C

17. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度中度贫血为

- A: 60~90g / L
- B: 30~60g / L
- C: 120~160g / L
- D: 90~120g / L

答案：A

18. 血糖正常、尿葡萄糖阳性可以提示患者可能

- A: 伴甲状腺功能亢进
- B: 伴肾性肾小球肾炎
- C: 伴活动性指端肥大症

D: 伴心肌梗死

答案: B

19. 服用环孢素不宜同食

A: 食醋

B: 葡萄柚汁

C: 咖啡

D: 高蛋白食物

答案: B

20. 不宜咽或吞下所用药品；用药后不宜马上吃食或饮水的是

A: 咀嚼片

B: 含漱剂

C: 阴道栓剂

D: 舌下片

答案: B

21. (2018 年真题) 患者, 女, 53 岁, 冠心病史 2 年, 目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊, 临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片 40mgqdpo 文拉法辛缓释片 150mgqdpo, 谷维素片 10mg tidpo 治疗, 患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是 ()

A: 奥美拉唑肠溶片

B: 文拉法辛缓释片

C: 硝酸异山梨酯片

D: 阿托伐他汀钙片

答案: B

22. 能使鼻黏膜血管收缩，减轻充血，缓解鼻塞

- A: 孟鲁司特钠片
- B: 氯雷他定片
- C: 泼尼松片
- D: 萘甲唑林滴鼻液

答案：D

23. （2015 年真题）患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 的药物是（）

- 。
- A: 双氯芬酸
- B: 布洛芬
- C: 吲哚美辛
- D: 塞来昔布

答案：D

24. 放射性静脉造影剂属于

- A: E 级高危药品
- B: D 级高危药品
- C: C 级高危药品
- D: B 级高危药品

答案：D

25. 当药品存在安全隐患，需要进行召回时，决定召回药品的名称、规格、生产商、召回范围、召回级别、主要执行者等事宜的相关人员应该是

- A: 业务院长
- B: 药剂科负责人

C: 药品质量安全管理小组成员

D: 质量部人员

答案: C

26. 通风急性发作期应禁用的药物是:

A: 秋水仙碱

B: 别嘌醇

C: 碳酸氢钠

D: 布洛芬

答案: B

27. 药物代谢酶系不成熟或分泌不足, 2 周后肝功能趋于完备可影响

A: 药物代谢

B: 药物中毒

C: 药物排泄

D: 药物吸收

答案: A

28. 药源性疾病是由药物诱发的疾病, 是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

A: 肝硬化患者应用利多卡因, 可引起严重中枢神经系统疾病

B: 慢乙酰化者服用异烟肼后, 其半衰期延长至 2~4.5h

C: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮, 其药理效应增强

D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案: A

29. 使用硫酸亚铁片预防缺铁性贫血，元素铁的预防量是

- A: 60mgbid
- B: 60mgqd
- C: 100mg/次
- D: 60mg tid

答案：B

30. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是以控制关节炎症(红肿、疼痛)为目的，尽早使用抗炎药

- A: 痛风性肾病治疗期
- B: 急性发作期
- C: 首次发作期
- D: 发作间歇期

答案：B

31. 患者,男,65 岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是 ()

- A: 羧甲司坦
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 氨溴索
- D: 右美沙芬

答案：D

32. (2017 年真题) 服用后可引起多尿驾驶员应慎用的药物是 ()

- A: 阿司匹林
- B: 氯苯那敏
- C: 吲达帕胺
- D: 胰酶

答案：C

33. 患者，男，52 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

- A: 雷米普利
- B: 左旋氨氯地平
- C: 氟伐他汀
- D: 比索洛尔

答案：A

34. “发现并确认‘仙牛健骨颗粒’Ⅲ期临床试验过程中连续发生严重不良事件，即暂停其新药试验”显示药物警戒的作用是

- A: 发现药品质量问题
- B: 药品上市后风险评估
- C: 药品上市前风险评估
- D: 发现与规避假、劣药品流入市场

答案：C

35. 在人体血液白细胞群体中，中性粒细胞的正常参考范围是

- A: 0.01~0.05
- B: 0.20~0.40
- C: 0.03~0.08
- D: 0.50~0.70

答案：D

36. 吩噻嗪类抗精神病药中毒癫痫发作时给予（）

- A: 苯妥英钠
- B: 阿托品
- C: 去甲肾上腺素

D: 有机硫类

答案：A

37. 癫痫的药物治疗癫痫强直一阵挛性发作首选

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 丙戊酸钠

D: 拉莫三嗪

答案：A

38. 解救汞中毒的是（）

A: 盐酸戊乙奎醚

B: 二巯丙醇

C: 依地酸钙钠

D: 单价抗毒血清

答案：B

39. 单纯餐后血糖高，而空腹和餐前血糖不高的 2 型糖尿病患者首选

A: 阿卡波糖

B: 格列喹酮

C: 二甲双胍

D: 比格列酮

答案：A

40. 对皮脂腺分泌过多所致的寻常型痤疮首选

A: 0.1%阿达帕林凝胶

B: 红霉素-过氧苯甲酰凝胶

C: 10%过氧苯甲酰凝胶

D: 0.03%维 A 酸乳膏剂

答案: C

41. 评价房颤患者抗凝出血风险的方法是

A: HAS-BLED 评分

B: FEV1 占预计值%

C: CTP 分级

D: CHA₂DS₂-VASc 评分

答案: A

42. 具有降低 TC、LDL-C 和 TG，升高 HDL-C 的作用的是 ()

A: 依折麦布

B: 烟酸类

C: 他汀类

D: 普罗布考

答案: B

43. 急性痛风性关节炎期首选药物是

A: 苯溴马隆

B: 秋水仙碱

C: 碳酸氢钠

D: 别嘌醇

答案: B

44. 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是 ()

A: 伪麻黄碱

B: 氯苯那敏

C: 对乙酰氨基酚

D: 布洛芬

答案: C

45. 患者，男，40 岁，因饮酒 10 个小时后突然出现右足第一跖趾关节剧痛就诊。查体：患处肿胀、发红，不能穿鞋；触压患处疼痛加重。实验室检查显示血尿酸 $520 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为痛风急性发作。

A: 塞米昔布

B: 秋水仙碱

C: 别嘌醇

D: 泼尼松

答案: B

46. 轻微的反应或疾病、症状不发展、一般无需治疗，应判为

A: 轻度

B: 重度

C: 中度

D: 弱轻度

答案: A

47. 可以杀伤结核分枝杆菌，最大限度地降低传染性的早期杀菌活性药是

A: 莫西沙星

B: 氧氟沙星

C: 乙胺丁醇

D: 氨苄西林

答案: C

48. 再感染

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- B: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- C: 宜选用毒性小的抗菌药物
- D: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>105\text{cfu/ml}$

答案：B

49. 淡红色处方作为

- A: 普通处方
- B: 急诊处方
- C: 儿科处方
- D: 麻醉药品和第一类精神药品处方

答案：D

50. 晚期肝硬化时，哌替啶和普萘洛尔生物利用度增加 2 倍，是指

- A: 药物排泄
- B: 药物分布
- C: 药物吸收
- D: 药物代谢

答案：C

51. 属于非麻醉性强效镇咳药，起效迅速，抑制外周传入神经，也可部分抑制咳嗽中枢的药物的是

- A: 羧甲司坦
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案: C

52. 一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

A: 催眠药中毒

B: 乙醇中毒

C: 汞中毒

D: 铅中毒

答案: B

53. 归属"用药记录"项下的是

A: 临床诊断

B: 医保和费用支付情况

C: 联合用药

D: 主要实验室检查数据

答案: C

54. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D2 受体的促胃肠动力药是

A: 昂丹司琼

B: 莫沙必利

C: 多潘立酮

D: 甲氧氯普胺

答案: C

55. 治疗腹痛较重或反复呕吐性腹泻宜选用的药物是

A: 庆大霉素

B: 山莨菪碱

C: 双歧杆菌

D: 泛昔洛韦

答案: B

56. 患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白(HbA)9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 格列美脲片2mgtidpo

B: 罗格列酮片2mgbidpo

C: 甲钴胺片0.5mgtidpo

D: 二甲双胍片0.5gtidpo

答案: A

57. 由服用利尿剂所引起的尿失禁属于 ()

A: 真性尿失禁

B: 急性、可逆性/暂时性尿失禁

C: 压力性尿失禁

D: 急迫性尿失禁

答案: B

58. 怕热的药品

A: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

B: 根据不同性质要求,分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

C: 可贮存于严密的药箱内

D: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

答案: B

59. 依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选（）。

- A: 吗啡
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 苯丙哌林

答案：C

60. 对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用

- A: 甲磺酸去铁胺
- B: 富马酸亚铁
- C: 维生素 K1
- D: 叶酸+维生素 B12

答案：D

61. 患者，男，75岁，有高血压，长期服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片（150mg/12.5mg）1片 qd，血压控制平稳。因排尿困难、尿频和尿不尽感就诊，诊断为良性前列腺增生。给予非那雄胺片 5mgqd，特拉唑嗪片 5mgqd。患者用药后出现头晕，前来咨询。

- A: 非那雄胺可引起直立性低血压，头晕可能与此相关
- B: 建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状
- C: 头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解
- D: 非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药

答案：B

62. 巴比妥类使口服避孕药效果降低属于（）。

- A: 酶诱导作用
- B: 作用于同一受体的拮抗作用
- C: 排泄

D: 与血浆蛋白结合

答案：A

63. 炎症性痤疮的首选外用抗菌药物是

A: 维 A 酸凝胶

B: 夫西地酸乳膏

C: 水杨酸软膏

D: 过氧化苯甲酰凝胶

答案：D

64. 连续使用不应超过 10 日，并在使用期间定期测量眼压的滴眼液是

A: 阿昔洛韦滴眼液

B: 硫酸锌滴眼液

C: 磺胺醋酰钠滴眼液

D: 泼尼松滴眼液

答案：D

65. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 15 万—30 万 IU

B: 10 万—15 万 IU

C: 30 万—45 万 IU

D: 30 万~60 万 IU

答案：A

66. 患者，女，69 岁，近一个月出现入睡困难，白天有头昏、疲倦等不适感，尝试非药物治疗无改善，推荐的药物治疗方案是()

- A: 苯巴比妥 100mgpoqn
- B: 地西泮 5mgpoqn
- C: 唑吡坦 5mgpoqn
- D: 氯硝西泮 2mgpoqn

答案：C

67. 给予非甾体解热镇痛药的依据是

- A: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- B: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- C: 有助于合成红细胞
- D: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

答案：D

68. 可卡因属于

- A: 精神刺激剂
- B: 麻醉药品
- C: 利尿剂
- D: β 受体阻断剂

答案：A

69. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μmol / L(正常参考范围 45~84 μmol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 减少脂肪摄入
- B: 控制体重
- C: 不必限盐
- D: 适当运动

答案：C

70. (2017 年真题) 配制青霉素输液的适宜溶媒是 ()

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 低分子右旋糖酐注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

71. 适合睡前服用的是

- A: 奥利司他
- B: 多潘立酮
- C: 氟伐他汀
- D: 吲哚美辛

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

72. 患者通过电话、网络或信件询问是

- A: 被动方式
- B: 质问方式
- C: 主动方式
- D: 指令方式

答案：A

73. 对由甲氨蝶呤所引发的贫血者，宜应用的药物是

- A: 烟酸
- B: 维生素 B12
- C: 富马酸亚铁
- D: 叶酸+维生素 B12

答案：D

74. 在体内有抗凝血作用、体外没有抗凝血作用的药物是

- A: 肝素
- B: 噻氯匹定
- C: 华法林
- D: 链激酶

答案：C

75. 一般不会改变血红蛋白正常值的药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 维生素 K
- C: 维生素 B
- D: 伯氨喹

答案：C

76. (儿童用药特点)针对儿童最方便、最安全、最经济的给药途径

- A: 静脉给药
- B: 局部给药
- C: 皮下注射
- D: 口服给药

答案：D

77. #NAME?

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

78. 黏膜保护剂

A: 铝碳酸镁

B: 多潘立酮

C: 埃索美拉唑

D: 法莫替丁

答案：A

79. 格列本脲

A: 宜清晨服用

B: 宜餐后服用

C: 宜睡前服用

D: 宜餐前服用

答案：D

80. 患者，男，60岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降6个月，BMI值29.0。空腹血糖10.2mmol/L，餐后2小时血糖16.7mmol/L，血压115/80mmHg。

A: 磺酰脲类降糖药

B: α -葡萄糖苷酶抑制剂

C: 双胍类降糖药

D: 胰岛素

答案: C

81. 由美国卫生系统药师协会出版的《Handbook on Injectable Drug》袖珍本的中译本是

A: 《Trissel 注射药物手册》

B: 《药品注射剂使用指南》

C: 《Trissel 混合组分的稳定性》

D: 《注射药物手册》

答案: B

82. 适宜睡前服用，用于抑制“酸突破现象”的抑酸剂是

A: 法莫替丁

B: 硫糖铝

C: 铝碳酸镁

D: 乳酸菌素

答案: A

83. 运动员禁用药物中，利尿剂产生的危害是

A: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

B: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

C: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

D: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

答案: B

84. 急性结膜炎患者禁用的药品是

- A: 醋酸可的松滴眼剂
- B: 利福平滴眼剂
- C: 硫酸锌滴眼剂
- D: 酞丁安滴眼剂

答案：C

85. 在葡萄糖注射液中极易裂解的是

- A: 红霉素
- B: 苯妥英钠
- C: 青霉素
- D: 氯化钾

答案：C

86. 患者，男，72岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μg bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100pgpm 吸入，氨氯地平片 5mgqd 口服及硝酸甘油片 0.5mgpm 舌下含服。

- A: 缬沙坦
- B: 普萘洛尔
- C: 维拉帕米
- D: 非洛地平

答案：A

87. (2017 年真题) 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法错误的是 ()

- A: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料
- B: 禁食富含碘的食物

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者宜选甲巯咪唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/665121101120012033>