

# 2025 年高考地理满分高分答题攻略（超强）

## 一. 综合题分析方法和技巧

### 1 五步操作程序:

---

(1) 细审“题干”。抓住“关键词”和“修饰词”、“限定词”

描述	详细描写；先总体大概描述、后具体细化描写；不必解释原因和理由
简述	概要描写；从各个具体要素大概描述；不必细化描写；不必解释原因和理由
说出	相当于“罗列”要素；各要点之间是并列关系；不必解释原因和理由
阐述	“分析+表达”；既要有原因，又要有结果和观点； 语言格式：因为…所以（导致）..
例析	“实例+分析”；一定要结合具体实例，从这个例子分析其具体做法
评价	“有利+不利”；语言格式：有利：1、2、3..。不利：1、2、3..
分析	“有利及其原因+不利及其原因”； 语言格式：有利：1、因为..所以（导致）..2..。不利：1、因为..所以（导致）..2..
比拟	两个地理事物都要答复。语言格式：因为 A.., 以 A 比 B...

意义	正面意义+负面意义；本地区（事物）意义+其它地区（事物）意义
影响	正面影响+负面影响；本地区（事物）影响+其它地区（事物）影响；现在的影响+将来的可能影响；自然环境影响+社会经济影响+生态环境影响
措施	工程措施（技术措施）+生物措施+管理措施；当地措施+合作措施
判断	理由+结论。语言格式：正确（合理）或错误（不合理）、因为..所以..
变化	表达“提高、上升、增加、下降、先降后升、先升后降”思路
关系	思路：A 导致 B 导致 C..。表达“因果关系、前后关系、时间关系、主次关系”
结构	所占比例；主要组成；适当评价其合理性

（2）列出“模板”。（见下面的常见模板）

（3）仔细“筛选”。根据限定词筛选；根据所在地区筛选；根据地理事物特性筛选；根据题目提供的材料筛选。

（4）酝酿“语言”。“先自然，后社会经济”；“先主要，后次要”；“先自身原因，后其它原因”；（先主后次、先上后下、先内后外）

(5) 书写答案。“地理语言（防止大白话）”、“套装语言（不用自造语句）”、“逻辑语言（不得互相矛盾）”、“精炼语言（不要同样意思，反复罗嗦诉说）”、“一语中的（语言不绕弯子）”。

## 二. 综合题的常见答题模板

### ☆地理位置分析：绝对位置+相对位置

1. 海陆位置；2. 经纬度位置；3. 大洲交界或国界位置；4. 交通位置（重要海峡、铁路枢纽、港口）；5. 经济和军事位置；6. 相邻地区（经济兴旺区）

### ☆描述某地的地形特点：

①以什么地形为主（五大类地形）②地势起伏（大、小）③地势特征（哪里高哪里低）。

### ☆描述某地的地势特点：

哪里高，哪里低。或地势起伏大或山河相间，山高谷深。

### ☆某地地形分布特点：

描述哪个方位是什么地形即可。（注意和第1种问题的区别）

### ☆判断地形地势的依据：

①等高线的分布②河流流向③水系的形状（向心状即盆地，放射状即山地）

### ☆我国一些地形区的地貌（地形）特征：

①青藏高原：雪山连绵，冰川广布 ②云贵高原：崎岖不平 ③内蒙古高原：地面坦荡 ④黄土高原：支离破碎、千沟万壑。⑤横断山区：山高谷深，山河相间……

### ☆分析某区域地形地貌成因：

（1）流水的侵蚀：黄土高原地貌、河流峡谷（V形谷如三峡）、瀑布、丹霞地貌（广东）。

（2）水对可溶性岩石（石灰岩）的溶蚀和侵蚀作用：喀斯特地貌（桂、贵、云）。

（3）流水的冲积（堆积或沉积）作用：平原、冲积扇和三角洲和崇明岛（冲积岛）

（4）风力的侵蚀作用：风蚀蘑菇、风蚀洼地、风蚀城堡、戈壁、雅丹地貌（新疆）。

（5）风力的沉积作用：沙丘（沙漠）、黄土高原。

（6）冰川的侵蚀作用：挪威的峡湾（U形谷、冰斗、角峰）和五大湖，欧洲的许多湖泊（千湖之国芬兰的湖泊）。欧洲的地形

（7）地壳断裂下陷，形成地堑：渭河谷地、汾河谷地、鄱阳湖、贝加尔湖、坦葛尼喀湖、死海、台湾海峡等。

(8) 岩层断裂上升（块状山）：泰山、庐山、华山等。

(9) 板块相撞：高大山脉（喜马拉雅山脉等）和高大年轻的高原（如青藏高原）、海沟、地震、太平洋中的岛弧。

(10) 板块张裂，地壳下陷：东非大裂谷、红海、死海、约旦河谷、大西洋。

(11) 由珊瑚的遗体堆积而成（珊瑚岛）：马尔代夫、南海诸岛、太平洋诸多岛屿、大堡礁。

(12) 由火山的喷发物堆积而成（火山岛）：夏威夷群岛、小安的列斯群岛等。

(13) 背斜成谷：背斜顶部受张力作用，岩层易被侵蚀。

(14) 向斜成山：向斜槽部的岩层受挤压，坚实不易被侵蚀。

(15) 渭河平原的成因：地壳断裂下陷，流水的沉积作用。

### ☆影响气温的因素：

1. 纬度上下（决定因素）。具体影响：太阳高度、昼长、太阳辐射量、气温日较差，年较差（低纬度地区气温日、年较差小于高纬度地区）

2. 地形地势。阴坡阳坡，海拔高度

3. 海陆位置：距海远近，大陆性海洋性

4. 洋流。（暖流：增温增湿；寒流：降温减湿）

5. 大气环流和天气状况。（云雨多的地方气温日、年较差小于云雨少的地方）

6. 下垫面：地面反射率（冰雪反射率大，气温低）；绿地气温日、年较差小于裸地

7. 人类活动：热岛效应、温室效应等

### ☆气温日较差与年较差规律：

气温日较差，是一天中气温最高值与最低值之差。其大小与纬度、季节、天气情况及地表性质等有关。

①. 气温日较差与纬度的关系：纬度越高，日较差越小。

原因：纬度越高，太阳高度的日变化越小。

②. 气温日较差与天气的关系：阴天比晴天日较差小。

③. 气温日较差与海陆的关系：沿海比内陆日较差小。

④. 气温日较差与海拔的关系：山顶的气温日较差比山下平原小；高原山地地区，则海拔越高，日较差越大。

气温年较差：一年中月平均气温的最高值和最低值之差，称为气温年较差，或称气温年振幅。其大小与纬度、海陆分布等因素有关。

①. 气温年较差与纬度的关系：纬度越高，年较差越大。

原因：纬度越高正午太阳高度的年变化越大，昼夜长短的年变化越大，因而气温的年较差越大；低纬相反。

②. 气温年较差与海陆的关系：离海越远，年较差越大。

原因：陆地比海洋的热容量小，夏季升温快，温度比海洋高；冬季降温快，温度比海洋低，因而气温年较差比海洋大。沿海受海洋的影响较大，比内陆年较差小。

③. 地形：高地小于凹地、谷地，海拔愈高年较差愈小。

如青藏高原气温年较差与我国同纬度平原、盆地比拟，气温年较差小。这是因为：青藏高原属于中低纬的大高原，夏季因其海拔高，气温不太高；冬季因纬度低，地势高，寒冷的冬季风影响弱，气温不太低。

④. 天气：晴天多的地区气温年较差大于阴雨天多的地区，如新疆比同纬度的沿海地区的年较差大。

⑤. 植被：植被覆盖率高的地区的年较差比裸地的年较差小。

### ☆降水多少的影响因素分析。

①大气环流因素——决定降水多少的因素

季风控制区夏秋季多，冬春季少；副高控制区降水稀少，如伏旱天气、热带沙漠气候区、地中海气候的夏干；赤道低压带控制区

降水丰沛；西风带降水多，信风带降水少。（要注意风的来向：迎岸风往往多雨；离岸风则少雨）

②天气系统因素——低压中心和低压槽部位降水多，高压中心和高压脊部位降水少；锋面控制降水多，如梅雨、贵阳冬雨、北方夏季暴雨；气旋过境降水多，如西欧冬季、东北和江南春季；反气旋过境降水少，如伏旱；台风过境降水多。

③洋流因素：沿海暖流流经区降水多；沿海寒流流经区降水少。

④海陆位置：一般沿海降水多；内陆降水少。

⑤地形地势：暖湿气流在山脉迎风坡降水多，背风坡降水少（焚风效应）。

### ☆某两地气候特点比拟：

①气温（最低月气温，气温的年较差和日较差）②降水（降水量总量大小，季节分配情况及雨季长短）。

### ☆西风带的风力夏季弱冬季强：

（可用于解释我国冬季风比夏季风强的原因之一）因为冬季上下纬度间的温差大，气压差大，水平气压梯度力大。夏季反之。

### ☆大陆性气候的特征：

①气温年较差和日较差大。②降水少。③冬季寒冷，夏季炎热

#### ☆海洋性气候特征：

①气温年较差和日较差小，冬暖夏凉。②降水丰富且季节分配均匀，年际变化小。

☆干湿度影响因素：降水量和蒸发量共同决定

#### ☆雾、霜的影响因素：

1. 湿度（河流湖泊附近、水库附近）；
2. 地形（低洼地、山坳里）；
3. 尘埃（道路边、市区内、建筑工地、矿区）

#### ☆风力的影响因素：

1. 气压梯度力大小；
2. 距高压中心远近；
3. 摩擦力大小（地面平坦开阔、海面上）；
4. 植被多少；
5. 地形（山谷口的狭管效应、高原上）

#### ☆河流的水文特征：

1. 流量：大小、季节变化、有无断流（取决于降水特征、雨水补给、河流面积大小）
2. 含沙量：取决于流域的植被状况
3. 结冰期：有无及其长短

4. 水位：上下、变化特征（取决于河流补给类型、水利工程、湖泊调蓄作用）

5. 水能：与地形（河流落差大小，流速快慢）、气候（降水量的多少，径流量的大小，蒸发量的大小）有关

6. 凌汛

### ☆河流的水系特征：

1. 发源地、长度、入海口 2. 流向 3. 流域面积大小

4. 落差大小（水能） 5. 河道曲直情况 6. 支流和支流形状

7. 有无湖泊沟通

### ☆影响太阳辐射的因素：

1. 纬度：决定正午太阳高度大小、昼长

2. 海拔高度：海拔高，空气稀薄，太阳辐射强（. 青藏高原、德干高原、巴西高原、东非高原等）

3. 天气状况（晴天多，太阳辐射丰富）（我国西北地区、中亚、西亚、北非、美国西部内陆、澳大利亚中西部等）

4. 大气清洁度：城市和乡村

### ☆影响雪线上下的因素：

1. 降水（迎风坡：降水多，雪线低。反之则雪线高）

举例：喜马拉雅山南坡比北坡雪线低；天山北坡雪线低；阿尔卑

斯山北坡雪线低；落基山的北段和安第斯山南段的西坡雪线低；  
落基山的南段和安第斯山北段的东坡雪线低等

2. 气温（阳坡雪线高、阴坡雪线低；中低纬度雪线高、高纬度雪线低）

### ☆影响山地垂直带谱的因素：

- 1 纬度：相同海拔，则纬度越高，带谱越简单
2. 海拔：相同纬度，则海拔越高，带谱越复杂
3. 热量：阳坡带谱多且位置高、阴坡带谱少且位置低

### ☆地质作用分析：内力+外力

1. 内力作用：地壳运动（拉伸、挤压）、岩浆活动（火山）、变质作用等三个方面
2. 外力作用：风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩

注意：内力+外力，不可遗漏

### ☆怎样分析理解不同海区盐度的差异成因？

- (1) 不同纬度海区：主要考虑各海区蒸发量与降水量的比照关系。  
规律是：由副热带海区分别向两侧的高纬度和低纬度递减。

(2) 在同一纬度海区：主要考虑洋流的影响和径流稀释作用。

影响因素	影响
气候	降水量>蒸发量，盐度较低；降水量<</FONT>蒸发量，盐度较高
径流	有大量江河淡水注入的海区，盐度偏低
洋流	同纬度海区，寒流经过的海区，盐度偏低，暖流经过的海区，盐度偏高
海区的封闭度	影响与附近海区海水的交换量

#### ☆怎样分析赤潮成因？

(1) 温度和降水：一般出现在夏季，春、秋两季也时有发生。（温度高，降水少易于形成赤潮）

(2) 风和海流：赤潮的形成、分布、集聚和分散直接受到水体运动的影响，赤潮容易产生于一些港湾就是这个原因。（风小，海流弱易于赤潮的形成）

(3) 人类活动的影响：人类不断将大量的生活污水、工业废水及农田废水等排入海洋，过度的海产养殖，造成海域的富营养化。

#### ☆山地垂直自然带分布的分析：

- (1) 纬度位置——决定了山麓基带类型
- (2) 相对高度——决定了水热状况变化的程度(以上两点决定自然带数量)
- (3) 阳坡、阴坡——影响植被分布的高度
- (4) 迎风坡、背风坡——影响降水多少与雪线高度

### ☆河流洪涝灾害的成因和治理措施:

自然原因:

- 1. 水系特征 (有哪些方面?)
- 2. 水文特征 (有哪些方面?)
- 3. 降水特征 (降水量、时长、强度)
- 4. 气候异常 (普降暴雨, 降水比常年偏多, 例如“百年不遇”)

人为原因:

- 1. 植被破坏 (乱砍乱伐, 植被破坏严重, 水土流失加剧, 泥沙淤积, 抬高河床, 使河道的泄洪能力降低; 泥沙淤积, 导致湖泊萎缩, 调蓄能力降低; 植物修养水源、调节能力降低)

- 2. 围湖造田 (蓄洪峰能力下降。)

例如, 长江洪灾的原因:

(1) 自然原因:

- ①水系特征: 流域广, 支流多; 中上游植被破坏严重, 含沙量增大; 中下游多为平原, 河道弯曲, 水流缓慢, 水流不畅。

②水文特征：流经湿润地区，降水丰沛，干流汛期长，水量大。

③气候特征：有些年份，气候异常，流域内普降暴雨，造成洪水泛滥。

(2)人为原因：

①过度砍伐，植被破坏严重，水土流失加剧，造成流域涵养水源、调节径流、削峰补枯能力降低；泥沙入江，淤积抬高河床，使河道的泄洪能力降低；

②围湖造田，泥沙淤积，从而导致湖泊萎缩，调蓄洪峰能力下降。

治理措施

☆缺水（旱灾）原因的分析与解决措施：

自然原因	1. 气候特征（降水和蒸发）； 2. 河流和湖泊（灌溉水源）； 3. 农作物需水季节
人为原因	1. 用水量大（人口、工农业）； 2. 利用方式（不合理，利用率低、污染浪费严重）

解决措施

1. 开源：跨流域调水、修建水库、海水淡化

2. 节流：减少水污染、减少浪费、提高水资源利用率、限制高耗能水工业开展、开展节水农业（喷灌滴灌）、制定法律法规，提高节水意识、实行水价调节

☆水土流失的原因、治理措施（黄土高原、江南丘陵红色荒漠化、西南地区岩漠化、南亚、东南亚地区）

自然原因	1. 气候（降水）； 2. 地形（坡度）； 3. 土质； 4. 植被
人为原因	破坏植被（乱砍乱伐；修路；开矿）
治理措施	禁止乱砍乱伐；大力植树造林；禁止陡坡开荒；修建梯田；退耕还林；解决农村能源问题（水电、风能、太阳能、沼气等）；制定法律法规；提高意识

☆河流水量大大的原因：

①地处什么气候区，降水丰富；②流域面积大，集水区广。③支流众多，水系庞大。

☆河流的补给：

雨水（大气降水）、冰川融水、湖泊水、地下水。

☆河流与地下水和湖泊水的补给关系：

丰水期河水补给给地下水和湖泊水，枯水期反之。

☆水电站的作用：

防洪、发电、航运、灌溉、水产养殖、旅游、供水、防凌、减淤。

☆以冰雪融水补给为主的河流：

流量变化与气温有关，季节变化大，年际变化小。

#### ☆河流有凌汛的条件：

①由低纬向高纬流。②最冷月气温在  $0^{\circ}\text{C}$  以下

#### ☆分析河流水能丰富的原因：

一条河流或某一河段水力资源是否丰富，主要看两方面：一是河流流量的大小，一般水量越大，径流越稳定，水力资源越丰富；二是河流的落差，一般落差越大，水流越急，水力资源越丰富。水量和落差的大小又受其他因素的影响，具体分析答复思路如下：

如：(1)我国西南地区水能丰富，主要原因是：

①地处湿润地区，降水丰沛，径流量大；②地处一、二阶梯交界处，河流落差大。

(2)三峡地区水能丰富，主要原因是：

①地处湿润地区，降水丰沛，径流量大；②地处二、三阶梯交界处，河流落差大。

#### ☆影响水库坝址选择因素：

1. 河流、峡谷处或盆地、洼地的出口（有利于建坝，工程量小，造价低，库容量大）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665124312301011330>