

2024 年主治医师之消化内科主治 306 精选试题及答案一

单选题（共 45 题）

1、乙型肝炎与丙型肝炎病毒重叠感染，可能为现症感染，也可能为病毒携带者（ ）

- A. anti-HBs 阳性
- B. anti-HBs、anti-HBe、anti-HBc 阳性，HBV-DNA 阴性
- C. HBsAg、anti-HBc 阳性，anti-HCV 阳性
- D. anti-HAVlgM 阴性，anti-HAVlgG 阳性
- E. 乙肝五项中 HBsAg、HBeAg、anti-HBc 阳性

【答案】 C

2、男，34 岁，突起上腹痛 3 小时，伴恶心、呕吐，发病前有酗酒史。查体：血压 12.0/8.0kPa(90/60mmHg)，腹平坦，脐周压痛，无反跳痛，Cullen 征及 Grey-Turner 征阳性

- A. 合并胆管结石
- B. 合并弥漫性腹膜炎
- C. 合并脓肿
- D. 合并肠麻痹
- E. 合并假囊肿

【答案】 D

3、男性，55 岁。黑便 7 个月，乏力，消瘦，查体：贫血貌，右下腹可触及一 3cm×6cm×4cm 的包块，质硬，表面不平，边缘不整，压痛。该患者高度怀疑

- A. 慢性阑尾炎

- B. 肠结核
- C. 回盲部肿瘤
- D. 克罗恩病
- E. 卵巢囊肿

【答案】 C

4、下列哪项表现可见于重型再生障碍性贫血()

- A. 出血轻，多见于皮肤及黏膜
- B. 血小板计数 $<20 \times 10^9$
- C. 中性粒细胞 $>0.5 \times 10^9$
- D. 感染较轻以上呼吸道为主
- E. 网织红细胞绝对值 $>15 \times 10^9$

【答案】 B

5、一工人师傅，平均每日饮酒半斤至1斤，饮酒史约10年，最终出现肝硬化，在好友及家人的劝说下，决定忌酒，半天后他便出现焦虑不安，大量出汗，恶心呕吐，送往当地医院，入院后查体：心率128次/分，血压140/100mmHg，考虑患者为

- A. 戒断性惊厥反应
- B. 脑出血
- C. 震颤谵妄状态
- D. 单纯性戒断反应
- E. 酒精性幻觉反应

【答案】 D

6、患者，男性，30岁，发作性血压增高，最高达200/120mmHg，伴头痛，面色苍白，出汗，心动过速，持续30分钟，平时血压正常

- A. 嗜铬细胞瘤
- B. 恶性高血压
- C. 高血压脑病
- D. 原发性醛固酮增多症
- E. 肾动脉狭窄

【答案】 A

7、最易并发原发性肝癌的是

- A. 病毒性肝炎后肝硬化
- B. 酒精性肝硬化
- C. 原发性胆汁性肝硬化
- D. 淤血性肝硬化
- E. 血吸虫性肝硬化

【答案】 A

8、磷脂酶 A2

- A. 分解蛋白质，引起胰腺水肿
- B. 破坏细胞膜，引起胰腺坏死和溶血
- C. 血管舒张，通透性增加，导致休克
- D. 参与胰腺及其周围脂肪坏死、液化
- E. 分解弹力纤维，破坏血管

【答案】 B

9、诊断急性肾盂肾炎最有价值的是

- A. 尿频、尿急、尿痛伴亚硝酸盐试验阳性
- B. 尿频、尿急、尿痛伴尿培养菌落计数 $>10^8$
- C. 尿急、尿频、尿痛
- D. 畏寒、发热、腰痛伴尿培养菌落计数 $>10^8$
- E. 尿频、尿急、尿痛伴尿白细胞计数 $>3 \times 10^6$

【答案】 D

10、女性，45岁。因SLE口服糖皮质激素近2年，发热2周伴咳嗽，痰中带血丝，查肺部无异常体征，胸片右上肺野多发片状结节影伴空洞，血沉40mm/h，PPD51U（-）。

- A. 强阳性可支持结核诊断
- B. 阴性可排除结核
- C. 阳性表示结核感染
- D. 弱阳性提示卡介苗交叉反应
- E. 免疫抑制者诊断价值受影响

【答案】 B

11、蛛网膜下腔出血时，预防再次出血的最根本措施是

- A. 应用抗纤溶药物
- B. 发现动脉瘤并早期手术
- C. 安静并卧床休息
- D. 保持大便通畅，避免用力
- E. 预防脑血管痉挛

【答案】 B

12、呕血伴黄疸见于

- A. 慢性胃炎
- B. 消化性溃疡
- C. 胆道疾病
- D. 胃黏膜脱垂症
- E. 胃癌

【答案】 C

13、有关腹腔积液的性质，肝硬化并发自发性腹膜炎

- A. 乳糜性
- B. 漏出液
- C. 渗出液
- D. 介于渗出液与漏出液之间
- E. 血性

【答案】 D

14、女性，45岁。反复上腹胀痛1年，进食后呕吐1个月，呕吐物含有宿食。查体：贫血貌，消瘦，可闻及振水音。

- A. B超
- B. 腹部CT
- C. 胃镜
- D. 腹部X线平片

E. 上消化道钡餐

【答案】 C

15、男性，67岁。近年尿频伴进行性排尿困难，无明显尿痛，该患者可能是

A. 肾盂肾炎

B. 膀胱炎

C. 前列腺增生

D. 肾结核

E. 肾结石

【答案】 C

16、男性，35岁。上腹隐痛一年，无节律性，一个月前钡餐检查，见胃角部有2.5cm突出腔外的龛影，近5天来每天排成形黑便一次，量不多，血压正常，血红蛋白95g/L，最可能的诊断是

A. 慢性浅表性胃炎

B. 十二指肠球部溃疡

C. 胃癌

D. 胃角溃疡

E. 胃黏膜脱垂症

【答案】 D

17、男性，50岁。胃病史5年余，近1个月腹痛症状加剧。胃镜检查示胃角溃疡，幽门螺杆菌检查阳性。

A. 胃镜与X线钡餐检查结果

B. 全身情况

C. 大便潜血持续阳性

D. 疼痛程度

E. 经内科治疗无效

【答案】 A

18、男性，50岁。上腹痛8年，餐后痛，服药有效，近三个月来，腹痛变为无规律，食欲减退，查体：轻度贫血貌，上腹压痛，未扪及包块，多次粪便隐血++，应考虑下述哪一项诊断最合适

A. 胃溃疡并出血

B. 胃溃疡活动期

C. 胃溃疡并胃炎

D. 胃溃疡恶性变

E. 胃溃疡并慢性穿孔

【答案】 D

19、自发性心绞痛

A. 冠状动脉痉挛

B. 冠状动脉内完全闭塞性血栓形成

C. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $\geq 75\%$

D. 冠状动脉斑块破裂不完全血栓形成

E. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $< 50\%$

【答案】 A

20、下述哪项是正确检查滑车上淋巴结的手法

A. 患者左前臂屈曲，检查者以左手向滑车上由浅入深进行触摸

- B. 左手扶托患者的左前臂以右手向滑车上由浅入深进行触摸
- C. 左手扶托患者的左前臂以右手向鹰嘴下由浅入深进行触摸
- D. 左手扶托患者的左前臂以右手向鹰嘴上由浅入深进行触摸
- E. 患者左前臂伸直，检查者以左手向滑车上由浅入深进行触摸

【答案】 B

21、男，48岁，胃溃疡病史10年，近2个月疼痛加重，失去节律，用多种药物治疗无效。查体：浅表淋巴结无肿大，腹平软，上腹部压痛，可扪及肿块

- A. 继续药物治疗
- B. 定期随访
- C. 手术治疗
- D. 化疗
- E. 放疗

【答案】 C

22、发热疾病中，常见合并肝脾肿大的是

- A. 疟疾
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 麻疹
- D. 药物热
- E. 肺结核

【答案】 A

23、下述哪项不是中毒性巨结肠的表现

- A. 肠鸣音消失
- B. 常出现在轻型患者
- C. 腹部平片见结肠扩大
- D. 可由低钾、抗胆碱能药诱发
- E. 外周血白细胞明显增高

【答案】 B

24、出现 Cheyne-Stokes 和 Biots 呼吸最主要的机制为

- A. 胸部外伤呼吸受抑制
- B. 胸腔积液呼吸受抑制
- C. 呼吸中枢兴奋性降低
- D. 呼吸肌麻痹
- E. 严重神经衰竭

【答案】 C

25、患者女性，35 岁患类风湿关节炎，长期服用泼尼松（强的松）。10 小时前突发腹痛，呕吐 3 次。中上腹部压痛，血淀粉酶 1000 单位（苏氏法）

- A. 腹部 CT
- B. ERCP
- C. 腹部超声
- D. 血脂分析
- E. 电解质分析

【答案】 C

26、确诊慢性萎缩性胃炎主要应根据

- A. 区吐物酸性偏低
- B. 钡餐检查
- C. 胃镜及活检
- D. 血清壁细胞抗体测定
- E. 暖气、上腹不适

【答案】 C

27、下列酶学改变中与肺气肿发病有关的是

- A. 胆碱脂酶活性正常
- B. α
- C. 蛋白分解酶减少
- D. 腺苷酸环化酶增高
- E. 磷酸二酯酶减少

【答案】 B

28、男性，23岁，4小时内连续发生全身强直一阵挛性发作5次。既往有癫痫病史15年，长期服苯妥英钠治疗。入院检查：浅昏迷，体温38℃，血压正常。入院后又发作2次

- A. 总是有3Hz痫样放电
- B. 总是有背景节律的异常
- C. 可能正常，而用蝶骨电极时有异常放电
- D. 可能正常，而用鼻咽电极时有异常放电
- E. 呈高幅失律表现

【答案】 B

29、患者，女性，剧烈胸痛伴发热，ST段除aVR导联以外呈弓背向下型抬高。最可能的诊断为

- A. 急性心包炎
- B. 高压性气胸
- C. 急性心肌梗死
- D. 主动脉夹层动脉瘤破裂
- E. 病毒性心肌炎

【答案】 A

30、男，26岁，反复上腹部隐痛2年余，进食后缓解，伴反酸，胃液分析BAO及MAO均高于正常人水平

- A. Curling 溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. Cushing 溃疡
- D. 复发性溃疡
- E. 吻合口溃疡

【答案】 B

31、男性，32岁，腹泻6年，每日4次稀便，无脓血，无发热，结肠镜检查：直肠、乙状结肠黏膜多发浅溃疡，伴充血、水肿，应诊断为

- A. 确诊为溃疡性结肠炎
- B. 确诊为Crohn病
- C. 肠结核
- D. 疑诊为溃疡性结肠炎

E. 胃肠功能紊乱

【答案】 A

32、腹部压痛部位不固定见于

A. 结核性腹膜炎

B. 肠易激综合征

C. 小肠克罗恩病

D. 恶性肿瘤腹膜广泛转移

E. 溃疡性结肠炎，全结肠型

【答案】 B

33、男性，45岁，乙型肝炎后肝硬化病史5年，患者间断出现双下肢水肿。近两年来反复出现腹水，治疗效果差。近日因黄疸加重、合并自发性腹膜炎入院。入院后查患者有高血钠。

A. 心房肽合成增加

B. 交感神经系统兴奋

C. ADH分泌增加

D. 醛固酮分泌增加，降解减少

E. 钠负荷增加

【答案】 D

34、患者，男，51岁。间断右上腹痛1个月余，突发全腹痛1小时。查体：体温38.4℃，血压85/55mmHg，巩膜黄染，肝肋下3cm，质硬，触痛，脾肋下未及，全腹压痛，移动性浊音(±)。腹腔穿刺抽出少量血性液体。该患者最可能的诊断是

A. 原发性肝癌结节破裂出血

- B. 慢性胆囊炎、胆结石合并胆囊穿孔
- C. 肝硬化合并结核性腹膜炎
- D. 消化性溃疡穿孔
- E. 肝硬化合并门静脉血栓形成

【答案】 A

35、患者，男，28岁。间断腹痛、腹泻、脓血便3年，加重2周，4~6次/日，不伴发热。结肠镜检查示：直肠、乙状结肠粘膜弥漫充血、水肿，有多发、表浅溃疡，附有脓血性分泌物。最可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 伪膜性肠炎
- D. 出血坏死性肠炎
- E. 缺血性结肠炎

【答案】 B

36、肝硬化最严重的并发症

- A. 上消化道出血
- B. 肝性脑病
- C. 肝肾综合征
- D. 肝肺综合征
- E. 腹水

【答案】 B

37、在海产品中，大量存在的致病菌是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/666045233045010234>