

2024 年河北省《执业药师之西药学专业二》 考试完整题库附参考答案（培优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 II 类抗心律失常药 ()

- A: 普萘洛尔
- B: 奎尼丁
- C: 利多卡因
- D: 胺碘酮

答案：A

2. 巴比妥类药物急性中毒致死的直接原因是

- A: 深度呼吸抑制
- B: 高钾血症
- C: 胃、十二指肠溃疡
- D: 肝脏损害

答案：A

3. （2018 年真题）可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻，具有固定和清除多种病原体和毒素药物是（）

- A: 蒙脱石散
- B: 洛哌丁胺
- C: 地芬诺酯
- D: 番泻叶

答案：A

4. (2017 年真题) 维 A 酸软膏治疗痤疮时,合理的用法是 ()

- A: 一日一次,睡前使用
- B: 一日二次,早晚使用
- C: 一日一次,固定时间使用
- D: 一日一次,晨起使用

答案: A

5. 用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

- A: 更昔洛韦
- B: 利巴韦林
- C: 拉米夫定
- D: 碘苷

答案: B

6. (2016 年真题) 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

- A: 托烷司琼
- B: 甲氧氯普胺
- C: 阿瑞吡坦
- D: 维生素 B₆

答案: A

7. 兰索拉唑属于

- A: H⁺, K⁺-ATP 酶抑制剂
- B: M 受体阻断药
- C: H₂ 受体阻断药
- D: 胃泌素受体阻断药

答案: A

8. 不宜用于单纯性尿路感染初治病例的氨基糖苷类抗菌药物是

- A: 盐酸克林霉素
- B: 阿米卡星
- C: 万古霉素
- D: 利福平

答案：B

9. (2016 年真题) 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A: 托瑞米芬
- B: 他莫昔芬
- C: 乙烯雌酚
- D: 氟他胺

答案：D

10. 属于抑酸药的是()

- A: 胃蛋白酶
- B: 莫沙必利
- C: 奥美拉唑
- D: 胶体果胶铋

答案：C

11. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 艾司奥美拉唑
- B: 兰索拉唑
- C: 奥美拉唑
- D: 右兰索拉唑

答案：D

12. 下列不属于肽类抗生素的是

- A: 万古霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 多黏菌素 B
- D: 去甲万古霉素

答案：B

13. 为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 吡喹酮
- B: 甲硝唑
- C: 乙胺嘧啶
- D: 三苯双脒

答案：B

14. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染宜首选的抗菌药物是()。

- A: 利奈唑胺
- B: 头孢曲松
- C: 头孢他啶
- D: 罗红霉素

答案：A

15. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向选用

- A: 维生素 K
- B: 低分子肝素
- C: 尿激酶
- D: 氨甲环酸

答案：A

16. 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是

- A: 西格列汀
- B: 罗格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：A

17. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

- A: 干扰 DNA 的合成
- B: 干扰细菌细胞壁合成
- C: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成
- D: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

答案：B

18. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是()。

- A: 氯化铵
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

答案：C

19. 壬二酸的作用特点不包括

- A: 局部使用能显著减少滤泡内丙酸杆菌的生长
- B: 可直接抑制皮肤表面的细菌
- C: 可竞争性抑制产生二氢睾酮的酶过程

D: 对厌氧菌无抑制和杀灭作用

答案: D

20. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

A: 促进女性性器官的发育成熟

B: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备

C: 抑制子宫平滑肌的收缩

D: 大剂量抑制卵巢排卵

答案: A

21. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

A: 20% 甘露醇

B: 奥布卡因

C: 羟苄唑

D: 阿托品

答案: D

22. 以下不属于地西泮的药理作用的是

A: 抗抑郁

B: 镇静催眠

C: 抗惊厥

D: 抗癫痫

答案: A

23. 对血吸虫具有杀灭活性的药物是()。

A: 阿苯达唑

B: 吡喹酮

C: 噻嘧啶

D: 甲硝唑

答案: B

24. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药的是()。

A: 硝酸甘油

B: 美托洛尔

C: 利多卡因

D: 索他洛尔

答案: C

25. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌证()

A: 有子宫内膜癌症状和体征者

B: 肝、肾功能不全者

C: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者

D: 心力衰竭患者

答案: D

26. 下述保肝药物中可导致低钾血症的是

A: 还原型谷胱甘肽

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 复方甘草酸苷

D: 门冬氨酸鸟氨酸

答案: C

27. 可用于防治泌尿系统结石的是

A: 氯化钾

B: 氯化钠

C: 氯化钙

D: 枸橼酸钾

答案: D

28. 对凝血的各环节均有作用，体内外均有抗凝作用，可防止急性血栓形成而成为对抗血栓的首选的抗凝血药是()。

A: 阿哌沙班

B: 磺达肝葵钠

C: 水蛭素

D: 依诺肝素

答案: D

29. 磷霉素的主要抗菌作用机制是

A: 增加细菌胞浆膜的通透性

B: 抗叶酸代谢

C: 抑制细菌蛋白质合成

D: 干扰细菌细胞壁的合成

答案: D

30. 用于抢救肝素所致严重出血的药物是

A: 亚叶酸钙

B: 维生素 K

C: 硫酸鱼精蛋白

D: 对羧基苄胺

答案: C

31. 庚酸炔诺酮()

A: 促进蛋白质合成

- B: 抑制排卵作用
- C: 抗着床
- D: 减少精子数目

答案：B

32. 主要治疗双相情感障碍躁狂发作，宜选用的药物是

- A: 阿立哌唑
- B: 利培酮
- C: 氯氮平
- D: 碳酸锂

答案：B

33. 下列属于非选择性 β 受体阻断药的是()

- A: 美托洛尔
- B: 普萘洛尔
- C: 阿替洛尔
- D: 比索洛尔

答案：B

34. (2017 年真题) 属于芳香酶制剂抗肿瘤药是 ()

- A: 炔雌醇
- B: 他莫昔芬
- C: 氟他胺
- D: 阿那曲唑

答案：D

35. 常引起外周神经炎的抗肿瘤药是

- A: 长春新碱

B: 巯嘌呤

C: 氟尿嘧啶

D: 甲氨蝶呤

答案：A

36. 阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

A: 依立雄胺

B: 度他雄胺

C: 非那雄胺

D: 普适泰

答案：D

37. 可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

A: 硫唑嘌呤

B: 环孢素

C: 环磷酰胺

D: 甲泼尼龙

答案：B

38. 用于器官移植的抗排异反应的药物是()

A: 甲泼尼龙

B: 硫唑嘌呤

C: 环磷酰胺

D: 环孢素

答案：D

39. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

- A: 地匹福林
- B: 拉坦前列素
- C: 噻吗洛尔
- D: 毛果芸香碱

答案：A

40. 可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是

- A: 制霉菌素
- B: 阿莫罗芬
- C: 联苯卡唑
- D: 特比萘芬

答案：D

41. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 戊四醇酯
- C: 硝酸甘油
- D: 单硝酸异山梨酯

答案：C

42. 立克次体感染首选

- A: 多黏菌素
- B: 四环素
- C: 氯霉素
- D: 头孢菌素

答案：B

43. 抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 莫沙必利
- D: 奥关拉唑

答案：D

44. （2015 年真题）李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是（）。

- A: 阿司匹林
- B: 辛伐他汀
- C: 二甲双胍
- D: 米氮平

答案：D

45. 可能导致耳蜗神经和肾损害的抗菌药物是

- A: 庆大霉素
- B: 多西环素
- C: 甲砒霉素
- D: 加替沙星

答案：A

46. 正常成人一次口服 20mg / kg，1 小时后血清中浓度达到最高，血浆半衰期为 2 小时，连续服药 7 日未见蓄积倾向，进入体内后在骨及肾脏中浓度最高，随尿液排出 8%~16%，随粪便排出 82%~94%的是

- A: 唑来膦酸
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 帕米膦酸二钠

D: 依替膦酸二钠

答案：D

47. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

A: 多索茶碱

B: 沙美特罗

C: 布地奈德

D: 孟鲁司特

答案：A

48. 主要降三酰甘油的药物的是

A: 硝酸甘油

B: 普萘洛尔

C: 阿昔莫司

D: 胍乙啶

答案：C

49. (2016 年真题) 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A: 硫酸亚铁

B: 人血白蛋白

C: 重组人促红素

D: 维生素 B12

答案：C

50. 具有肾保护作用的降压药是

A: 缬沙坦

B: 硝苯地平

C: 氢氯噻嗪

D: 沙拉新

答案: A

51. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg，一日 3 次的药物是

A: 地塞米松

B: 可待因

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案: C

52. 可与 PPI、铋剂联合使用治疗幽门螺杆菌感染的药物是()

A: 克拉霉素

B: 替考拉宁

C: 大观霉素

D: 美罗培南

答案: A

53. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

A: 甲地孕酮

B: 甲氧氯普胺

C: 阿瑞吡坦

D: 格雷司琼

答案: D

54. 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是()

A: 布美他尼

B: 依托塞米

C: 依他尼酸

D: 乙酰唑胺

答案: C

55. 属于胃黏膜保护剂的是()

A: 胶体果胶铋

B: 奥美拉唑

C: 胃蛋白酶

D: 莫沙必利

答案: A

56. 西酞普兰抗抑郁的药理作用机制是

A: 抑制单胺氧化酶

B: 抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取

C: 抑制 5-羟色胺再摄取

D: 抑制神经末梢突触前膜 α

答案: C

57. 下列属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的药物是

A: 环孢素

B: 米非司酮

C: 奥利司他

D: 黄体酮

答案: C

58. 可明显降低血浆甘油三酯的药物是()

A: 贝特类

B: 苯氧酸类

C: 胆汁酸螯合剂

D: 抗氧化剂

答案：A

59. 四环素联用钙剂使

A: 调整抗凝血药的剂量

B: 口服吸收减少

C: 增加麦角中毒的风险

D: 肝毒性增加

答案：B

60. 用于治疗水肿性疾病,当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时,可追加剂量,每日最大剂量可达 600mg 但一般应控制在 100mg 以内的利尿剂是 ()

A: 布美他尼

B: 托拉塞米

C: 依他尼酸

D: 呋塞米

答案：D

61. 与体内过氧化物和自由基结合,保护细胞中含巯基的蛋白质和酶,参与多种有毒物质解毒反应的药物是

A: 甘草酸二铵

B: 葡醛内酯

C: 还原型谷胱甘肽

D: 多烯磷脂酸胆碱

答案：C

62. 高血压伴精神抑郁者不宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 利血平
- C: 普萘洛尔
- D: 尼莫地平

答案：B

63. 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入（PCI）治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

- A: 双氯芬酸
- B: 华法林
- C: 氯吡格雷
- D: 奥美拉唑

答案：C

64. () 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

- A: 万古霉素
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 克林霉素

答案：C

65. 肝素抗凝血治疗引起的自发性出血，宜用的抢救药物是

- A: 氨甲苯酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K
- D: 氨甲环酸

答案：B

66. 低分子量肝素的作用靶点是

- A: 因子 X_a
- B: 因子 IX_a
- C: 因子 II_a
- D: 凝血酶 III (AT—III)

答案：D

67. 下列关于紫杉醇的描述，错误的是

- A: 应预防由紫杉醇所致的超敏反应
- B: 与多西他赛相比，神经毒性和心脏毒性都较轻
- C: 长期应用可产生抗药性，出现多药耐药性现象
- D: 广谱、天然抗肿瘤药

答案：B

68. 糖尿病患者低血糖时，可导致患者不适甚至生命危险，也是血糖达标的主要障碍。为了预防低血糖事件的发生，应用胰岛素或促胰岛素分泌剂时，需要注意的事项不包括

- A: 患者应定时定量进餐
- B: 个体化给药，直接给予所需治疗剂量
- C: 谨慎地调整剂量
- D: 有可能误餐时应提前做好准备

答案：B

69. 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 华法林

C: 二甲双胍

D: 阿司匹林

答案: A

70. 分子中含有强碱性基团，可与肝素分子中的硫酸根迅速结合，形成无活性的稳定复合物，使肝素失去抗凝活性的是

A: 酚磺乙胺

B: 维生素 K1

C: 鱼精蛋白

D: 氨甲环酸

答案: C

71. 下列药物中，与雌二醇无相互作用的是

A: 利福平

B: 苯巴比妥

C: 氢化可的松

D: 卡马西平

答案: C

72. 氯霉素的抗菌作用原理是

A: 形成 NAD 的同系物，抑制结核菌生长

B: 抑制蛋白质合成

C: 干扰叶酸合成

D: 抑制 DNA 回旋酶

答案: B

73. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

A: 氯美扎酮

B: 氟西泮

C: 谷维素

D: 夸西泮

答案：A

74. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为()

A: 赫氏反应

B: 瑞夷综合征

C: 青霉素脑病

D: 金鸡纳反应

答案：A

75. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

A: 氯化钙

B: 枸橼酸钾

C: 氯化钠

D: 氯化钾

答案：C

76. 患者,男,58岁。最近出现多饮、多尿和体重下降等不正常身体状况就诊,检查发现血糖高,诊断为2型糖尿病,轻度心功能不全,医嘱选择磺酰脲类促胰岛素分泌药治疗。

A: 格列喹酮

B: 格列美脲

C: 格列本脲

D: 格列齐特

答案：C

77. 四环素类首选用于()

- A: 鼠疫、土拉菌病
- B: 布鲁菌病
- C: 伤寒、副伤寒
- D: 钩端螺旋体病

答案：B

78. 对 β -内酰胺酶有抑制作用的药物是

- A: 氨曲南
- B: 阿莫西林
- C: 亚胺培南
- D: 克拉维酸

答案：D

79. 属于第四代喹诺酮类药物的是

- A: 诺氟沙星
- B: 吡哌酸
- C: 萘啶酸
- D: 莫西沙星

答案：D

80. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的药物是

- A: 螺内酯
- B: 阿米洛利
- C: 甘露醇
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

81. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

- A: 螺内酯
- B: 美司钠
- C: 氯化钾
- D: 二甲双肌

答案：B

82. 不宜与三环类抗抑郁药合用

- A: 羟甲唑啉
- B: 酚甘油滴耳液
- C: 赛洛唑啉
- D: 麻黄碱

答案：D

83. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 克拉维酸
- B: 氨基糖
- C: 亚胺培南
- D: 阿莫西林

答案：B

84. 治疗侵袭性曲霉菌病首选（）

- A: 灰黄霉素
- B: 氟康唑

C: 氟胞嘧啶

D: 伏立康唑

答案: D

85. 茶碱浓度 15-20ug/ml 时可出现

A: 恶心、呕吐、失眠

B: 为有效的治疗浓度

C: 呼吸、心跳停止

D: 心动过速、心律失常

答案: A

86. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

A: 氯喹+伯氨喹

B: 乙胺嘧啶+磺胺药

C: 静脉滴注奎宁

D: 咯萘啶或甲氟喹

答案: D

87. (2019 年真题) 与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是 ()

A: 葡醛内酯

B: 还原型谷胱甘肽

C: 多烯磷脂酸胆碱

D: 甘草酸二铵

答案: B

88. 一日 2 次，早餐和晚餐前 60 分钟内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖水平作随时调整的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/666125220101011030>