

## 口腔正畸学测试题库与答案

1、下列不属于个别牙错位的是

- A、牙列拥挤
- B、低位牙
- C、鄂向错位牙
- D、近中错位牙
- E、易位牙

答案：A

2、牙片上牙邻面颈部所呈现的三角形透明区是

- A、邻面龋
- B、正常牙颈部
- C、牙槽嵴吸收
- D、牙颈部脱钙
- E、投照角度不正确所致

答案：B

3、正畸患者的口腔卫生保健包括

- A、菌斑控制
- B、局部使用氯化物
- C、正畸治疗的准备工作
- D、调整和规范一些正畸临床操作
- E、所有选项都是

答案：E

4、SNA 角

- A、代表上唇与鼻底的位置关系
- B、反映下颌相对于颅部的位置关系
- C、反映上颌相对于颌部的前后位置关系
- D、反映下颌的突缩程度
- E、代表下颌体的陡度、下颌角的大小，也反映面部的高度

答案：C

5、抗磨性最好的是

- A、嵌体
- B、甲冠
- C、3/4 冠
- D、金属全冠
- E、烤瓷全冠

答案：E

6、关于功能矫正器，叙述不正确的是

- A、最适宜于青春生长进发期 3~4 年开始
- B、功能矫正器本身不产生任何机械力
- C、Herbst, Twin-block, activator 都属肌激动器类
- D、可以选择性地控制牙齿的垂直高度
- E、矫治期每天至少戴用 12 小时

答案：A

7、反牙合解除后双侧牙合垫每次应磨除

- A、0.5~1.0mm
- B、1/3
- C、0~2.0mm
- D、0.5mm 以内
- E、1/2

答案：A

8、前牙深覆盖，上颌正常时矫治原则为

- A、压低下前牙，升高后牙
- B、开展全牙弓
- C、推磨牙向后
- D、导下颌向前
- E、内收上前牙

答案：D

9、下列不属于早期矫治方法的是

- A、序列拔牙治疗
- B、功能矫治器治疗
- C、口外矫形力装置治疗
- D、心理维护治疗
- E、肌功能训练

答案：D

10、口外前方牵引矫正器的组成，不包括

- A、颏兜
- B、牙合垫
- C、面具式前方牵引架
- D、颈带
- E、口内矫正器

答案：D

11、S 点为

- A、硬腭后部骨棘之尖
- B、上齿槽座点
- C、上中切牙切缘之最前点
- D、下颌角的后下点
- E、蝶鞍影像的中心

答案：E

12、慢性唇炎的临床表现不包括

- A、皸裂
- B、脱屑
- C、结痂
- D、水肿
- E、水疱

答案：E

13、脓肿切开后建立引流时不需要考虑的因素是

- A、脓肿位置
- B、脓腔大小
- C、脓肿的深浅
- D、脓肿的致病菌
- E、所有选项都要考虑

答案：E

14、牙周病患者在何时可以进行正畸治疗

- A、只要牙槽骨吸收不到 1/2 时，就可进行正畸治疗
- B、只要控制牙周病后就可进行
- C、任何时候牙周病患者都不能进行正畸治疗
- D、牙周病患者任何时候都可进行正畸治疗
- E、牙周病患者牙槽骨吸收不到 1/2 时，控制了牙周病后方可进行正畸治疗

答案：E

15、男，27 岁，有癫痫病史，检查见牙龈增生覆盖牙冠 1 / 2，袋深 4~6mm，前牙有移位。最可能的诊断是

- A、糖尿病型牙周炎
- B、增生性牙龈炎
- C、牙龈纤维瘤病
- D、药物性牙龈增生

E、维生素 C 缺乏症

答案：D

16、关于基准平面，下列哪项说法不正确

A、基准平面为头影测量中相对稳定的平面

B、最常用的基准平面有前颅底平面，眼耳平面和 Bolton 平面

C、Bolton 平面多用作重叠头影图的基准平面

D、大部分个体在正常头位时，眼耳平面与地面平行

E、所有选项都不对

答案：A

17、关于上颌间位置关系的调整，下列说法错误的是

A、上下颌的位置关系要经过两次调整才能达到正常

B、3 个月以前的胎儿表现上颌前突

C、7 个月的胎儿，上颌又超过下颌呈前突状

D、3 个月时胎儿上下颌在同一垂直平面上

E、新生儿出生后，因吮吸动作，上下颌间关系调整到正常

答案：A

18、下面哪一个属于固定矫治器

A、生物调节器

B、平面导板

C、唇挡

D、方丝弓矫治器

E、斜面导板

答案：D

19、头影测量中与地面平行的平面是

A、眶耳平面

B、腭平面

C、（牙合）平面

D、Bolton 平面

E、前颅底平面

答案：A

20、关于上颌间位置关系的调整，下列说法错误的是：

A、上下颌的位置关系要经过两次调整才能达到正常

B、3 个月以前的胎儿表现上颌前突

C、3 个月时胎儿上下颌在同一垂直平面上

D、7 个月的胎儿，上颌又超过下颌呈前突状

E、新生儿出生后，因吮吸动作，上下颌间关系调整到正常

答案：A

21、下列牙齿移动的种类中除了那一项不是

A、倾斜移动

B、垂直移动

C、整体移动

D、转矩移动

E、水平移动

答案：E

22、临床最常用的方丝托槽槽沟是

A、0.22×0.028 英寸

B、0.18×0.025 英寸

C、0.16×0.022 英寸

D、0.18×0.22 英寸

E、0.22×0.25 英寸

答案：A

23、牙列缺失后颌骨的改变主要表现为

A、颌骨的吸收

B、颌骨的增生

C、颌骨的移位

D、牙槽骨的吸收

E、牙槽骨的增生

答案：D

24、下列哪项不是霍利保持器的组成部分

A、磨牙上的单臂卡环

B、带环

C、中位双曲唇弓

D、塑料基托

E、所有选项均不正确

答案：B

25、下列哪项不是临床上加强支抗的方法：

A、增加用作支抗牙齿的数目

B、将支抗牙连成一整体而加强支抗作用

C、用口外唇弓来增强支抗

D、使用方丝弓矫治技术

E、Nance 弓

答案：D

26、上唇系带异常可造成

A、前牙反（牙合）

B、上颌前突

C、上前牙拥挤

D、上前牙间隙

E、所有选项都不是

答案：D

27、测定咀嚼效率的方法有

A、称重法、还原法、比色法

B、称重法、吸光度法、比色法

C、沉淀法、吸光度法、比色法

D、沉淀法、还原法、比色法

E、沉淀法、还原法、吸光度法

答案：B

28、关于上颌间位置关系的调整，下列说法错误的是：

A、上下颌的位置关系要经过两次调整才能达到正常

B、3个月以前的胎儿表现上颌前突

C、3个月时胎儿上下颌在同一垂直平面上

D、7个月的胎儿，上颌又超过下颌呈前突状

E、新生儿出生后，因吮吸动作，上下颌间关系调整到正常

答案：A

29、下列不是功能性前牙反颌的诊断标准的是

A、近中磨牙关系

B、牙位与肌位不一致

C、下颌能后退至前牙对刃

D、前牙没有代偿

E、颌骨大小形态异常

答案：E

30、在错牙合畸形的检查诊断中，下列哪项不符合

A、无需询问有无全身性疾病及鼻咽部疾病

B、对牙弓检查时要进行牙拥挤度测定

C、要检查上下中切牙间的中线关系

D、询问幼年时有无口腔不良习惯

E、需要进行牙、颌、面的一般检查

答案：A

31、关于序列拔牙错误的是

A、又称为萌出诱导及（牙合）诱导

B、序列拔牙的目的是最终减数拔除第一前磨牙

C、需要长期监控，一般每半年应摄全颌曲面断层片

D、序列拔牙可能会减少前牙深覆牙合

E、所有选项都是错误的

答案：D

32、适用于初诊时尖牙唇侧错位的患者的是

A、标准 Hawley

B、Hawley-I

C、Hawley-II

D、Hawley-III

E、Hawley-IV

答案：D

33、下列哪项是毛氏第V类错牙合

A、个别牙错牙合

B、开牙合

C、深覆牙合、深覆盖

D、前牙反牙合

E、后牙锁牙合

答案：E

34、前牙冠覆盖下前牙冠超过 1/3 者称为深覆牙合，其分为三度，I 度深覆牙合为

A、覆盖为 3~5mm

B、上前牙冠覆盖下前牙超过冠 1/3 而不足 1/2 者

C、上前牙冠覆盖下前牙超过冠 1/2 而不足 2/3 者

D、上前牙冠覆盖下前牙超过冠 2/3 者

E、所有选项都不是

答案：B

35、使用 activator 治疗时下颌每前移 1mm 可以产生

A、100g 力

B、150g 力

C、200g 力

D、300g 力

E、50g 力

答案：A

36、口外后方牵引器的组成，不包括

A、上颌矫正器

B、上颌唇挡

C、牵引皮圈

D、头帽

E、面弓

答案：B

37、平面导板矫治器下前牙咬在导板上时后牙应离开

A、3~5mm

B、2~2.5mm

C、1.5~2mm

D、2.5~3.5mm

E、5~6mm

答案：C

38、标准方丝弓矫正器关闭间隙采用

A、弹力结扎

B、小圈曲

C、连续垂直曲

D、闭合曲

E、滑动法

答案：D

39、关于直丝弓矫治器哪些是正确的？

A、源于方丝弓矫治器

B、消除了弓丝上弯制三个序列弯曲的必要

C、简化临床操作缩短疗程

D、由 Angle 首先推出

E、所有选项都是

答案：D

40、修复体修复患牙、为了防止继发龋的发生，要做到

A、&nbsp;

修复体要正确地恢复患牙的解剖形态

B、修复体要能恢复患牙的功能



- C、修复体尽可能厚些，隔绝细菌侵入
- D、修复体边缘线要位于自洁区
- E、所有选项都是

答案：D

41、毛氏 I1 错合畸形的表现是：

- A、前牙反（牙合）
- B、牙列拥挤
- C、有牙间隙
- D、开合
- E、深覆合

答案：B

42、翼外肌功能亢进的主要症状是

- A、关节区疼痛和压痛
- B、弹响和开口过大呈半脱位
- C、开口初期的单音弹响
- D、开口型是开口末偏向患侧
- E、侧方运动和前伸运动时出现弹响

答案：B

43、男，27岁，有癫痫病史，检查见牙龈增生覆盖牙冠1/2，袋深4~6mm，前牙有移位。最可能的诊断是

- A、糖尿病型牙周炎
- B、增生性牙龈炎
- C、牙龈纤维瘤病
- D、药物性牙龈增生
- E、维生素C缺乏症

答案：D

44、面部肌肉建牙合的动力平衡中，与向后的动力有关的肌肉是

- A、颞肌
- B、翼内肌
- C、咬肌
- D、上下唇方肌
- E、所有选项都不是

答案：D

45、上下牙弓狭窄其矫治原则为

- A、缩小上牙弓宽度,或扩大下牙弓宽度或二者并用

- B、升高前牙或压低后牙
- C、扩大牙弓,推磨牙向后
- D、矫正颌间关系
- E、所有选项都不是

答案: A

46、周病患者在何时可以进行正畸治疗

- A、任何时候牙周病患者都不能进行正畸治疗
- B、只要控制牙周病后就可以进行
- C、只要牙槽骨吸收不到 1/2 时, 就可以进行正畸治疗
- D、牙周病患者牙槽骨吸收不到 1/2 时, 控制了牙周病后方可进行正
- E、牙周病患者任何时候都可进行正畸治疗

答案: D

47、在方丝弓矫治器的应用过程中, 为关闭拔牙间隙常采用在弓丝上弯制

- A、水平曲
- B、欧米加曲
- C、泪滴型曲
- D、垂直张力曲
- E、小圈曲

答案: C

48、矫治不能引起何处变化

- A、颌骨
- B、牙周支持组织
- C、错位牙齿
- D、枕骨
- E、牙槽骨

答案: D

49、II 度拥挤的拥挤量是

- A、8~10mm
- B、10~12mm
- C、5~8mm
- D、2~4mm
- E、4~6mm

答案: C

50、关于婴儿时期的预防错误的是

- A、提倡母乳喂养, 婴儿睡着吮吸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667000036100006041>