

2024 年河北省北戴河区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库附答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 最有可能确认患者伤害事件的是

- A: 直接观察
- B: 病历审查
- C: 计算机检测方法
- D: 岗位工作问责

答案：B

2. 作为退热药，布洛芬的优势是

- A: 镇痛作用较强
- B: 可诱发变态反应
- C: 对胃肠道的不良反应较轻
- D: 具有解热镇痛消炎作用

答案：C

3. （2018 年真题）患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道感染，处方如下：

- A: 铋剂餐后服用
- B: 甲硝唑餐前服用
- C: 甲硝唑餐后服用
- D: 质子泵抑制剂餐后服用

答案：C

4. 某男孩，12 岁，近来反复突发意识丧失、颤动持续数秒钟缓解。

- A: 丙戊酸
- B: 氯丙嗪
- C: 地西泮
- D: 苯妥英钠

答案：A

5. （2018 年真题）患者，男，60 岁，因上臂出现湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 氢化可的松软膏
- B: 特比萘芬乳膏
- C: 10%樟脑软膏
- D: 利巴韦林软膏

答案：A

6. 轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

- A: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失
- B: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常
- C: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30 次 / 分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120 次 / 分，奇脉，PaO₂
- D: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

答案：B

7. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

- A: 联合用药

B: 临床诊断

C: 医保和费用支付情况

D: 主要实验室检查数据

答案：C

8. 静脉滴注红霉素的适宜溶媒是

A: 复方氯化钠注射液

B: 0.9%氯化钠注射液

C: 5%葡萄糖注射液

D: 50%葡萄糖注射液

答案：C

9. 患者，男，30岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续3年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80次/分，律齐，无杂音。

A: 哌唑嗪

B: 青霉素

C: 普萘洛尔

D: 沙丁胺醇

答案：D

10. 阻塞性黄疸可呈现

A: 鲜血便

B: 乳凝块便

C: 柏油黑便

D: 白陶土便

答案：D

11. 为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性,将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估,此药物经济学评价方法是()

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效果分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效益分析

答案: D

12. 不宜置口中久含,以免影响其剂型设计目的

- A: 粉剂
- B: 包衣片
- C: 胶囊剂
- D: 糖浆剂

答案: B

13. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充,或因果关系难以定论。缺乏文献资料佐证;其 ADR 因果关系可评价为

- A: 待评价
- B: 可能
- C: 可能无关
- D: 很可能

答案: A

14. 患者,男性,72岁,患有前列腺增生症,常出现尿频、排尿困难,排尿后尿不尽、残余尿增多现象。诊断为充盈性尿失禁,给予阿夫唑嗪治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 口干、便秘、尿潴留
- B: 直立性低血压

C: 卧位和坐位时高血压

D: 鼻咽炎和尿路感染

答案: B

15. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A: 异烟肼

B: 红霉素

C: 伊曲康唑

D: 利福平

答案: D

16. 阿昔洛韦可导致

A: 肾小管坏死

B: 阻塞肾小管、肾小球

C: 前列腺素合成障碍

D: 肾间质纤维化

答案: B

17. 提高药效、减少人体吸收的是

A: 阿苯达唑

B: 抗忧郁药

C: 利尿药

D: 氨基糖苷类

答案: A

18. 用于胆囊炎患者控制感染症状的药物是

- A: 脂肪乳
- B: 头孢曲松与甲硝唑联用
- C: 复方阿嗪米特
- D: 匹维溴铵

答案：B

19. 核苷酸类逆转录酶抑制剂

- A: 利巴韦林
- B: 利托那韦
- C: 齐多夫定
- D: 依非韦伦

答案：C

20. 患者，女，28 岁，妊娠 6 个月，出现轻度外阴烧灼感、尿痛、尿急，就医后确诊为滴虫性阴道炎合并尿路感染，首选用药方案是

- A: 1：2 服克林霉素 300mg，每日 2 次，连用 7 日
- B: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次. 连用 7 日
- C: 咪康唑栓，阴道给药，每晚 1 粒（200mg），连用 7 日
- D: 口服甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日

答案：D

21. 卡马西平治疗三叉神经痛无效时，可改服

- A: 麦角胺咖啡因片
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿司匹林
- D: 苯妥英钠

答案：D

22. 患者男,64 岁,诊断为 2 型糖尿病,既往有磺胺过敏史不宜选用的药物是 ()

- A: 格列齐特
- B: 吡格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案: A

23. 药物治疗的效果不以货币为单位表示,而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

- A: 最小成本法
- B: 成本-效益分析
- C: 最大成本法
- D: 成本-效果分析

答案: D

24. 患者,女,55 岁,诊断为类风湿关节炎,既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是

- A: 7.5mgqw
- B: 7.5mgqod
- C: 7.5mgqd
- D: 7.5mg tid

答案: A

25. 需要在服药时多饮水的药物不包括

- A: 抗痛风药
- B: 氨基糖苷类抗生素
- C: 降糖药

D: 平喘药

答案: C

26. 患者,男 58 岁,高血压病史 5 年,吸烟史 40 年,日均 40 支,6 小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊 BP190/120mmHg,血常规基本正常,行头部 MRI 检查后,诊断为急性脑梗死。

A: 甘露醇注射液 250mlq6hiv

B: 呋塞米片 200mgqdpo

C: 尼莫地平注射液 20mgqdiv

D: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

答案: A

27. 正常人对铁剂的吸收率为

A: 10%~30%

B: 10%~20%

C: 0.4

D: 0.3

答案: B

28. (2015 年真题) 处方中“餐前给药”的外文缩写是 ()。

A: qn

B: pc

C: Ac

D: po

答案: C

29. 查询妊娠及哺乳期用药可首选的书籍是

- A: 《中华人民共和国药典》
- B: 《新编药物学》
- C: 《药物治疗学》
- D: 《药物流行病学》

答案：C

30. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

- A: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险
- B: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性
- C: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用
- D: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿

答案：D

31. 制定新药新知识培训制度，归属于用药错误预防策略中的

- A: 管理规范到位
- B: 环境与流程的优化与持续改进
- C: 人员培训
- D: 科学发展

答案：C

32. 维生素 B2 的特定吸收部位在小肠上部，故其最适宜服用的时间是

- A: 餐前
- B: 餐后
- C: 清晨
- D: 餐中

答案：B

33. 口服 180mg 元素铁是依据铁剂吸收率为

- A: 0.4
- B: 10%~20%
- C: 10%~30%
- D: 0.3

答案: D

34. 促进尿酸排泄，用于痛风慢性期，应早餐后服用的药物是

- A: 拉布立酶
- B: 枸橼酸氢钾钠
- C: 非布司他
- D: 苯溴马隆

答案: D

35. 有关血红蛋白的叙述正确的是

- A: 缺铁性贫血时红细胞计数的减少程度较血红蛋白的减少程度明显
- B: 血红蛋白常被称为"血色素"，是组成血液的主要成分
- C: 血红蛋白承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能
- D: 血红蛋白减少是诊断贫血的重要指标，并能确定贫血的类型

答案: C

36. 属于药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径的是

- A: 治疗药物监测
- B: 参与健康教育
- C: 处方调剂
- D: 药物信息服务

答案: A

37. 目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是()

- A: 大于 60 岁
- B: 绝经后 5 年之内
- C: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前
- D: 绝经后 5 年之内或大于 60 岁

答案: C

38. 高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

- A: 神经型
- B: 胃肠型
- C: 肺炎型
- D: 病毒型

答案: A

39. 可造成儿童呼吸抑制，故 5 岁以下的儿童不宜应用的是

- A: 苯丙哌林
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 可待因

答案: C

40. 普及人体健康参数，有利于

- A: 健康生活方式的教育
- B: 识别及管理多重用药
- C: 提高用药顺应性
- D: 转变疾病预防和保健观念

答案: D

41. 患者，女，60 岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度已 L1~L4 椎体 T 值-2.7SD，BMD749(mg / cm²)；股骨颈 T 值-2.2SD，BMD602(mg / cm²)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

- A: 氟制剂
- B: 钙制剂
- C: 甲状旁腺素
- D: 双膦酸盐

答案：D

42. 可导致胎儿颅面部畸形、腭裂的药物是

- A: 叶酸拮抗剂
- B: 沙利度胺
- C: 雌激素、孕激素、雄激素
- D: 苯巴比妥

答案：A

43. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少头孢拉定主要会造成

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 中性粒细胞减少
- D: 嗜碱性粒细胞增多

答案：A

44. 患者，女，75 岁，近来因家庭变故出现焦虑相关的精神和躯体症状，入睡困难，多梦易惊醒，诊断为焦虑症、核查其用药记录，患者在服用氨氯地平、阿托伐他汀钙。

- A: 可致宿醉现象, 容易跌倒
- B: 体重增加
- C: 心悸、震颤
- D: 极度烦躁不安的自伤和伤人行为

答案：A

45. (2017 年真题) 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h, 已知每毫升 15 滴, 每分钟最多可滴注的滴数约是 ()

- A: 25 滴
- B: 15 滴
- C: 50 滴
- D: 7 滴

答案：A

46. 临床实践验证, 一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此, 在进行排除毒物的同时, 应积极使用特效拮抗剂。

- A: 阿托品
- B: 乙酰胺
- C: 维生素 K1
- D: 维生素 B6

答案：C

47. 患者, 男, 70 岁, 2 周前因缺血性脑卒中入院治疗, 经积极治疗, 病情显著缓解后出院, 目前无其他伴随疾病, 为进行心脑血管事件的二级预防, 应首选的药物是 ()

- A: 巴曲酶
- B: 肝素

C: 利伐沙班

D: 阿司匹林

答案: D

48. 处方调配差错的内容

A: 确认差错发生的过程、细节

B: 药品名称出现差错

C: 通过药剂师双人复核制

D: 加强药品货位管理

答案: B

49. 服药时，应该限制饮水的药品是

A: 硝酸甘油

B: 口服补液盐

C: 阿仑膦酸盐

D: 苯溴马隆

答案: A

50. 患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 虾皮

B: 不含碘的食用盐

C: 紫菜

D: 海带

答案: B

51. 促进铁剂吸收的

- A: 胰酶
- B: 牛奶、蛋类
- C: 维生素 C
- D: 碳酸氢钠

答案：C

52. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息} 中国药学会的网址是

- A: org.cn
- B: org.cn
- C: www.cp
- D: www.cm

答案：B

53. (2018 年真题) 患者, 女, 71 岁, 2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA1c) 9.2%, 空腹血糖 10.5mmol/L, 餐后血糖 15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo, 格列美脲片 2mgtidpo, 罗格列酮片 2mgbidpo, 甲钴胺片 0.5mgtidpo, 羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 门冬胰岛素餐前 30~60min, 皮下注射, tid
- B: 普通胰岛素餐前 30min, 皮下注射, qd
- C: 甘精胰岛素睡前 30min, 皮下注射, qd
- D: 低精蛋白锌胰岛素餐前 30min, 皮下注射

答案：C

54. 一患者的肝功能检查结果是 ALT 与 AST 超过正常值，且 AST/ALT 之比值大于 1。此结果提示病人可能患

- A: 急性胰腺炎
- B: 缺铁性贫血

C: 肝硬化

D: 糖尿病

答案: C

55. 具有催吐作用，在无禁忌证前提下，可用于多种毒物中毒的催吐排毒药物是

A: 氯丙嗪

B: 昂丹司琼

C: 阿扑吗啡

D: 吗啡

答案: C

56. 美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于()。

A: 作用于同一受体的拮抗作用

B: 酶诱导作用

C: 与血浆蛋白结合

D: 排泄

答案: A

57. 利大于弊才有实际意义体现

A: 有效性

B: 安全性

C: 经济性

D: 规范性

答案: A

58. 患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75KG，临床诊断 2 型糖尿病，实验室检查，空腹血糖 5.7mmol/L(参考值范围 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 15.1mmol/L(正常值<7.6mmol/L)，糖化红蛋白 7.1%(正常值 4.8%~6.0%)，经饮食控制、规律锻炼、血糖控制认为达到理想水平。

- A: 二甲双胍
- B: 胰岛素+二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 格列齐特

答案：A

59. 急性胰腺炎发病几小时，血清淀粉酶开始升高

- A: 1
- B: 2~12
- C: 48~72
- D: 12~72

答案：B

60. (2018 年真题) 患者，男，65 岁，因腹胀，呕吐就诊，医生处方，甲氧氯普胺片 20mg tid po 该处方属于 ()

- A: 用法、用量不适宜
- B: 有禁忌证用药
- C: 有配伍禁忌
- D: 无适应证用药

答案：A

61. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

- A: 维生素 K1
- B: 碘解磷定

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 亚硝酸钠

D: 乙酰胺

答案：A

62. 下列关于血脂异常临床分型的叙述，不正确的是()。

- A: 低高密度脂蛋白血症 TC 水平明显增高，TG 正常或偏高
- B: 混合型高脂血症 TC 和 TG 均增高
- C: 高三酰甘油血症主要为 TG 升高，而 TC 正常或轻度增加
- D: 高胆固醇血症 TC 增高，TG 正常

答案：A

63. 庆大霉素可引起

- A: 锥体外系反应
- B: 听神经障碍
- C: 再生障碍性贫血
- D: 癫痫发作

答案：B

64. 血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人<40U/L
- B: 男性<40U/L
- C: 男性 11~50U/L
- D: 成人<50U/L

答案：A

65. 患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是()

- A: 停药，给予亚叶酸钙治疗
- B: 停药，水化，给予美司钠治疗
- C: 停药，给予糖皮质激素

D: 给予糖皮质激素冲击治疗

答案: B

66. 非甾体抗炎药的典型不良反应是

A: 肾毒性

B: 肝毒性

C: 血液系统毒性

D: 胃肠道刺激出血

答案: D

67. 儿童使用后可造成软骨病，18 岁以下儿童禁止使用的药物是

A: 头孢哌酮

B: 莫西沙星

C: 阿米卡星

D: 阿奇霉素

答案: B

68. 人体正常体温的标准是直肠温度不超过

A: 36.6℃

B: 36.9

C: 37.6℃

D: 37.2℃

答案: C

69. 使用解热镇痛药用于解热，症状未缓解应及时就诊或向医师咨询，一般不超过

A: 2 日

B: 4 日

C: 3 日

D: 1 日

答案: C

70. 应用利托那韦等蛋白酶抑制剂后，需要多饮水的主要目的是

A: 防止电解质紊乱

B: 防止腹泻导致的脱水

C: 防止形成尿道结石或肾结石

D: 加快排泄，减小肾毒性

答案: C

71. 餐中服用，可以减少对胃肠道刺激的药品是

A: 瑞舒伐他汀片

B: 复方铝酸铋片

C: 二甲双胍片

D: 甲氧氯普胺片

答案: C

72. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

A: 奥利司他

B: 二甲双胍

C: 别嘌醇

D: 替米沙坦

答案: B

73. 能保护药品免受破坏的联合是

A: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压

- B: 维生素 C 与铁剂同服
- C: 亚胺培南-西司他汀复方制剂
- D: 磷霉素联用其他抗菌药物

答案：C

74. 可引起驾驶员口渴、头晕的药物是

- A: 阿米洛利
- B: 抗过敏药
- C: 东莨菪碱
- D: 双嘧达莫

答案：A

75. 药品说明书中提及“两种药物在吸收过程中,会发生相互影响,不能同时服药”,但没有明示服药间隔时间,通常建议的间隔时间是 ()

- A: 0.5 小时
- B: 2 小时
- C: 1 小时
- D: 3 小时

答案：B

76. 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌 (LES) 压力 $<6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应
- B: 应正片吞服
- C: 适宜餐前 30 分钟服用
- D: 长期用药后可能会出现维生素 K 缺乏

答案：D

77. 干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成，使细菌细胞壁缺损的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 四环素
- C: 青霉素
- D: 链霉素

答案：C

78. (2016 年真题) 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 ()。

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- C: 酞丁安滴眼液
- D: 氧氟沙星滴眼液

答案：A

79. 患者,男,65 岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是 ()

- A: 右美沙芬
- B: 氨溴索
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 羧甲司坦

答案：A

80. 对乙酰氨基酚归属

- A: D 级
- B: X 级
- C: B 级

D: C 级

答案: C

81. 药名词干为"-cillin"的药品是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案: D

82. 由环境（灰尘、风沙、倒睫、屈光不正）刺激所致的非细菌性结膜炎可选用

A: 碘苷滴眼液

B: 1%泼尼松龙滴眼液

C: 硫酸锌滴眼液

D: 杆菌肽眼膏

答案: C

83. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A: 阿奇霉素

B: 克拉霉素

C: 链霉素

D: 米诺环素

答案: C

84. 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A: BUN

B: Hb

C: RBC

D: ALT

答案：D

85. 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为()

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 红细胞增多

D: 中性粒细胞增多

答案：D

86. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺(-)，双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

A: 醋酸锌

B: 阿昔洛韦

C: 布洛芬

D: 葡萄糖辛含片

答案：C

87. 常引起粪便白细胞增多的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 溶血性黄疸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/667031031052010024>