




结核护理


目录

- 结核病概述
- 结核病的症状与诊断
- 结核病的治疗与护理
- 结核病患者的心理护理
- 结核病的社区护理与预防



结核病概述

定义与特点



定义

结核病是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病，主要通过呼吸道传播。



特点

具有长期潜伏性，发病时症状多样，可累及全身多个器官，尤其是肺部。



结核病的传播方式

1

空气传播

结核分枝杆菌随患者咳嗽、打喷嚏或大声说话时产生的飞沫传播给他人。

2

消化道传播

极少数情况下，患者饮用含有结核分枝杆菌的牛奶或食物后可感染。

3

母婴传播

孕妇患有开放性肺结核时，结核分枝杆菌可通过胎盘感染胎儿。



结核病的预防措施

控制传染源

及时发现和治疗结核病患者，减少传染源。

预防接种

接种卡介苗可降低儿童感染结核病的几率。




切断传播途径

保持室内通风，避免与患者近距离接触，注意个人防护。

提高免疫力


加强营养，锻炼身体，提高自身免疫力，降低感染风险。



结核病的症状与诊断



常见症状



持续咳嗽

咳嗽持续数周或更长时间，可能伴有痰。

发热

持续的午后发热，通常为低热，但有时也可能出现高热。

体重下降

由于结核病影响食欲和吸收，患者可能会出现体重下降的情况。

疲劳和虚弱

由于结核病是一种慢性疾病，患者可能会感到疲劳和虚弱。

夜间盗汗

表现为夜间出汗，通常在醒来后停止。

诊断方法

痰结核菌检查

通过收集患者的痰液，进行结核菌的培养和检测，是诊断结核病的重要方法。

1

血液检查

血液检查可以检测出与结核病相关的抗体，但通常仅作为辅助诊断方法。

4

X光检查

通过X光检查肺部是否存在病变，有助于诊断结核病。

2

CT扫描

CT扫描可以更准确地检测肺部病变，有助于确诊结核病。

3





诊断流程

收集病史

医生会询问患者的症状、接触史、免疫状况等。

实验室检查


医生会根据患者的症状和体格检查结果，选择合适的实验室检查方法，如痰结核菌检查、X光检查、CT扫描和血液检查等。


体格检查

医生会进行体格检查，检查肺部是否有异常。

确诊与制定治疗方案

根据检查结果，医生会确诊患者是否患有结核病，并制定相应的治疗方案。





结核病的治疗与护理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667032032160006050>