

## 异常分娩、产褥感染试题及答案

1.关于协调性子宫收缩乏力正确的是（）

- A. 子宫收缩极性倒置
- B. 容易发生胎儿窘迫
- C. 不宜静脉滴注缩宫素
- D. 不易发生胎盘残留
- E. 产程常延长 (正确答案)

2.关于不协调性子宫收缩乏力正确的是（）

- A. 比协调性子宫收缩乏力多见
- B. 子宫收缩弱而无力
- C. 产妇多无不适感觉
- D. 强镇静药疗效显著 (正确答案)
- E. 较少发生胎儿窘迫

3.处理不协调性子宫收缩乏力的首选措施是（）

- A. 温肥皂水灌肠
- B. 肌注哌替啶100mg (正确答案)
- C. 行人工破膜
- D. 静脉滴注缩宫素加强宫缩
- E. 静脉补充能量

4.妊娠足月产妇拟增强宫缩，在5%葡萄糖注射液500ml中应加入缩宫素（）

- A. 10U
- B. 5U
- C. 2.5U (正确答案)

D.15U

E.20U

5.初产妇第一产程活跃期延长，是指活跃期超过（）

A.8小时

B.6小时

C.4小时

D.10小时

E.<0.5cm/小时 (正确答案)

6.初产妇第一产程潜伏期延长，是指潜伏期超过（）

A.10小时

B.12小时

C.14小时

D.20小时 (正确答案)

E.16小时

7.初产妇第二产程延长，是指第二产程超过（）

A. 1小时

B.1小时30分钟

C.2小时 (正确答案)

D.2小时30分钟

E.3小时

8.胎头下降延缓，是指初产妇第二产程胎头下降速度每小时小于（）

A.0.4cm

B.0.8cm

C.1.0cm (正确答案)

D.1.2cm

E.1.3cm

9.胎头下降停滞，是指第二产程胎头停留在原处不下降达（）

A. 1小时以上 (正确答案)

B.2小时以上

C. 2小时30分以上

D.3小时以上

E.3小时30分以上

10.不属于子宫收缩乏力原因的是（）

A.产妇精神过度紧张

B.胎位异常

C. 临产后应用大剂量镇静剂

D.膀胱充盈

E.临产后产妇体内前列腺素过多 (正确答案)

11.一初产妇，其分娩过程为时间宫口开大胎先露部位置10：00 4cm -2,12：00 5cm -1 ,14 00 6cm 0 ,16：30 6cm +1

A.活跃期延长 (正确答案)

B.潜伏期延长

C. 活跃期停滞

D.胎头下降延缓

E.胎头下降停滞

12. 26岁初产妇，妊娠40周，来院时规律宫缩22小时，已破膜。检查：宫底剑突下3指，胎心在脐下左下方140次/分。肛查宫口开全，胎头S+4。本例正确处理应是（）

- A. 等待自然分娩 (正确答案)
- B. 行胎头吸引器助娩
- C. 会阴侧切后自然分娩
- D. 会阴侧切后产钳助娩
- E. 行剖宫产术

13. 28岁初产妇，妊娠40周，规律宫缩12小时。近2小时产程无进展，产妇呼喊疼痛，腹部拒按，子宫呈痉挛性收缩，胎位触不清，胎心152次/分。肛查宫口开大3cm，胎头S+1。本例正确处理应是（）

- A. 阴道检查后再决定分娩方式
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 肌注哌替啶100mg (正确答案)
- D. 人工破膜后静滴缩宫素
- E. 立即行剖宫产术

25岁初产妇，妊娠39周，不规则宫缩2

日，阴道少许血性黏液，查血压136/86mmHg，子宫长度38cm，腹围106cm，胎心158次/分，宫缩持续32秒，间隔6分钟，肛查宫口未开，缩宫素激惹试验出现早期减速。临产20小时再查宫缩减弱变稀，胎心150次/分，肛查宫口开大2cm，先露为0，血压120/90mmHg，尿蛋白(±)，无自觉症状。

14. 本例的正确诊断应是（）

- A. 第一产程活跃期延长
- B. 第一产程潜伏期延长 (正确答案)
- C. 原发性子宫收缩乏力
- D. 胎儿窘迫

E. 妊娠期高血压

15. 此时不恰当的处理应是 ( )

A. 查胎盘功能

B. 左侧卧位

C. 静滴肼屈嗪 (正确答案)

D. 阴道检查了解头盆关系

E. 间断吸氧

23岁初产妇，妊娠39周，规律宫缩3小时，枕右前位，胎心136次/分，骨盆外测量未见异常，胎儿头S-

1. 宫口未开，B型超声测胎头双顶径值为9.6cm,羊水平段3cm。

16. 本例应诊断为 ( )

A. 胎儿生长受限

B. 头盆相对不称

C. 正常分娩经过 (正确答案)

D. 子宫收缩乏力

E. 第一产程延长

17. 此时最恰当的处置应是 ( )

A. 行剖宫产术

B. 静脉滴注缩宫素

C. 严密观察产程情况 (正确答案)

D. 肌注维生素K1

E. 缓慢静注能量合剂

18. 当胎头下降S+3，宫口开大5cm，此时最恰当的处理应是 ( )

- A. 行剖宫产术
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 让产妇用腹压
- D. 温肥皂水灌肠
- E. 人工破膜 (正确答案)

26岁初产妇，妊娠38周，规律宫缩7小时，枕右前位，估计胎儿体重2800g，胎心146次/分。阴道检查：宫口开大3cm，已破膜，S+I，骨盆外测量未见异常。

19.本例应诊断为（）

- A. 第一产程延长
- B. 头盆相对不称
- C. 胎儿生长受限
- D. 子宫收缩乏力
- E. 正常分娩经过 (正确答案)

20.此时恰当处理应是（）

- A. 等待自然分娩 (正确答案)
- B. 静脉滴注麦角新碱
- C. 静脉滴注缩宫素
- D. 抑制宫缩，使其维持至妊娠40周
- E. 行剖宫产术

21.此后宫缩逐渐减弱，产程已17小时，胎膜已破，宫口开大7cm，此时恰当处理应是（）

- A. 静脉滴注缩宫素 (正确答案)
- B. 肌内注射缩宫素
- C. 静注地西洋加速产程进展

- D. 静脉注射麦角新碱
- E. 立即行剖宫产术 ‘

26岁初产妇，妊娠38周，枕左前位。阵发性腹痛，宫缩10分钟一次，持续40秒，宫口开大2cm。

22. 出现上述临床表现的原因可能是（）

- A. 子宫收缩极性异常
- B. 子宫收缩对称性异常
- C. 子宫收缩节律性异常 (正确答案)
- D. 子宫收缩缩复作用异常
- E. 腹肌和膈肌收缩力异常

23. 此时的处理原则应是（）

- A. 静脉滴注缩宫素 (正确答案)
- B. 肌注哌替啶100mg
- C. 人工破膜
- D. 肌注麦角新碱
- E. 立即行剖宫产术

24. 若已进入第二产程，胎先露S+3，胎心良好，此时处理应是（）

- A. 等待自然分娩 (正确答案)
- B. 产钳助产
- C. 胎头吸引器助产
- D. 继续加强宫缩等待分娩
- E. 立即行剖宫产术

25. 若胎头S+5，胎心98次/分，此时处理应是（）

- A. 立即行剖宫产术
- B. 等待自然分娩
- C. 静脉滴注缩宫素加速产程进展
- D. 静注地西洋加速产程进展
- E. 行胎头吸引术 (正确答案)

25. 何项是最常见的产力异常： ( )

- A. 不协调性宫缩乏力
- B. 协调性宫缩乏力 (正确答案)
- C. 协调性宫缩过强
- D. 不协调性宫缩过强
- E. 不规则子宫收缩

27. 在加强子宫收缩的方法中，下列何项应专人监护： ( )

- A. 灌肠
- B. 人工破膜
- C. 针刺
- D. 缩宫素静脉滴注 (正确答案)
- E. 排空膀胱

28. 骨盆径线小于正常可诊断为单纯扁平骨盆的是 ( )

- A. 髂棘间径
- B. 髂嵴间径
- C. 坐骨棘间径 (正确答案)
- D. 骶耻外径
- E. 坐骨结节间径



29. 孕妇坐骨结节间径为7cm，还应测量的骨盆径线是（）

- A. 耻骨弓角度
- B. 出口前矢状径
- C. 坐骨棘间径
- D. 出口后矢状径 (正确答案)
- E. 对角径

30. 临产后胎头迟迟不入盆，测量最有价值的骨盆径线是（）

- A. 对角径
- B. 骶耻外径 (正确答案)
- C. 髌棘间径
- D. 髌嵴间径
- E. 坐骨棘间径

31. 关于骨盆狭窄的诊断正确的是（）

- A. 骨盆各径线比正常值小1cm为均小骨盆
- B. 胎头跨耻征阳性提示骨盆入口狭窄
- C. 真结合径<13cm为骨盆入口狭窄
- D. 坐骨结节间径与后矢状径之和<18cm为骨盆出口狭窄
- E. 坐骨棘间径<10cm (正确答案)

32. 分娩时允许进行“试产”的条件是（）

- A. 枕先露，中骨盆轻度狭窄
- B. 枕先露，骨盆出口轻度狭窄
- C. 枕先露，骨盆入口轻度狭窄 (正确答案)
- D. 臀先露，骨盆入口轻度狭窄
- E. 臀先露，中骨盆轻度狭窄

33.

- A. 子宫收缩力异常
- B. 胎位异常
- C. 病理缩复环
- D. 胎膜早破
- E. 胎头衔接 (正确答案)

34. 30岁初产妇，妊娠40周，宫缩规律，枕左前位，胎心好，肛查宫口开大2cm，胎头未衔接，符合本产妇实际情况的骨盆测量数值应是（）

- A. 髂嵴间径27cm
- B. 髂棘间径24cm
- C. 骶耻外径17cm (正确答案)
- D. 坐骨棘间径10cm
- E. 坐骨结节间径8.5cm

35. 26岁初产妇，妊娠42+1周，规律宫缩10小时。检查胎儿较大估计体重3000g，枕左前位，胎头高浮，胎心率166次/分。骨盆不小，宫口开大2cm，尿雌激素/肌酐比值为7。本例恰当的分娩方式应是（）

- A. 尽快行剖宫产术 (正确答案)
- B. 等待宫口开全行产钳助娩
- C. 等待宫口开全行胎头吸引术助娩
- D. 左侧卧位，吸氧，静注10%葡萄糖液
- E. 静脉滴注缩宫素加速产程

36. 27岁初孕妇，妊娠38周。骨盆外测量，骶耻外径19.5cm，髂棘间径25cm，髂嵴间径28cm，坐骨棘间径9cm，坐骨结节间径7.0cm。该孕妇的骨盆类型为（）

- B.均小骨盆
- C.漏斗型骨盆(正确答案)
- D.佝偻病性扁平骨盆
- E.类人猿型骨盆

37. 25岁初孕妇，妊娠38周，胎头双顶径9.2cm，男型骨盆。预计临产后本例不易发生的项目是（）

- A. 持续性枕横位
- B.持续性枕后位
- C. 第一产程活跃期停滞
- D.第一产程潜伏期延长
- E. 第二产程延长(正确答案)

26岁初产妇，妊娠40周，规律宫缩8小时入院。查：髂棘间径25cm，骶耻外径20cm，坐骨结节间径7.5cm。枕右前位，胎心134次/分。肛查宫口开大4cm，胎先露S=0。3小时后产妇呼叫腹痛难忍，检查宫缩1~2分钟一次，持续45秒，胎心102次/分，子宫下段压痛明显。出现病理缩复环和血尿。肛查宫口开大5cm。

38.此时产程受阻的原因主要是25岁初孕妇，妊娠38周，胎头双顶径9.2cm，男型骨盆。（）

- A. 骨盆入口狭窄
- B.骨盆出口狭窄
- C. 中骨盆狭窄
- D.扁平骨盆
- E. 漏斗骨盆(正确答案)

39.此时最可能的诊断是（）

B.先兆子宫破裂(正确答案)

C.不协调性子宫收缩乏力

D.不协调性子宫收缩过强

E.III度胎盘早剥

40应立即采取的措施是( )

A.立即行剖宫产(正确答案)

B.停止静滴缩宫素

C.立即肌注哌替啶或地西洋

D.即刻作宫缩应激试验,若异常行剖宫产术

E.等待宫口开全行产钳术

41.34岁已婚妇女,孕39周,规律宫缩10小时,破膜3小时入院。检查宫缩持续20—25秒,间歇7—

8分钟,宫口开大8cm,胎心率160次/分,阴道检查坐骨棘稍突,测量坐骨结节间径7.5cm,胎先露S=0。可能的诊断是( )

A.高龄初产

B.骨盆入口狭窄

C.中骨盆和出口狭窄(正确答案)

D.骨盆出口狭窄

E.骨盆入口和出口狭窄

42.头盆不称引起的子宫破裂属下列何项原因:( )

A.子宫本身病变

B.手术损伤

C.子宫收缩剂使用不当

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667115064122006156>