

2024 年福建省新罗区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题真题题库附 参考答案（精练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是

- A: 乙型肝炎病毒 e 抗体
- B: 乙型肝炎病毒 e 抗原
- C: 乙型肝炎病毒表面抗原
- D: 乙型肝炎病毒表面抗体

答案：D

2. 治疗头痛的非处方药应首选

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 谷维素
- D: 布洛芬

答案：B

3. 正常人的体温在 37℃ 左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

- A: 退热属对症治疗，可能掩盖病情，影响疾病诊断
- B: 退热用药可能发生皮疹、哮喘等反应
- C: 退热用药可能导致肝、肾脏损伤

D: 退热用药可能引起胃肠道的损伤

答案：A

4. 有幻觉副作用，不宜与右美沙芬合用的药物是

A: 匹伐他汀

B: 铝碳酸镁

C: 多奈哌齐

D: 美金刚

答案：D

5. 有关尿酮体和尿肌酐的叙述正确的是

A: 尿酮体包括乙酰乙酸、 β -丁酸、丙酮，是体内糖氧化的中间产物

B: 如酮体产生的速度小于组织的利用速度，则血液中的酮体增加出现酮血症

C: 尿肌酐是体内肌酸代谢的最终产物，是脱水缩合物

D: 酮体在肾脏产生，在血液中循环

答案：C

6. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

A: 2HRZE / 4HR

B: 2HRZE / 4HR

C: 3HRZE / 9HR

D: 2HRE / 7HR

答案：B

7. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 左氧氟沙星+阿奇霉素
- B: 阿莫西林-克拉维酸钾+阿奇霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 多西环素

答案：B

8. 易经乳汁分泌的药物的特征是：

- A: 脂溶性大？
- B: 弱酸性？
- C: 蛋白结合率高？
- D: 分子量大？

答案：A

9. (血常规检查异常的病症)恶性肿瘤

- A: 血小板增多
- B: 白细胞增多
- C: 淋巴细胞增多
- D: 红细胞沉降率减慢

答案：B

10. 褪黑素受体激动剂

- A: 唑吡坦
- B: 阿戈美拉汀

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 艾司唑仑

D: 米氮平

答案：B

11. 成人末梢血白细胞(WBC)计数正常参考区间是

A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$

B: 180~220g/L

C: 170~200g/L

D: $(15.0 \sim 20.0) \times$

答案：A

12. 脂质体药物属于

A: B 级高危药品

B: C 级高危药品

C: D 级高危药品

D: E 级高危药品

答案：B

13. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史为防止尿酸结晶和痛风结石的产生，药师应建议患者在服用上述药物时加服

A: 碳酸氢钠

B: 丙磺舒

C: 对乙酰氨基酚

D: 别嘌醇

答案：A

14. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 尿酮体试验
- B: 尿素酶试验
- C: 粪便隐血试验
- D: 尿素呼气试验

答案：D

15. 及时发现并确定“亮菌甲素事件”显示药物警戒的作用是

- A: 药品上市后风险评估
- B: 发现药品质量问题
- C: 药品上市前风险评估
- D: 发现与规避假、劣药品流入市场

答案：D

16. 患者，男，35 岁。血压 180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转化酶抑制剂治疗 3 周后血压降至 120/80mmHg，关于停药的问题应是
A: 继续服药，血压平稳控制 1~2 年后再逐渐减少剂量至停药 1 种药，如血压不稳定，即表明需长期服用能保持血压稳定的最小剂量

B: 可以停药降压药

C: 为避免血压下降过低，应停药

D: 停药后血压增高再服

答案：A

17. 肝功能不全者服用由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物时

A: 必须减量应用

B: 须谨慎使用，必要时减量给药

C: 一般无需调整剂量

D: 避免使用

答案：B

18. “室温”所指温度范围是

A: 30℃～40℃

B: 10℃～30℃

C: 2℃～10℃

D: -5℃～10℃

答案：B

19. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56～1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1～3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2～1.65mmol / L)、血肌酐 50μmol / L(正常参考区间 45～84 μmol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 依折麦布

- B: 非诺贝特
- C: 阿托伐他汀
- D: 普罗布考

答案：C

20. 有卒中病史的急性冠状动脉综合征患者禁用

- A: 替罗非班
- B: 替格瑞洛
- C: 阿司匹林
- D: 普拉格雷

答案：D

21. 已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次 400mg。一个体重为 10kg 的 11 个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

- A: 100mg
- B: 90mg
- C: 50mg
- D: 75mg

答案：A

22. 中枢性降压药是

- A: 胍苯哒嗪
- B: 拉贝洛尔
- C: 利血平
- D: 可乐定

答案：D

23. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 酒
- B: 烟
- C: 咖啡
- D: 浓茶

答案：A

24. 属于 C 级高危药品的是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 血液透析液
- D: 全胃肠外营养液

答案：C

25. 患者,女,47 岁,出现一侧颜面部骤然发作性闪痛,诊断为三叉神经痛,应选用的药物是()

- A: 山莨菪碱
- B: 布洛芬
- C: 卡马西平
- D: 麦角胺咖啡因

答案：C

26. 最容易受湿度影响而变质的药品是

- A: 滴眼剂
- B: 肝素等生物制品
- C: 胰岛素制剂
- D: 水溶性基质栓

答案：D

27. 具有中枢和周围抗多巴胺双重作用的是

- A: 多潘立酮
- B: 西沙必利
- C: 莫沙必利
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

28. 属于选择性雌激素调节因子类药物的是

- A: 阿法骨化醇
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 乳酸钙
- D: 雷洛昔芬

答案：D

29. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段。试验对象主要为健康受试者，试验样本数一般为

- A: 10～18 例
- B: 20～30 例
- C: 12～13 例
- D: 36～40 例

答案：B

30. 一新生儿确诊感染乙型肝炎病毒，提示其生母妊娠期间血清免疫学检查结果应为

- A: HBsAb, HBeAg 均为阳性
- B: HBeAg 为阳性
- C: HBsAg 为阳性
- D: HBsAg, HBeAg 均为阳性

答案：D

31. 男性，72 岁。高血压病 3 年，血压 165/95mmHg，伴 II 型糖尿病。
首选降压药物是

- A: 心痛定
- B: β -受体阻滞剂
- C: 利尿剂
- D: ACEI 类

答案：D

32. 5-HT

- A: 舍曲林
- B: 艾司唑仑
- C: 丁螺环酮
- D: 阿米替林

答案：C

33. 下列具有肝药酶诱导作用的药物中，所抑制的酶系类型最多的是

- A: 苯巴比妥
- B: 利福平
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

答案：B

34. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 抗菌药物
- B: 糖皮质激素

C: 阿司匹林

D: 布洛芬

答案: B

35. 控制癫痫持续状态应入院后首选 ()

A: 静脉注射丙戊酸钠

B: 肌肉注射地西泮

C: 口服硫酸镁

D: 静脉注射地西泮

答案: D

36. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是 ()

A: 心力衰竭

B: 双侧肾动脉狭窄

C: 冠心病

D: 痛风

答案: A

37. 消化性溃疡发病机制中的防御因子为 ()

A: 酒精

B: 前列腺素

C: H. pylori 感染

D: 吸烟

答案: B

38. 可致驾驶员排尿增多、视力改变的是

A: 阿司匹林

- B: 氯苯那敏
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案: C

39. 属于胆酸螯合剂的调节血脂药是

- A: 氯贝丁酯
- B: 阿昔莫司
- C: 考来替泊
- D: 依折麦布

答案: C

40. 下列足癣类型中，以冬季多见或加重的是

- A: 间擦型
- B: 水疱型
- C: 角化型
- D: 鳞屑型

答案: C

41. 在妊娠期可致颅骨和面部畸形、腭裂的药是

- A: 沙立度胺
- B: 雄激素
- C: 孕激素
- D: 叶酸拮抗剂

答案: D

42. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 ()

- A: 二巯丁二钠

- B: 乙酰胺
- C: 纳洛酮
- D: 氟马西尼

答案：A

43. (在乳汁中排泄的药物) 青霉素较难在乳汁中出现的机制是青霉素

- A: 呈弱碱性
- B: 呈弱酸性
- C: 在脂肪与水中都有一定的溶解度
- D: 脂溶性高

答案：B

44. 饮茶可减少其吸收的药物是

- A: 硫酸亚铁
- B: 阿莫西林
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 去氨加压素

答案：A

45. 用药时宜限制饮水的药物是 ()

- A: 苯溴马隆胶囊
- B: 利托那韦片
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 环丙沙星片

答案：C

46. 水溶性基制软膏应存放于 ()。

- A: 凉暗库

- B: 常温库
- C: 低温库
- D: 专用仓库

答案：B

47. 由美国卫生系统药师协会出版的《HandbookoninjectableDrug》袖珍本的中译本是

- A: 《Trissel 注射药物手册》
- B: 《注射药物手册》
- C: 《药品注射剂使用指南》
- D: 《Trissel 混合组分的稳定性》

答案：C

48. 粪便隐血可见于

- A: 痛经
- B: 胃溃疡
- C: 口腔溃疡
- D: 湿疹

答案：B

49. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的药物信息来源是

- A: 《马丁代尔药物大典》
- B: 《中国国家处方集》
- C: 《英国国家处方集》
- D: 《医师案头参考》

答案：A

50. (消化性溃疡并发症)，穿孔

- A: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血
- B: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物
- C: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- D: 规律性上腹痛

答案：C

51. 服用维生素 B

- A: 食醋
- B: 酒
- C: 食盐
- D: 脂肪

答案：B

52. 关于改善认知功能的药物治疗，下列说法不正确的为

- A: 卡巴拉汀于早晨和晚上与食物同服
- B: 帕罗西汀可使加兰他敏作用增强
- C: 氯化铵抑制美金刚的排泄
- D: 应用多奈哌齐时要监测胃出血

答案：C

53. 属于一级文献的是

- A: 《中国新药》
- B: 《中国药学文摘》
- C: 《中文科技资料目录：中草药》
- D: 《国际药学文摘》

答案：A

54. 一 2 型糖尿病患者，伴高血压、高胆固醇血症，如有胃部不适或感冒即需联合用药。对该患者的用药教育应该是适宜餐后服用的药品是

- A: 呋塞米
- B: 普伐他汀
- C: 阿司匹林
- D: 格列美脲

答案：C

55. 若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

- A: 餐中服用
- B: 餐后服用
- C: 餐前服用
- D: 清晨服用

答案：C

56. 为防止血管扩张、促进毒物吸收，应用 1%氯化钠溶液洗胃应该避免的是

- A: 溶液事先加热
- B: 最多不超过 500ml
- C: 减小注入压力
- D: 多次反复进行冲洗

答案：A

57. 在乳汁中较难排泄的弱酸性抗生素是

- A: 青霉素 G
- B: 四环素

C: 红霉素

D: 氯霉素

答案: A

58. 成人血小板计数正常参考区间是

A: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$

B: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$

C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

D: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

答案: A

59. (2019 年真题) 处方中外文缩写 p

A: 代表

B: 必要时

C: 临睡时

D: 微克

答案: C

60. 用前摇匀，尽量将痰液咳出、口内的食物咽下，含激素类制剂用后以温水漱口

A: 气雾剂

B: 阴道栓剂

C: 膜剂

D: 泡腾片

答案: A

61. 发热在应用解热镇痛药时，老年人的用药时间间隔是

A: 2~5 小时

B: 3~6 小时

C: 4~6 小时

D: 3~5 小时

答案: C

62. 6 岁以下的儿童应该慎用的抗过敏药品是

A: 依巴斯汀

B: 氯雷他定

C: 四环素

D: 庆大霉素

答案: A

63. 选择药物的首要标准是药物治疗的

A: 有效性

B: 适宜性

C: 安全性

D: 经济性

答案: A

64. 降低夜间的眼压作用强，尤其用于其他降眼压药不能耐受的患者的药物是

A: 溴莫尼定

B: 拉坦前列素

C: 毛果芸香碱

D: 噻吗洛尔

答案: B

65. 影响肝药酶活性，药物疗效降低

- A: 呋塞米
- B: 地西泮
- C: 氨茶碱
- D: 胰岛素

答案：B

66. 对于化疗药物引起的呕吐，正确的用药方法对严重呕吐，可给予

- A: 羧甲司坦
- B: 苯海拉明
- C: 昂丹司琼
- D: 阿瑞吡坦

答案：C

67. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: 胃溃疡？
- B: 十二指肠溃疡？
- C: 萎缩性胃炎？
- D: 浅表性胃炎？

答案：B

68. 以下用于治疗寻常型痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 阿达帕林
- B: 维胺酯
- C: 过氧苯甲酰
- D: 异维 A 酸

答案：C

69. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是（）

- A: 依非韦伦
- B: 利托那韦
- C: 利巴韦林
- D: 齐多夫定

答案：A

70. 糖尿病合并肾病者首选

- A: 阿卡波糖
- B: 格列喹酮
- C: 二甲双胍
- D: 比格列酮

答案：B

71. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐前 0.5~1 小时
- B: 餐前
- C: 餐后
- D: 餐后 1 小时

答案：A

72. 痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

- A: 苯溴马隆
- B: 别嘌醇
- C: 泼尼松龙
- D: 秋水仙碱

答案：A

73. 与诺氟沙星合用可提高对致病性细菌感染的疗效的是

- A: 酚酞
- B: 地芬诺酯
- C: 八面体蒙脱石
- D: 莫沙必利

答案：C

74. 对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

- A: 早晨用贝特类，晚上用他汀类
- B: 早晚联合服用他汀类和贝特类
- C: 早晨用他汀类，晚上用贝特类
- D: 晚上联合服用他汀类和贝特类

答案：A

75. 胃食管反流病患者应避免服用的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 特拉唑嗪
- D: 关托洛尔

答案：B

76. 患者男 56 岁因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊查体舌面光滑，呈牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降，下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是()

- A: 二甲双胍
- B: 对氨基水杨酸
- C: 氨氯地平
- D: 奥美拉唑

答案：C

77. 避免碘摄入过多，甲亢患者应尽量避免服用的药物是

- A: 氯吡格雷
- B: 胺碘酮
- C: 阿托伐他汀钙
- D: 链激酶

答案：B

78. 绝经激素治疗(MHT)应禁用的人群是

- A: 6 个月内有静脉血栓栓塞性疾病史的患者
- B: 甲状腺切除术后的患者
- C: 合并高胆固醇血症的患者
- D: 合并轻度高血压的患者

答案：A

79. 引起白细胞增多的常见疾病可能是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 肺炎
- C: 肺结核
- D: 病毒性感冒

答案：B

80. 老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 双嘧达莫
- C: 哌替啶
- D: 苯二氮革类药

答案：D

81. 乙型肝炎病毒 e 抗体为

- A: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标
- B: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标
- C: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物
- D: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标

答案：D

82. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次 / 分、R20 次 / 分、BP110 / 70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次 / 分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 克拉霉素 500mgbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程 2 周
- B: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

C: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid, 疗程 2 周

D: 阿莫西林 1000mgbid+克拉霉素 500mgbid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid, 疗程 2 周

答案: B

83. (痛风的不同分期的治疗原则), 哪个时期的治疗原则是以控制关节炎症(红肿、疼痛)为目的, 尽早使用抗炎药

A: 急性发作期

B: 发作间歇期

C: 痛风性肾病治疗期

D: 首次发作期

答案: A

84. 告知"培高利特致心脏瓣膜病风险已经撤市"属于

A: 合理用药信息

B: 禁忌证

C: 药品不良反应

D: 药物相互作用

答案: C

85. 阿卡波糖可能导致的不良反应是

A: 腹胀、肠鸣音亢进

B: 心力衰竭和水肿

C: 肌痛、关节痛和高血压

D: 消化道反应、过敏和白细胞减少

答案: A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/667132141050010024>