

## 2024 年安徽省杜集区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题完整版附答案（轻巧夺冠）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 拓扑异构酶抑制剂

- A: 环磷酰胺
- B: 喜树碱类
- C: 顺铂
- D: 丝裂霉素

答案：B

2. 作用于远曲小管近端的中效利尿药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

3. 催产和引产不适用麦角新碱的原因是

- A: 维持时间短
- B: 孕妇血压升高
- C: 子宫强直性收缩
- D: 抑制胎儿呼吸

答案：C

4. 长春碱可用于治疗()。

- A: 急性淋巴细胞白血病
- B: 绒毛膜上皮癌
- C: 晚期前列腺癌
- D: 晚期睾丸肿瘤

**答案：D**

5. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12 小时以上间歇期的药物是()

- A: 依那普利
- B: 硝酸甘油
- C: 氨氯地平
- D: 哌唑嗪

**答案：B**

6. 抗酸作用较强，有收敛、止血和引起便秘作用

- A: 三硅酸镁
- B: 氢氧化铝
- C: 氢氧化镁
- D: 碳酸钙

**答案：B**

7. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞  $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑可使华法林代谢加快
- B: 氟康唑抑制卡马西平代谢
- C: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿
- D: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖

**答案：A**

8. 关于唑吡坦作用特点的说法, 错误的是()

- A: 唑吡坦属于  $\gamma$ -氨基丁酸 A 型受体激动剂
- B: 口服唑吡坦后消化道吸收迅速
- C: 唑吡坦具有镇静催眠作用, 抗焦虑作用
- D: 唑吡坦血浆蛋白结合率高

**答案：C**

9. 长春碱使细胞有丝分裂停止于

- A: M 期
- B: G1 期
- C: G0 期
- D: S 期

**答案：A**

10. 为避免继发真菌感染, 使用后应立即漱口的药物是

- A: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- B: 羧甲司坦口服液
- C: 孟鲁司特片
- D: 沙丁胺醇气雾剂

**答案：A**

11. 紧急降低眼压首选的药物是

- A:  $\beta$ -受体阻断剂
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: 拟 M 胆碱药
- D: 20%甘露醇

**答案：D**

12. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括()

- A: 避光使用
- B: 监测血压
- C: 缓慢静脉注射
- D: 血硫氰酸盐水平

**答案：C**

13. 甲状腺素的合成需要()

- A: 蛋白水解酶
- B: 碳酸酐酶
- C: 过氧化物酶
- D: 环氧化酶

**答案：C**

14. 维生素 B12 主要用于治疗的疾病是

- A: 巨幼细胞性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 慢性失血性贫血
- D: 缺铁性贫血

**答案：A**

15. 氢氯噻嗪的利尿作用机制是

- A: 抑制肾小管碳酸酐酶
- B: 抑制髓袢升支粗段的 Na
- C: 对抗醛固酮的 K
- D: 抑制远曲小管近端的 Na

**答案：D**

16. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

- A: 一日一次，晨起使用
- B: 一日一次，睡前使用
- C: 一日二次，早、晚使用
- D: 一日一次，固定时间使用

**答案：B**

17. 具有耳毒性的是()

- A: 呋塞米
- B: 螺内酯
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

**答案：A**

18. 糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 硫酸镁
- C: 甘油
- D: 乳果糖

**答案：C**

19. 属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常的药物是

- A: 奎尼丁
- B: 普罗帕酮
- C: 普鲁卡因胺
- D: 胺碘酮

**答案：D**

20. 可中效、稳定的降低糖化血红蛋白的是

- A: 西格列汀
- B: 吡格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 胰岛素皮下注射

**答案：A**

21. （2015 年真题）应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是（ ）。

- A: 人表皮生长因子受体-2
- B: 血管内皮生长因子
- C: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- D: 表皮生长因子受体

**答案：A**

22. （2020 年真题）哮喘急性发作首选的药物是

- A: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 孟鲁司特片
- D: 羧甲司坦口服液

**答案：B**

23. (2016 年真题) 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

- A: 依那普利
- B: 坦洛新 (坦索罗辛)
- C: 替米沙坦
- D: 哌唑嗪

**答案: C**

24. 甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

- A: 甲状腺素
- B: 甲巯咪唑
- C: 小剂量碘
- D: 大剂量碘

**答案: B**

25. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌

- A: 已使用西地那非者
- B: 严重低血压者
- C: 青光眼患者
- D: 急性前壁心肌梗死

**答案: D**

26. 血浆蛋白结合率低，易透过血-脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺多辛
- C: 复方新诺明
- D: 甲氧苄啶

**答案: A**

27. 不耐酸，口服剂型多制成酯化物，为肝药酶抑制剂的药物是

- A: 氨曲南
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 克林霉素

**答案：C**

28. (2020 年真题) 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 二甲双胍
- C: 华法林
- D: 阿司匹林

**答案：A**

29. 关于帕罗西汀的描述，错误的是

- A: 停药时应缓慢减量至停药
- B: 用于治疗抑郁症、强迫症、惊恐障碍及社交恐怖障碍等
- C: 停药时直接停药
- D: 本品为选择性 5-HT 再摄取抑制剂

**答案：C**

30. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 枸橼酸他莫昔芬
- B: 吉非替尼
- C: 巯嘌呤
- D: 紫杉醇

**答案：A**

31. 关于 NSAIDS 类药物所致不良反应的说法，正确的是()

- A: NSAIDs 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见
- B: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险
- C: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂
- D: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物

**答案：B**

32. 对视网膜的功能起重要作用的是

- A: 视黄醛
- B: 视黄醇
- C: 视黄酸
- D: 维生素 A

**答案：D**

33. 四环素的抗菌作用机制

- A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性
- B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- D: 影响胞浆膜通透性

**答案：C**

34. (2021 年真题) 痰培养结果为铜绿假单胞菌，宜选用的抗菌药物是()

- A: 青霉素 G
- B: 哌拉西林他唑巴坦

C: 苯唑西林

D: 苄星青霉素

**答案: B**

35. 属于促动力药的是()

A: 莫沙必利

B: 奥美拉唑

C: 胶体果胶铋

D: 胃蛋白酶

**答案: A**

36. 柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

A: 环磷酰胺

B: 多柔比星

C: 甲氨蝶呤

D: 阿糖胞苷

**答案: B**

37. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药的是()。

A: 索他洛尔

B: 利多卡因

C: 硝酸甘油

D: 美托洛尔

**答案: B**

38. 可用于治疗阴茎勃起功能障碍的药物是

A: 他达拉非

B: 丙酸睾酮

C: 炔诺酮

D: 米非司酮

**答案: A**

39. (2016 年真题) 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食、增加运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗

A: CK

B: BUN

C: Hcy

D: Cr

**答案: A**

40. 下列属于  $\beta$  受体阻断剂的是

A: 美托洛尔

B: 卡托普利

C: 螺内酯

D: 阿利吉仑

**答案: A**

41. 对  $\beta$ -内酰胺酶有抑制作用，属于青霉素类结构的药物是()

A: 克拉维酸

B: 他唑巴坦

C: 氨曲南

D: 美罗培南

**答案: B**

42. 氢氯噻嗪的药理作用是()

- A: 抑制近曲小管的碳酸酐酶活性
- B: 抑制远曲小管 Na
- C: 与醛固酮受体结合
- D: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用

**答案：B**

43. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

- A: 米力农
- B: 洋地黄毒苷
- C: 多巴酚丁胺
- D: 地高辛

**答案：B**

44. 可增强糖尿病患者口服磺酰脲类药降糖作用，引起严重低血糖的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 甘草酸二铵
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多烯磷脂酰胆碱

**答案：A**

45. 耐青霉素酶青霉素类的是

- A: 苯唑西林
- B: 哌拉西林
- C: 青霉素 V
- D: 氨苄西林

**答案：A**

46. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A: 盐酸洛哌丁胺胶囊
- B: 双八面体蒙脱石散
- C: 双歧三联活菌胶囊
- D: 地衣芽孢杆菌胶囊

**答案：A**

47. 下列抗心律失常药中，属于 Ia 类钠通道阻滞药的是()

- A: 普罗帕酮
- B: 利多卡因
- C: 奎尼丁
- D: 苯妥英钠

**答案：C**

48. 干扰核酸生物合成的药物是()

- A: 氟尿嘧啶
- B: 顺铂
- C: 高三尖杉酯碱
- D: 多柔比星

**答案：A**

49. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: M 受体阻断剂
- D:  $\beta$  受体激动剂

**答案：A**

50. 可降低外周血管阻力,还可减轻前列腺增生症状的药物是()

- A: 格列吡嗪
- B: 哌唑嗪
- C: 坎地沙坦
- D: 利血平

**答案: B**

51. 使用氢化可的松大剂量冲击治疗时,用药时间一般不超过

- A: 5 日
- B: 3 日
- C: 1 日
- D: 7 日

**答案: B**

52. 出现流感样综合征,寒战、发热的药物是()

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 链霉素
- D: 对氨基水杨酸

**答案: A**

53. 容积性泻药()

- A: 甘油
- B: 地芬诺酯
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

**答案: C**

54. 属于阴道杀精药的是

- A: 左炔诺孕酮
- B: 氯地孕酮
- C: 壬苯醇醚
- D: 米非司酮

**答案：C**

55. 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

- A: 预防过敏反应
- B: 预防癌症复发
- C: 预防粒细胞缺乏
- D: 预防出血过多

**答案：C**

56. 戒断症状是 5-HT 再摄取抑制剂较常见的不良反应，产生的原因是

- A: 长期服用药物对 5-HT 受体无亲和力
- B: 长期服用使脑内 5-HT 受体敏感性下调
- C: 长期服用脑内 5-HT 受体数目减少
- D: 长期服用致 5-HT、NE、DA 分解增加

**答案：B**

57. （2019 年真题）长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是（）

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 A
- C: 维生素

D: 维生素 B6

**答案：C**

58. 下列关于镇痛药物的禁忌证，错误的是

- A: 多痰患者禁用可待因
- B: 室上性心动过速禁用哌替啶
- C: 心源性哮喘禁用吗啡
- D: 颅脑损伤患者禁用羟考酮

**答案：C**

59. 配制静脉输液时；应先用灭菌注射用水溶解，然后用 5%葡萄糖注射液稀释，不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是()

- A: 两性霉素 B
- B: 氟康唑
- C: 伏立康唑
- D: 卡泊芬净

**答案：A**

60. 长期大量服用维生素 E 会出现

- A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- C: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

**答案：D**

61. 对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

- A: 丙戊酸钠

- B: 乙琥胺
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

**答案：A**

62. 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是（）

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 利福平
- D: 链霉素

**答案：D**

63. 疗效优于乙琥胺，但因有肝毒性，仅在癫痫小发作合并大发作时应用的药物是

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 苯巴比妥

**答案：A**

64. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 吸入性糖皮质激素
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: 短效 B<sub>2</sub> 受体激动剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

**答案：C**

65. 氨基糖苷类抗菌药无效的是（）

- A: 需氧革兰阴性菌
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 厌氧菌和肠球菌
- D: 结核杆菌

**答案：C**

66. 患儿，5 岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

- A: 与核蛋白 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成
- B: 与核蛋白 70S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成
- C: 与核蛋白 50S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成
- D: 抑制细菌蛋白质合成全过程

**答案：C**

67. 高效选择性 5-HT

- A: 西沙必利
- B: 莫沙必利
- C: 多潘立酮
- D: 甲氧氯普胺

**答案：B**

68. 临床上用于治疗躁狂症的是

- A: 硫酸镁
- B: 卡巴西平
- C: 苯巴比妥
- D: 苯妥英钠

**答案：B**

69. 螺内酯临床常用于()

- A: 急性肾衰竭
- B: 尿崩症
- C: 脑水肿
- D: 醛固酮升高引起的水肿

**答案: D**

70. 下列哪项不是血管紧张素转化酶抑制药的主要临床应用()

- A: 充血性心力衰竭
- B: 心律失常
- C: 心肌梗死
- D: 高血压

**答案: B**

71. 以下哪种心律失常禁用强心苷

- A: 室性心动过速
- B: 心房颤动
- C: 室上性心动过速
- D: 心房扑动

**答案: A**

72. 又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

- A: 小檗胺
- B: 维生素 B4
- C: 丙酸诺龙
- D: 鲨肝醇

**答案: B**

73. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是

- A: 苯唑西林
- B: 青霉素 V
- C: 美西林
- D: 匹氨西林

**答案：C**

74. 治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 磺胺米隆

**答案：C**

75. (2019 年真题) 长期服用呋塞米，易发生的不良反应是()

- A: 高钠血症
- B: 高氯血症
- C: 低尿酸血症
- D: 低钾血症

**答案：D**

76. (2019 年真题) 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是()

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

**答案：D**

77. (2020 年真题) 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 克林霉素
- C: 头孢呋辛
- D: 磺胺甲噁唑

**答案：D**

78. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

- A: 磷酸二酯酶
- B:  $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$  同向转运子
- C: 碳酸酐酶
- D:  $\text{Na}^+-\text{Cl}^-$  共转运子

**答案：D**

79. 属于利胆类保肝药的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 甘草酸二铵
- D: 熊去氧胆酸

**答案：D**

80. 属于电解质补充药，可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是()

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 双环醇
- C: 门冬氨酸钾镁

D: 异甘草酸镁

**答案: C**

81. (2016 年真题) 哮喘急性发作首选的治疗药物是

A: 吸入性糖皮质激素

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 白三烯受体阻断剂

D: 短效  $\beta_2$  受体激动剂

**答案: D**

82. 为光学异构体的氟喹诺酮类药物是()

A: 左氧氟沙星

B: 呋喃妥因

C: 磺胺嘧啶

D: 氯霉素

**答案: A**

83. 易导致血糖异常的药品是

A: 头孢哌酮

B: 庆大霉素

C: 多西环素

D: 加替沙星

**答案: D**

84. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是()

A: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

B: 肾功能不全者可以使用

C: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24 小时尿量及尿颜色

D: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

**答案：B**

85. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是

A: 便秘

B: 低血压

C: 躁狂

D: 胆绞痛

**答案：B**

86. 右旋体是产生神经毒性的主要根源，故开发其左旋体，用于治疗敏感厌氧菌引起的多种感染性疾病的药物是

A: 替硝唑

B: 奥硝唑

C: 多黏菌素

D: 甲硝唑

**答案：B**

87. 下列关于睾酮替代治疗的描述，正确的是()

A: 通过提高性欲治疗继发性勃起功能障碍

B: 对年轻患者的作用较老年患者更显著

C: 可直接改善勃起功能障碍

D: 不能改善性腺功能低下

**答案：A**

88. 排痰功能不良引起的痰液黏稠而不易咳出者可选用

A: 喷托维林

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 噻托溴铵

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/668012045046007022>