

2023-24 年山西省黎城县《执业药师之西药学专业二》考试内部题库附答案（综合题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列不属于一线抗结核药的是

- A: 乙硫异烟胺
- B: 链霉素
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福平

答案：A

2. 双炔失碳酯需服满的片数是

- A: 7 片
- B: 12 片
- C: 14 片
- D: 6 片

答案：B

3. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂
- B: 定期监测电解质、肾功能
- C: 肾功能不全者可以使用
- D: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

答案：C

4. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

- A: 双嘧达莫
- B: 阿替普酶
- C: 氯吡格雷
- D: 阿司匹林

答案：C

5. 与噻嗪类利尿剂合用易发生高钙血症的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 枸橼酸铍钾
- C: 莫沙必利
- D: 奥关拉唑

答案：A

6. 无孕激素活性具有抗着床作用的避孕药是

- A: 双炔失碳酯
- B: 戈那瑞林
- C: 溴隐亭
- D: 绒促性素

答案：A

7. 丙磺舒与水杨酸盐和阿司匹林合用()

- A: 代谢加速而导致意外怀孕
- B: 代谢加快而失效
- C: 抑制排酸作用
- D: 子宫内膜突破性出血

答案：C

8. 吗啡的镇痛作用机制主要是

- A: 诱发精神错乱
- B: 加重呼吸抑制
- C: 增强止痛效果
- D: 增强镇静作用

答案：D

9. 以下属于袢利尿剂禁忌证的是

- A: 高钾血症
- B: 高血压
- C: 对磺胺过敏的患者
- D: 高血糖

答案：C

10. (2017 年真题) 应用维生素 B12 治疗巨幼红细胞性贫血 48 小时内，应监测的电解质是 ()

- A: 钾
- B: 钠
- C: 钙
- D: 锂

答案：A

11. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 吲达帕胺
- B: 氨苯蝶啶
- C: 乙酰唑胺

D: 呋塞米

答案：D

12. 抑制真菌中由细胞色素 P450 介导的 14 α -甾醇去甲基化，从而抑制真菌细胞膜主要固醇类——麦角固醇的生物合成，损伤真菌细胞膜并改变其通透性，以致细胞内重要物质摄取受影响或流失而使真菌死亡的是

A: 两性霉素

B: 氟胞嘧啶

C: 万古霉素

D: 伊曲康唑

答案：D

13. 克拉霉素与环孢素合用()

A: 后者血药浓度下降，药效降低

B: 不良反应叠加

C: 药理作用拮抗

D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：D

14. 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 长效 B₂ 受体激动剂

C: 白三烯受体阻断剂

D: M 胆碱受体阻断剂

答案：D

15. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片成分中增加了

- A: 甲羟孕酮和炔雌醇
- B: 炔雌醇
- C: 维生素 B6
- D: 去氧孕烯

答案：C

16. ACEI 与其联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用的是()

- A: 人促红素
- B: β 受体阻断药
- C: 留钾利尿药
- D: 噻嗪类利尿药

答案：A

17. 柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

- A: 多柔比星
- B: 环磷酰胺
- C: 阿糖胞苷
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

18. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮
- B: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发
- C: 易引起直立性低血压
- D: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PSA) 水平

答案：C

19. 易透过血脑屏障用于治疗普通型奈瑟球菌脑脊髓膜炎的药物是

- A: 磺胺多辛
- B: 甲氧苄啶
- C: 磺胺嘧啶
- D: 复方新诺明

答案：C

20. 关于地高辛作用特点的说法,正确的是()

- A: 地高辛通过激动 Na,K
- B: 地高辛口服生物利用度小于 50%
- C: 地高辛消除半衰期为 12h
- D: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢,以原形药物从肾脏排泄

答案：D

21. (2017 年真题) 奎宁或氯喹日剂量超过 1g 或持续长时间应用, 可见耳鸣、头疼、视力与听力减退等, 停药后即可恢复, 临床成为 ()

- A: 郝氏反应
- B: 神经毒性反应
- C: 双硫仑样反应
- D: 金鸡纳反应

答案：D

22. 用于耐甲氧西林的金葡萄菌引起的严重感染()

- A: 万古霉素
- B: 红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 克林霉素

答案：A

23. 作用于二氢叶酸合成酶，干扰叶酸合成的第一步的是

- A: 莫西沙星
- B: 替硝唑
- C: 磺胺甲噁唑 (SMZ)
- D: 甲氧苄啶 (TMP)

答案: C

24. 适用于合并有肾功能损害的高血压患者的药物是

- A: 卡维地洛
- B: 多巴酚丁胺
- C: 氯沙坦
- D: 维拉帕米

答案: C

25. 关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

- A: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药
- B: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快德收育
- C: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用
- D: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%

答案: C

26. 缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B12
- C: 叶酸
- D: 铁剂

答案: D

27. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

- A: 沙美特罗
- B: 多索茶碱
- C: 噻托溴铵
- D: 孟鲁司特

答案：C

28. 头孢唑林

- A: 肾毒性较大
- B: 用于非典型病原体感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：A

29. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是

- A: 匹氨西林
- B: 苯唑西林
- C: 美西林
- D: 青霉素 V

答案：C

30. 属于 PD-1 抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是()

- A: 巯嘌呤
- B: 环磷酰胺
- C: 氟尿嘧啶
- D: 纳武利尤单抗

答案：D

31. 关于地高辛作用特点的说法，正确的是

- A: 地高辛静脉注射后作用持续时间为 2-3h
- B: 地高辛口服生物利用度小于 50%
- C: 地高辛通过激动 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶增强心肌收缩力
- D: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢，以原型药物从肾脏排泄

答案：D

32. 治疗急慢性肾衰竭的首选药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氯噻酮类
- C: 呋塞米
- D: 氨苯蝶啶

答案：C

33. 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是()。

- A: 硝酸甘油
- B: 索他洛尔
- C: 美托洛尔
- D: 利多卡因

答案：B

34. 关于利多卡因的叙述正确的是

- A: 可治疗阵发性室上性心动过速
- B: 为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常
- C: 可用于房颤的复律治疗和复律后的维持
- D: 可治疗房性期前收缩

答案：B

35. 肺栓塞静脉溶栓更有效的是()

- A: 磺达肝癸钠
- B: 尿激酶
- C: 肝素
- D: 华法林

答案: B

36. (2020 年真题) 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 万古霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 阿奇霉素
- D: 米诺环素

答案: A

37. 关于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

- A: 口服吸收较少
- B: 用于餐后高血糖
- C: 易导致低血糖
- D: 适用于老年人

答案: C

38. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 奈替米星
- C: 红霉素
- D: 阿莫西林

答案：A

39. 下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是()

- A: 可以肌肉注射，禁止直接静脉注射
- B: 可以肌肉注射，也可以直接静脉注射
- C: 严禁肌肉注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注
- D: 禁止肌肉注射，可以直接静脉注射

答案：C

40. 治疗伤寒、副伤寒，且有耳毒性的药物是

- A: 氯霉素
- B: 加替沙星
- C: 青霉素
- D: 红霉素

答案：A

41. 肝功能不全、哺乳期妇女禁用()

- A: 利福平
- B: 氯霉素
- C: 夫西地酸
- D: 四环素可的松

答案：C

42. 调血脂药中，升高 HDL-ch 作用最强，且具有降低脂蛋白 a 作用的是

- A: 阿昔莫司
- B: 依折麦布
- C: 苯扎贝特

D: 烟酸

答案：D

43. (2018 年真题) 不属于血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 类药物作用特点是 ()

A: ACEI 对肾脏有保护作用

B: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

C: ACEI 可引起反射性心率加快

D: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大

答案：C

44. 属于硝基咪唑类的是 ()

A: 呋喃妥因

B: 甲硝唑

C: 磺胺甲噁唑

D: 夫西地酸

答案：B

45. 属于靶向抗肿瘤药物的是

A: 吉非替尼

B: 昂丹司琼

C: 紫杉醇

D: 多柔比星

答案：A

46. 下列不属于硝基呋喃类抗菌药物的不良反应是 ()

A: 发热

B: 呕吐、食欲减退

C: 头痛

D: 腹泻

答案: A

47. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

A: 罗格列酮

B: 阿卡波糖

C: 西格列汀

D: 二甲双胍

答案: B

48. 下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

A: 诺氟沙星

B: 氧氟沙星

C: 环丙沙星

D: 氟罗沙星

答案: B

49. 患者。女,43 岁,左乳浸润性导管癌术后放、化疗 3 年后复发左肺门、左锁骨上、左腋窝淋巴结转移现采用卡培他滨+多西他赛行复发后第一周期化疗化疗后第 2 日,患者出现重度恶心、呕吐,根据化疗药物致吐分级,宜选用的对症治疗药物是 ()

A: 甲氧氯普胺

B: 昂丹司琼

C: 地塞米松

D: 奥美拉唑

答案: B

50. 阿哌沙班属于

- A: 直接凝血酶抑制剂
- B: 维生素 K 拮抗剂
- C: 促凝血因子合成药
- D: 凝血因子 Xa 抑制剂

答案：D

51. (2019 年真题) 患者，男，67 岁，为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者，如果使用复方磺胺甲噁唑，可能引发的药源性疾病是 ()

- A: 红人综合征
- B: 急性溶血性贫血
- C: 肌肉震颤
- D: 抗生素相关性腹泻

答案：B

52. 适宜睡前服用，用于抑制"酸突破现象"的抑酸剂是 ()。

- A: 雷尼替丁
- B: 乳酸菌素
- C: 泮托拉唑
- D: 前列地尔

答案：A

53. 关于容积性泻药的叙述，错误的是

- A: 促进钙和铁的吸收
- B: 主要用于轻度便秘患者的治疗
- C: 可能会影响华法林的吸收
- D: 服用容积性泻剂的同时应摄入足够水分

答案：A

54. 利血平与布洛芬合用

- A: 首剂量低血压反应
- B: 降压效应减弱
- C: 钠水潴留
- D: 口干、便秘、发热

答案：B

55. 患者女,32 岁,孕 2 周既往有癫痫病史长期服用卡马西平治疗为防止引起新生儿出血,该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

- A: 维生素 D
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 K
- D: 叶酸

答案：C

56. 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是()

- A: 头孢他啶
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢米诺
- D: 头孢唑林

答案：A

57. 华法林应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 氨基己酸
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素 K

答案：D

58. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：
二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。

- A: 餐后半小时
- B: 餐前 2 小时
- C: 餐后 1 小时
- D: 餐前 1 分钟

答案：D

59. 以下哪个选项不是二磷酸果糖的不良反应

- A: 低钠及低磷血症
- B: 乳酸中毒
- C: 尿潜血、血色素尿
- D: 低钾血症

答案：A

60. （2019 年真题）为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是（）

- A: 美司钠
- B: 氯化钾
- C: 二甲双胍
- D: 螺内酯

答案：A

61. 幼儿甲状腺素不足易患

- A: 黏液性水肿
- B: 单纯性甲状腺肿

C: 呆小病

D: 侏儒症

答案: C

62. 焦虑型、夜间醒来次数较多者

A: 谷维素

B: 氟西泮

C: 夸西泮

D: 氯美扎酮

答案: B

63. 患儿，女，8岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

A: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

B: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

C: 干扰细菌细胞壁合成

D: 干扰 DNA 的合成

答案: C

64. 雷尼替丁在使用中应注意

A: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

B: 糖尿病患者避免使用

C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D: 对食管有刺激性，需整片吞服

答案: B

65. 属于二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂的是

A: 罗格列酮

- B: 瑞格列奈
- C: 格列美脲
- D: 沙格列汀

答案：D

66. 布地奈德口服给药的效能约为皮质醇的

- A: 40 倍
- B: 100 倍
- C: 25 倍
- D: 15 倍

答案：C

67. 破坏 DNA 结构和功能的抗恶性肿瘤药是

- A: 5-氟尿嘧啶
- B: 多柔比星
- C: 环磷酰胺
- D: 吉非替尼

答案：C

68. (2019 年真题) 长期用药易发生低镁血症的药物是 ()

- A: 替普瑞酮
- B: 奥美拉唑
- C: 复方碳酸钙
- D: 胶体果胶铋

答案：B

69. 关于镇咳药作用强度的比较，正确的是

- A: 苯丙哌林>可待因>喷托维林

B: 可待因>苯丙哌林>喷托维林

C: 喷托维林>苯丙哌林>可待因

D: 苯丙哌林>喷托维林>可待因

答案：A

70. 适用于吸烟的老年哮喘患者，且不易产生耐受性的药物是

A: 特布他林

B: 沙美特罗

C: 布地奈德

D: 异丙托溴铵

答案：D

71. 硫脲类最重要的不良反应是

A: 粒细胞下降

B: 甲状腺素

C: 血管神经性水肿

D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

72. 止吐方案：每日化疗前，应用 5-HT

A: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

B: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

C: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

D: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：C

73. 治疗伤寒、副伤寒的首选药物是

A: 青霉素

B: 氯霉素

C: 磺胺嘧啶

D: 红霉素

答案：B

74. 糖皮质激素的药理作用不包括

A: 抗休克

B: 抗炎

C: 抗病毒

D: 免疫抑制

答案：C

75. ()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

A: 克拉霉素

B: 红霉素

C: 克林霉素

D: 万古霉素

答案：B

76. 婴儿尿布皮炎外用激素制剂应限于

A: 3~5 天

B: 2 周

C: 3 天

D: 5~7 天

答案：D

77. (2021 年真题) 影响熊去氧胆酸的吸收，不宜同时服用的药物 ()

- A: 昂丹司琼
- B: 双歧杆菌三联活菌
- C: 氢氧化铝
- D: 利那洛肽

答案：C

78. (2019 年真题) 可用于预防风湿热复发的药物是 ()

- A: 呋喃妥因
- B: 苄星青霉素
- C: 庆大霉素
- D: 甲硝唑

答案：B

79. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院，血压 203/110mmHg，该患者宜首选（如果疗程超过 2 小时需密切监测血中硫氰酸盐水平）的降压药物是 ()

- A: 硝普钠
- B: 氨氯地平
- C: 贝那普利
- D: 美托洛尔

答案：A

80. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 羟甲唑啉
- B: 酚甘油滴耳液
- C: 赛洛唑啉
- D: 麻黄碱

答案：A

81. (2021 年真题) 可干扰转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药物是 ()

- A: 多柔比星
- B: 塞替派
- C: 顺铂
- D: 丝裂霉素

答案: A

82. 配制静脉输液时;应先用灭菌注射用水溶解,然后用 5%葡萄糖注射液稀释,不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是 ()

- A: 伏立康唑
- B: 卡泊芬净
- C: 两性霉素 B
- D: 氟康唑

答案: C

83. 多柔比星

- A: 影响蛋白质合成和功能
- B: 直接破坏 DNA 结构和功能
- C: 干扰 RNA 转录
- D: 干扰核酸生物合成

答案: C

84. 瑞舒伐他汀用于原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症的初始剂量是

- A: 20~40mg
- B: 5mg

C: 10mg

D: 15mg

答案：B

85. 青光眼患者应慎用

A: 噻托溴铵

B: 沙美特罗

C: 沙丁胺醇

D: 孟鲁司特

答案：A

86. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

A: 低钠血症

B: 高钠血症

C: 高钾血症

D: 低钾血症

答案：C

87. 降压时常见干咳的不良反应，发生率约为 20%的药物是

A: 烟酸

B: 硝普钠

C: 卡托普利

D: 硝苯地平

答案：C

88. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。下列关于氟尿嘧啶的说法中错误的是()

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/668105101051007022>