

2024 年河南省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题大全及答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可以导致中性粒细胞减少的药物是

- A: 辛伐他汀
- B: 头孢氨苄
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 甲巯咪唑

答案：D

2. #NAME?

- A: #NAME?
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

3. 患者，男，56 岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平 10mgqd，近期体检血脂指标为 LDL—C4.8mmol / L，药师应建议患者加服

- A: 二甲双胍
- B: 福辛普利
- C: 叶酸
- D: 阿托伐他汀

答案：D

4. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- B: 每 3-5 天调整 1 次
- C: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- D: 每次调整 1-4 单位

答案：A

5. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

- A: A 级
- B: B 级
- C: D 级
- D: C 级

答案：C

6. 较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药物是

- A: 环孢素
- B: 酮康环孢素唑
- C: 布洛芬
- D: 比沙可啶

答案：B

7. 乳酸性酸中毒患者宜选用 ()。

- A: 二甲双胍
- B: 瑞格美脲
- C: 胰岛素

D: 格列喹酮

答案: C

8. (2017 年真题) 治疗中度痤疮宜选用 ()

A: 复方苯甲酸酊

B: 氢化可的松软膏

C: 阿昔洛韦软膏

D: 维 A 酸乳膏

答案: D

9. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整) 肾功能重度损害时, 抗菌药减低至正常剂量的

A: $1/7 \sim 1/5$

B: $1/10 \sim 1/5$

C: $1/5 \sim 1/2$

D: $3/5 \sim 3/4$

答案: B

10. (2019 年真题) 正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是

A: A 级

B: C 级

C: B 级

D: X 级

答案: A

11. 注意个体化用药体现

A: 经济性

B: 有效性

C: 规范性

D: 安全性

答案：C

12. 用于治疗前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂为

A: 特拉唑嗪

B: 坦索罗辛

C: 托特罗定

D: 索利那新

答案：B

13. 以下药物中毒事例中不宜用硫酸镁导泻的是

A: 降糖药中毒

B: 解热镇痛药中毒

C: 镇静药中毒

D: 抗结核药中毒

答案：C

14. 倍他洛尔所致的主要不良反应是

A: 血尿酸升高

B: 支气管痉挛

C: 血钠升高

D: 外周血肿

答案：B

15. 形似或声似的药品要加用醒目的标识，是针对

A: 配备足够的人力

B: 及时沟通

C: 环境整齐、安静

D: 规范操作、坚持核对

答案: C

16. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

A: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性

B: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿

C: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险

D: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用

答案: B

17. 既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

A: 阿米替林

B: 丙咪嗪

C: 帕罗西汀

D: 氟伏沙明

答案: D

18. 适用于阿司匹林哮喘伴有过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

A: 茶碱片

B: 孟鲁司特钠咀嚼片

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 异丙托溴铵气雾剂

答案: B

19. (解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用 1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是

- A: 丙米嗪中毒
- B: 丙戊酸钠中毒
- C: 磷化锌中毒
- D: 三唑仑中毒

答案：C

20. 老年高血压高血压患者的降压目标

- A: <120 / 80mmHg
- B: <140 / 90mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <150 / 90mmHg

答案：D

21. 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml / min. 医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法与用量是

- A: 0.4g，每日 4 次
- B: 0.4g，每日 3 次
- C: 0.4g，每日 2 次
- D: 0.4g，每日 5 次

答案：D

22. 在配制静脉输液时，不宜用氯化钠注射液溶解的药品是

- A: 青霉素
- B: 盐酸万古霉素
- C: 两性霉素 B
- D: 维生素 K

答案：C

23. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗痤疮时，正确的用法是

- A: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏？
- B: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶？
- C: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用？
- D: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用？

答案：B

24. 能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

- A: 红细胞
- B: 吞噬细胞增多
- C: 真菌
- D: 上皮细胞

答案：C

25. 治疗结核病的患者的注意事项错误的是

- A: 口服抗结核药可自行决定饭后服用
- B: 充分了解抗结核药物服用中可能出现的不良反应，一旦出现要及时报告医生
- C: 患者所用食具应于餐后煮沸消毒
- D: 增强体质增加高蛋白和维生素的摄入，日光浴

答案：A

26. 二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥

- A: 非适应证用药
- B: 盲目联合用药
- C: 过度治疗用药
- D: 超适应证用药

答案：D

27. 如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，ADR 报告表此栏应填“好转”；所对应的项目是

- A: 不良反应 / 事件的结果
- B: ADR / ADE 过程描述
- C: 用药起止时间
- D: 用药原因

答案：A

28. （2018 年真题）患者，男，38 岁，因腹部受寒胃痉挛疼痛，应选用的药物是（）

- A: 卡马西平
- B: 山莨菪碱
- C: 麦角胺咖啡因
- D: 布洛芬

答案：B

29. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 男性 11~50U/L
- B: 成人 <40U/L
- C: 成人 <50U/L
- D: 男性 <40U/L

答案：B

30. 下列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

- A: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- B: 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪

C: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

D: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面. 以防创面感染

答案: C

31. 以质量调整为生命年或者质量调整为预期寿命为指标开展的药物经济学评价方法属于()

A: 最小成本分析

B: 成本-效益分析

C: 成本-效果分析

D: 成本-效用分析

答案: D

32. 脂溶性最低，作用慢而长的是

A: 戊巴比妥

B: 硫喷妥

C: 苯巴比妥

D: 巴比妥

答案: D

33. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段。试验对象主要为健康受试者，试验样本数一般为

A: 36~40 例

B: 12~13 例

C: 10~18 例

D: 20~30 例

答案: D

34. 能保护药品免受破坏的联合是

- A: 亚胺培南-西司他汀复方制剂
- B: 维生素 C 与铁剂同服
- C: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- D: 磷霉素联用其他抗菌药物

答案：A

35. 可能导致血清总胆固醇升高的药物是

- A: 氯氮平
- B: 苯妥英钠
- C: 阿司匹林
- D: 胰岛素

答案：A

36. 与成人相比，2 岁以下小儿对酸不稳定、弱碱性药物的吸收增加，其机制是

- A: 胃排空快
- B: 体液及细胞外液容量大
- C: 肝脏的相对重量约为成人的 2 倍
- D: 胃酸分泌少

答案：D

37. 属于药品不良反应的是

- A: 服用假药导致的与用药目的无关的有害反应
- B: 合格药品使用方法不当导致的与用药目的无关的有害反应
- C: 合格药品过量服用导致的与用药目的无关的有害反应
- D: 合格药品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的有害反应

答案：D

38. 以下药物中，最可能引起嗜酸性粒细胞增多的是

- A: 坎地沙坦
- B: 头孢哌酮
- C: 甲基多巴
- D: 泼尼松

答案：B

39. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果欲更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停用（）

- A: 10 天
- B: 14 天
- C: 5 天
- D: 7 天

答案：B

40. 患者女 29 岁孕 25+6 周近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是（）

- A: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后再继续静脉滴注余下剂量
- B: 先静脉注射负荷剂量再静脉滴注余下剂量
- C: 快速静脉注射
- D: 口服，每次 5ml，一日 3 次

答案：A

41. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 用药期间，应关注腹痛、柏油样便或呕血等消化道出血症状

- B: 阿司匹林肠溶片在进餐时服用，以减轻对胃肠道的刺激性
- C: 阿司匹林用药期间，需定期监测 INR
- D: 阿司匹林属于冠心病-级预防，长期使用方可获益

答案：A

42. (2019 年真题) 患者向药师咨询，停用口服避孕药后多久可备孕。

下列答复中，正确的是

- A: 长效避孕药停药后即可备孕
- B: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕
- C: 复方短效口服避孕药停药 6 个月后方可备孕
- D: 复方短效口服避孕药停药 3 个月后方可备孕

答案：B

43. 脂肪或酪蛋白消化不良（儿童）可呈现

- A: 柏油黑便
- B: 乳凝块便
- C: 鲜血便
- D: 白陶土便

答案：B

44. 以下对单纯疱疹的描述错误的是（）

- A: 人与动物为 HSV 的主要自然宿主
- B: HSV 主要存在于感染者的疱疹液、唾液及粪便中
- C: 分为 HSV- I 型和 HSV- II 型两个血清型
- D: HSV 是双股 DNA 病毒

答案：A

45. IV 级临床研究的结论或 II、III 级临床研究的推论属于

A: E 级

B: B 级

C: C 级

D: D 级

答案: C

46. 氨基糖苷类抗生素排泄减慢

A: 肾小球滤过减少

B: 肾小管重吸收增加

C: 肾血流量减少

D: 肾小管分泌减少

答案: A

47. 第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

A: 一次 2mg，每日 3 次

B: 一次 10mg，每日 1 次

C: 一次 4mg，每日 3 次

D: 一次 4mg，每日 1 次

答案: B

48. 患儿男, 2 岁, 误服水银后应选用的洗胃液是 ()

A: 淀粉溶液

B: 1:5000 高锰酸钾溶液

C: 鸡蛋清

D: 牛奶与水等量混合

答案: C

49. 属于胆酸螯合剂的调节血脂药是

- A: 氯贝丁酯
- B: 阿昔莫司
- C: 依折麦布
- D: 考来替泊

答案：D

50. 消化不良性腹泻宜选用的药物是

- A: 双歧三联活菌制剂
- B: 胰酶
- C: 山莨菪碱
- D: 双八面体蒙脱石

答案：B

51. 长期精神紧张性头痛，推荐应用的药物是

- A: 地西泮
- B: 谷维素
- C: 阿司匹林
- D: 罗通定

答案：A

52. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

- A: 白消安
- B: 柔红霉素
- C: 氟尿嘧啶
- D: 博来霉素

答案：C

53. 每次配方尽可能 1 次完成，是针对

- A: 配备足够的人力
- B: 规范操作、坚持核对
- C: 及时沟通
- D: 环境整齐、安静

答案：B

54. 抗高血压药物的禁忌证心力衰竭（）

- A: 维拉帕米
- B: 依那普利
- C: 美托洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

55. 在导致药源性胃肠道疾病的药品中，引起局部缺血性结肠炎、重者可致死亡等风险的药品是

- A: 利血平
- B: 呋塞米
- C: 阿米替林
- D: 阿洛司琼

答案：D

56. 较易导致肾损伤的药品是

- A: 氯化钾
- B: 阿米卡星
- C: 酮康唑
- D: 新霉素

答案：D

57. “发现并确认‘仙牛健骨颗粒’Ⅲ期临床试验过程中连续发生严重不良事件，即暂停其新药试验”显示药物警戒的作用是

- A: 发现药品质量问题
- B: 药品上市前风险评估
- C: 药品上市后风险评估
- D: 发现与规避假、劣药品流入市场

答案：B

58. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 4000IU
- B: 6000IU
- C: 10000IU
- D: 400IU

答案：A

59. 注射后 10~30min 起效，作用维持时间 2~3h，属于速效强心苷的是

- A: 去乙酰毛花苷
- B: 维拉帕米
- C: 多巴胺
- D: 米力农

答案：A

60. (2018 年真题) 老年女性，心功能衰竭，服用呋塞米及螺内酯片，正确的使用方法是 ()

- A: 用温水调服
- B: 应同时碱化尿液

C: 清晨服用

D: 舌下含服

答案: C

61. 应用雷托那韦等蛋白酶抑制剂后，需要多饮水的主要机制是

A: 患者伴血容量较低

B: 防止形成尿道结石或肾结石

C: 减小用药部位刺激性

D: 加快排泄，减小肾毒性

答案: B

62. 某患者，男，71 岁，既往有血脂异常，胆固醇 7.7mmol/L，甘油三酯 2.3mmol/L，肝功能正常，患者连续服用氟伐他汀和非诺贝特 5 个月，检测肝功能 AST142U/L(正常值为 40U/L)，ALT126(正常值为 40U/L)，磷酸激酶 CPK2000U/L(正常值为 25~200U/L)。依据上述复查结果判断患者

A: 心脏毒性

B: 肾脏毒性

C: 肌肉毒性

D: 肝脏毒性

答案: C

63. 把重心集中在监控高频发生错误的药物使用上，归属

A: 管理规范到位

B: 知识培训

C: 社会进步

D: 环境与流程的优化与持续改进

答案: A

64. 钙制剂属于

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 激素替代剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 促进骨矿化剂

答案：D

65. 非糜烂性胃食管反流病的抑酸治疗疗程是

- A: 6 周
- B: 4 周
- C: 2 周
- D: 3 周

答案：B

66. 在处方用药适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会增加毒性或不良反应的是

- A: 苄丝肼和左旋多巴
- B: 阿莫西林和克拉维酸钾
- C: 甲氧氯普胺和氯丙嗪
- D: 头孢哌酮和舒巴坦

答案：C

67. 属于脂溶性维生素，用于治疗佝偻病和夜盲症的药品是

- A: 维生素 AD 复方制剂
- B: 维生素 C 片
- C: 复合维生素 B 片
- D: 维生素 A 片

答案：A

68. 患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选

- A: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物
- B: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物
- C: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物
- D: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物

答案：C

69. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他丁片 40mgpoqd。

- A: 氨氯地平片
- B: 阿司匹林肠溶片
- C: 贝那普利片
- D: 美托洛尔缓释片

答案：C

70. 抗结核治疗中，主要针对细胞内有抗菌杀菌作用的是

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：C

71. 代表乙型肝炎病毒 e 抗原的是

- A: HBsAb
- B: HBcAb

C: HBeAb

D: HBeAg

答案：D

72. (引起药源性肾病的药物) 含马兜铃酸的中药可导致

A: 肾小管阻塞

B: 直接肾毒性

C: 不可逆性肾小管坏死

D: 肾间质纤维化

答案：D

73. 缺铁性贫血患者应服用

A: 苯妥英钠注射液

B: 硫酸亚铁片

C: 叶酸片

D: 维生素 B12

答案：B

74. 患者，男，72 岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1 个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100 μ g pm 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg pm 舌下含服。

A: 缬沙坦

B: 非洛地平

C: 维拉帕米

D: 普萘洛尔

答案：A

75. 属于 HIV 整合酶链转移抑制剂的是 ()

- A: 阿巴卡韦
- B: 多替拉韦
- C: 奈韦拉平
- D: 洛匹那韦

答案: B

76. 下列具有肝药酶抑制作用的药物中，所诱导的酶系类型最多的是

- A: 利福平
- B: 胺碘酮
- C: 咪康唑
- D: 异烟肼

答案: B

77. (2019 年真题) 患者，女，80 岁，高血压病史 28 年，近日自觉感憋气，昨夜出现呼吸困难，不能平躺，喘憋，咳粉红色泡沫样痰，诊断为心力衰竭，应选用的药物是

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 胺碘酮
- C: 氟桂利嗪
- D: 呋塞米

答案: D

78. 开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

- A: 修订医嘱及时沟通
- B: 医嘱清楚准确
- C: 医嘱完整不漏项

D: 实现个体化治疗

答案: D

79. 在治疗口腔溃疡的药品中，可能致使儿童和青年偶发口腔无痛性浅表脱屑损害的是

A: 左旋咪唑

B: 甲硝唑粘贴片

C: 氯己定含漱剂

D: 西地碘含片

答案: C

80. 钙通道阻滞剂

A: 缬沙坦

B: 依那普利

C: 氢氯噻嗪

D: 氨氯地平

答案: D

81. 有关药学服务的“基本要素”，以下说法最正确的是

A: 提供药物信息和知识

B: 提供药学专业知识

C: “与药物有关”的服务

D: 为公众服务

答案: C

82. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 双氯芬酸钠缓释片
- B: 吗啡控释片
- C: 加巴喷丁胶囊
- D: 颠茄片

答案：A

83. (2015 年真题) 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药是 ()。

- A: 维生素 B6
- B: 奥美拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 昂丹司琼

答案：D

84. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是以控制关节炎症(红肿、疼痛)为目的，尽早使用抗炎药

- A: 痛风性肾病治疗期
- B: 发作间歇期
- C: 急性发作期
- D: 首次发作期

答案：C

85. 乙醇、对乙酰氨基酚等血浆药物浓度升高，地西泮、利多卡因分布容积增大、消除缓慢，是由于

- A: 肾功能随年龄增长而减退
- B: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- C: 胆汁分泌缺乏
- D: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长

答案：B

86. 下列药物信息源中，属于一级文献资料的是

- A: 中国药学文摘
- B: 中国药学杂志
- C: 新编药物学
- D: 中国药学年鉴

答案：B

87. 对严重药品滥用和用药失误的处方，处置的方式是

- A: 经改正并签字确认后，方可调配
- B: 应拒绝调配，并按有关规定报告
- C: 准予调配
- D: 拒绝调配

答案：B

88. 肝功能不全者服用由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物时

- A: 避免使用
- B: 必须减量应用
- C: 一般无需调整剂量
- D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：D

89. 应用两种以上药物以增强与确保疗效

- A: 规律
- B: 联合
- C: 早期

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 适量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/675123214121012033>