

2024 年广西壮族自治区右江区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库【突破训练】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于中枢和外周多巴胺 D

- A: 昂丹司琼
- B: 多潘立酮
- C: 莫沙必利
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

2. 糖尿病患者低血糖时，可导致患者不适甚至生命危险，也是血糖达标的主要障碍。为了预防低血糖事件的发生，应用胰岛素或促胰岛素分泌剂时，需要注意的事项不包括

- A: 个体化给药，直接给予所需治疗剂量
- B: 谨慎地调整剂量
- C: 患者应定时定量进餐
- D: 有可能误餐时应提前做好准备

答案：A

3. 使淋巴细胞溶解，致淋巴细胞耗竭

- A: 地塞米松
- B: 亚叶酸钙
- C: 氟他胺
- D: 昂丹司琼

答案：A

4. 大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿胆原呈假阳性

- A: 维生素 B1
- B: 维生素 E
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 C

答案：A

5. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 电解质
- B: 尿量
- C: 肝功能
- D: 肾功能

答案：A

6. 阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

- A: 普适泰
- B: 非那雄胺
- C: 度他雄胺
- D: 依立雄胺

答案：A

7. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

- A: 阿达帕林
- B: 异维 A 酸
- C: 维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案：B

8. 硝酸甘油的药理作用不包括

- A: 增加心室壁张力
- B: 扩张容量血管
- C: 减少回心血量
- D: 增加心率

答案：A

9. 双香豆素与苯巴比妥合用可

- A: 与其竞争结合血浆蛋白
- B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- C: 竞争性对抗
- D: 产生协同作用

答案：B

10. 壬二酸的作用特点不包括

- A: 对厌氧菌无抑制和杀灭作用
- B: 局部使用能显著减少滤泡内丙酸杆菌的生长
- C: 可竞争性抑制产生二氢睾酮的酶过程
- D: 可直接抑制皮肤表面的细菌

答案：A

11. (2015 年真题) 属于润滑性泻药的是 ()。

- A: 甘油 (开塞露)
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 酚酞

答案: A

12. 抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

- A: 倍氯米松
- B: 特布他林
- C: 色甘酸钠
- D: 异丙肾上腺素

答案: C

13. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药的是 ()。

- A: 托烷司琼
- B: 阿瑞吡坦
- C: 甲氧氯普胺
- D: 维生素 B

答案: C

14. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

- A: 莫沙必利
- B: 碳酸钙
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 奥关拉唑

答案: A

15. 眼底检查时的快速短效扩瞳药

- A: 异丙肾上腺素
- B: 去甲肾上腺素
- C: 去氧肾上腺素
- D: 多巴胺

答案：C

16. 多柔比星用药后 1~2 日可出现

- A: 黄色尿
- B: 绿色尿
- C: 红色尿
- D: 橙色尿

答案：C

17. 下述药物中属于鼻腔减充血剂的是

- A: 色甘酸钠溶剂
- B: 链霉素溶剂
- C: 盐酸麻黄碱溶剂
- D: 布地奈德气雾剂

答案：C

18. 高血压伴有肾功能不全者最好选用

- A: 胍乙啶
- B: 利血平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 卡托普利

答案：D

19. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是

- A: 坦洛新
- B: 度他雄胺
- C: 西地那非
- D: 他达拉非

答案：B

20. 以下药物中，易被胃酸破坏的是

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 罗红霉素
- D: 阿奇霉素

答案：B

21. 对浅表和深部真菌感染都有效的抗真菌药物是

- A: 特比萘芬
- B: 氟胞嘧啶
- C: 灰黄霉素
- D: 酮康唑

答案：D

22. 可使血小板内环磷腺苷(cAMP)浓度增高而产生抗血小板作用的药品是()。

- A: 氯吡格雷
- B: 替罗非班
- C: 双嘧达莫
- D: 阿司匹林

答案：C

23. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

- A: 骨关节炎
- B: 支气管哮喘
- C: 胃溃疡
- D: 痛风

答案：A

24. 属于留钾利尿药的是

- A: 托拉塞米
- B: 依普利酮
- C: 依他尼酸
- D: 布美他尼

答案：B

25. 使用抗眼部细菌感染药利福平滴眼剂后，常见的不良反应是()

- A: 全身过敏反应
- B: 青光眼
- C: 牙龈出血和感染
- D: 头痛、偏头痛

答案：C

26. 主要经胆汁排泄的是

- A: 阿莫西林
- B: 庆大霉素
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢噻肟

答案：C

27. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 链霉素引起的神经毒性
- B: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用
- C: 链霉素引起的过敏性休克
- D: 链霉素引起的肾毒性

答案：C

28. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。若患者不能耐受万古霉素时，可选择替代的药物是（）

- A: 头孢曲松
- B: 头孢哌酮
- C: 替考拉宁
- D: 阿米卡星

答案：C

29. 与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是

- A: 葡醛内酯
- B: 多烯磷脂酸胆碱
- C: 甘草酸二铵
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：D

30. 作用机制是抗代谢的是

- A: 紫杉醇
- B: 枸橼酸他莫昔芬
- C: 巯嘌呤
- D: 吉非替尼

答案：C

31. 属于头霉素类抗菌药物的是

- A: 头孢噻肟
- B: 氨曲南
- C: 头孢他啶
- D: 头孢美唑

答案：D

32. 与 α_1 受体阻断药无相互作用的药物是()

- A: 地尔硫
- B: 第三代头孢菌素
- C: 西咪替丁
- D: 卡马西平

答案：B

33. (2018 年真题) 适应症仅应用于治疗失眠的药物是 ()

- A: 苯巴比妥
- B: 地西泮
- C: 佐匹克隆
- D: 氟西汀

答案：C

34. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而起到抗抑郁作用的药物是 ()

- A: 吗氯贝胺
- B: 帕罗西汀
- C: 马普替林
- D: 度洛西汀

答案: B

35. 缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

- A: 维生素 B12
- B: 铁剂
- C: 维生素 C
- D: 叶酸

答案: B

36. 阿司匹林的作用机制是

- A: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- B: 促进凝血因子合成
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进纤溶

答案: C

37. 抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用的是

- A: 氢氧化铝
- B: 氢氧化镁
- C: 三硅酸镁
- D: 碳酸钙

答案: C

38. 下列关于利巴韦林作用机制的描述中，不正确的是

- A: 可竞争性抑制 DNA 多聚酶
- B: 减少病毒核糖核酸和蛋白质合成
- C: 抑制病毒合成酶
- D: 破坏病毒复制与传播

答案：A

39. （2015 年真题）通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是（）。

- A: 青蒿素
- B: 噻嘧啶
- C: 氯喹
- D: 哌嗪

答案：D

40. 抗血栓形成、保护动脉内皮的调血脂药是

- A: 氟伐他汀
- B: 藻酸双酯钠
- C: 阿伐他汀
- D: 普伐他汀

答案：B

41. （2016 年真题）军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

- A: 利奈唑胺
- B: 罗红霉素
- C: 头孢曲松
- D: 头孢他啶

答案：B

42. (2019 年真题) 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合，形成低毒或无毒结合物排出体外，起到解毒和保护肝脏的作用，用于急、慢性肝炎治疗的药物是 ()

- A: 腺苷蛋氨酸
- B: 葡醛内酯
- C: 硫普罗宁
- D: 异甘草酸镁

答案: B

43. 属于 α

- A: 特拉唑嗪
- B: 酚妥拉明
- C: 度他雄胺
- D: 普适泰

答案: A

44. 术后复发的甲状腺功能亢进症选用

- A: 放射性碘
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 大剂量碘剂
- D: 格列齐特

答案: A

45. (2018 年真题) 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法，错误的是 ()

- A: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深
- B: 甲硝唑有致突变和致畸作用

C: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物

D: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短

答案：C

46. (2021 年真题) 患者，男，46 岁。新诊断为高血压，最高血压 155/95mmHg，心率 100 次/分，交感神经兴奋性明显增高，首选的治疗药物是 ()

A: 氯沙坦

B: 美托洛尔

C: 硝酸甘油

D: 氢氯噻嗪

答案：B

47. 不属于血管紧张素转换酶抑制剂 (ACE I) 类药物作用特点是 ()

A: ACEI 可引起反射性心率加快

B: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

C: ACEI 对肾脏有保护作用

D: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大

答案：A

48. 通过抑制 Ca

A: 胍乙啶

B: 普萘洛尔

C: 硝酸甘油

D: 硝苯地平

答案：D

49. 以下哪个药物不属于肝胆疾病辅助药

- A: 甘草酸二铵
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 多潘立酮
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：C

50. 下述不属于抗病毒药物禁忌证的是()

- A: 严重中性粒细胞减少者禁用更昔洛韦
- B: 妊娠期妇女禁用利巴韦林
- C: 糖尿病、高血压患者禁用
- D: 相应药物过敏者禁用

答案：C

51. 患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是（）

- A: 蓖麻油
- B: 硫酸镁
- C: 普芦卡必利
- D: 乳果糖

答案：D

52. 碳酸钙的适应证不包括()

- A: 骨发育不全
- B: 骨质疏松
- C: 佝偻病
- D: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

答案：D

53. 能竞争 DNA 聚合酶的抗病毒药是

- A: 拉米夫定
- B: 阿昔洛韦
- C: 碘苷
- D: 利巴韦林

答案：B

54. 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162/80mmHg，心率 72 次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 碳酸钙 D
- B: 双氯芬酸
- C: 氨基葡萄糖
- D: 辛伐他汀

答案：B

55. 糖尿病酮症酸中毒患者选用()

- A: 格列本脲
- B: 胰岛素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 二甲双胍

答案：B

56. 关于糖皮质激素对血液成分影响的描述，错误的是

- A: 降低纤维蛋白原浓度
- B: 使红细胞和血红蛋白含量增加
- C: 使中性白细胞数增多

D: 使血小板增多

答案：A

57. 阻断脑内多巴胺受体，小剂量抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体，大剂量时直接抑制呕吐中枢，兼有镇静作用的是

A: 甲氧氯普胺

B: 氯丙嗪

C: 帕洛诺司琼

D: 劳拉西泮

答案：B

58. 氯霉素的下述不良反应中，哪项是与剂量和疗程无关的严重反应

A: 不可逆的再生障碍性贫血

B: 灰婴综合征

C: 可逆的各类血细胞减少

D: 二重感染

答案：A

59. 脂溶性强，能透过血-脑屏障，可通过阻断 M1 受体产生镇静、失眠、意识混乱和认知障碍等不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

A: 托特罗定

B: 索利那新

C: 黄酮哌酯

D: 奥昔布宁

答案：D

60. 易导致血糖异常的药品是

- A: 头孢哌酮
- B: 多西环素
- C: 加替沙星
- D: 庆大霉素

答案：C

61. 静脉滴注过快易发生红人综合征的是()

- A: 庆大霉素
- B: 万古霉素
- C: 克林霉素
- D: 阿奇霉素

答案：B

62. 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是

- A: 普萘洛尔
- B: 二甲双胍
- C: 瑞格列奈
- D: 格列美脲

答案：C

63. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染宜首选的抗菌药物是()。

- A: 罗红霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 头孢他啶
- D: 头孢曲松

答案：B

64. 维生素 B12 的适应证为

- A: 恶性贫血和巨幼细胞贫血
- B: 拮抗华法林过量导致的出血
- C: 拮抗肝素过量导致的出血
- D: 纤溶亢进所致的出血

答案：A

65. 内分泌平衡障碍及精神神经失调所致的失眠

- A: 谷维素
- B: 夸西泮
- C: 氟西泮
- D: 氯美扎酮

答案：A

66. 属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

- A: 唑吡坦
- B: 氯苯那敏
- C: 丙戊酸钠
- D: 苯妥英钠

答案：D

67. 下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

- A: 可用于呆小病的治疗
- B: 左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代
- C: 成人初始剂量 25~50 μg ，一日 1 次
- D: 本类药起效迅速，24h 达血药浓度高峰

答案：D

68. (2015 年真题) 属于多巴胺 D2 受体阻断剂的是 ()。

- A: 奥美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 法莫替丁
- D: 氯苯那敏

答案：B

69. 肌肉注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

- A: 7~12 分钟
- B: 10~25 分钟
- C: 4 小时
- D: 8 小时

答案：C

70. 以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期只有 7~12min 的药物是

- A: 促性腺激素
- B: 促肾上腺皮质激素
- C: 醋酸去氨加压素
- D: 催乳素

答案：B

71. 不可用于降低眼压的药物是()

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 利福平滴眼剂
- C: 卡替洛尔滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：B

72. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂

- A: 维拉帕米
- B: 溴苄铵
- C: 地尔硫
- D: 硝苯地平

答案：B

73. 主要用于经他莫昔芬辅助治疗 2~3 年后，绝经后雌激素受体阳性的妇女的早期浸润性乳腺癌的辅助治疗，直至完成总共 5 年的辅助内分泌治疗，以及经他莫昔芬治疗后，其病情仍有进展的自然或人工绝经后妇女的晚期乳腺癌，该药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 依西美坦
- C: 来曲唑
- D: 氟维司群

答案：B

74. 下述属于 β 受体阻断剂禁忌证的是

- A: 心动过缓、房室传导阻滞患者禁用
- B: 甲状腺功能亢进患者禁用
- C: 不适用于先天性青光眼患者
- D: 虹膜睫状体炎患者禁用

答案：A

75. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院，血压 203/110mmHg，该患者宜首选（如果疗程超过 2 小时需密切监测血中硫氰酸盐水平）的降压药物是（）

- A: 美托洛尔

B: 贝那普利

C: 硝普钠

D: 氨氯地平

答案: C

76. 减鼻充血药所致的典型不良反应是()。

A: 血压升高

B: 共济失调

C: 心率减慢

D: 血管舒张

答案: A

77. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是

A: 青霉素 V

B: 苯唑西林

C: 匹氨西林

D: 美西林

答案: D

78. (2018 年真题) 用于治疗疥疮的药物有 ()

A: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

B: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

C: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

D: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

答案: A

79. 使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

A: 氯化钾

- B: 果糖
- C: 硫酸镁
- D: 氯化钙

答案：A

80. 用于阵发性室上性心动过速的钙通道阻滞药是

- A: 胺碘酮
- B: 苯妥英钠
- C: 维拉帕米
- D: 利多卡因

答案：C

81. 又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

- A: 鲨肝醇
- B: 丙酸诺龙
- C: 维生素 B₄
- D: 小檗胺

答案：C

82. 可增加维生素 B₆ 经肾排出量的药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 红霉素

答案：C

83. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 美托洛尔
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 替米沙坦
- D: 埃索美拉唑钠

答案：B

84. （2017 年真题）属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动药是（）

- A: 多潘立酮
- B: 甲氧氯普胺
- C: 昂丹司琼
- D: 莫沙必利

答案：D

85. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

- A: 维生素 B6
- B: 托烷司琼
- C: 阿瑞吡坦

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 甲氧氯普胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/676150140101011030>