

2024 辽宁省凌河区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库大全附答案【B 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 选择性舒张脑血管的药物是

- A: 地尔硫革
- B: 氟桂利嗪
- C: 硝苯地平
- D: 维拉帕米

答案：B

2. 可用肝病的氨基酸制剂是

- A: 复方氨基酸注射液（9AA）、赖氨酸注射液
- B: 复方氨基酸注射液（6AA）、复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（9AA）
- D: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（6AA）

答案：D

3. 患者,女,55 岁诊断为“甲癣”宜使用的药物是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 氟康唑
- C: 特比萘芬
- D: 卡泊芬净

答案：C

4. 选择性抑制 COX-2 的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 布洛芬
- D: 吲哚美辛

答案：B

5. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是()。

- A: 阿托伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 阿昔莫司

答案：A

6. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 琥珀酸亚铁
- B: 叶酸
- C: 蔗糖铁
- D: 硫酸亚铁

答案：C

7. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氨苯蝶啶
- C: 托拉塞米
- D: 乙酰唑胺

答案：C

8. 抗炎作用较强，水钠潴留最强的激素是

- A: 倍他米松
- B: 泼尼松
- C: 地塞米松
- D: 氢化可的松

答案：D

9. 苯妥英钠血药浓度超过多少可出现中毒症状

- A: 10 $\mu\text{g/ml}$
- B: 2 $\mu\text{g/ml}$
- C: 5 $\mu\text{g/ml}$
- D: 20 $\mu\text{g/ml}$

答案：D

10. 伴有（）的患者在应用 ACEI 首剂治疗时可能出现严重低血压

- A: 干咳
- B: 脑水肿
- C: 蛋白尿
- D: 低钠血症

答案：D

11. 普通感冒患者，有单纯性咳嗽症状，宜选用的药物是（）

- A: 氯苯那敏片
- B: 对乙酰氨基酚滴剂
- C: 茶碱缓释片
- D: 右美沙芬片

答案：D

12. 维生素 A 缺乏时可患

- A: 夜盲症
- B: 成人佝偻病
- C: 糙皮病
- D: 脚气病

答案：A

13. 下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

- A: 丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素
- B: 醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素
- C: 氟轻松是强效外用糖皮质激素
- D: 糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素

答案：D

14. 按作用时间分类，属于速效的胰岛素的是()

- A: 甘精胰岛素
- B: 谷赖胰岛素
- C: 短效胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：B

15. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

- A: 1 次/日，午后 14 时给药
- B: 1 次/日，上午 8 时给药
- C: 夜间给药

D: 3 次/日

答案: B

16. 治疗肺孢子菌病的首选药物是()

A: 呋喃妥因

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 左氧氟沙星

D: 氯霉素

答案: B

17. 下列属于钾离子竞争性酸抑制剂的药物是

A: 奥美拉唑

B: 米索前列醇

C: 法莫替丁

D: 沃诺拉赞

答案: D

18. 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

A: 阿奇霉素

B: 米诺环素

C: 利奈唑胺

D: 万古霉素

答案: D

19. 强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

A: 二联律

B: 房颤

C: 室性期前收缩

D: 房性期前收缩

答案: C

20. 替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A: 脑瘤

B: 纤维瘤

C: 恶性淋巴瘤

D: 慢性淋巴细胞白血病

答案: A

21. 羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶 A 的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶（HMG—CoA 还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B 水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

A: 40mg 洛伐他汀，每日 1 次

B: 40mg 氟伐他汀，每日 1 次

C: 10mg 阿托伐他汀钙，每日 1 次

D: 20mg 瑞舒伐他汀，每日 1 次

答案: C

22. （2017 年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定，属于乙内酰胺类抗癫痫药的是（）

A: 苯巴比妥

B: 加巴喷丁

C: 卡马西平

D: 苯妥英钠

答案: D

23. 异丙托溴铵的作用机制是

- A: 阻断白三烯受体
- B: 阻断 α 受体
- C: 抑制磷酸二酯酶
- D: 阻断 M 受体

答案：D

24. 治疗 MRSA 感染首选药物是

- A: 克林霉素
- B: 林可霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：D

25. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。患者可能发生与静脉滴注速度有关的不良反应是（）

- A: 高血压危象
- B: 急性肝衰竭
- C: 红人综合征
- D: 血糖异常

答案：C

26. （2018 年真题）可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是（）

- A: 对乙酰氨基酚

B: 塞来昔布

C: 双氯芬酸

D: 阿司匹林

答案: D

27. 紧急降低眼压首选的药物是

A: β -受体阻断剂

B: 碳酸酐酶抑制剂

C: 20%甘露醇

D: 拟 M 胆碱药

答案: C

28. 使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

A: 7 日

B: 3 日

C: 5 日

D: 1 日

答案: B

29. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是()

A: 此类药物不能单独服用

B: 此类药物可降低 2 型糖尿病患者的餐前血糖

C: 格列美脲属于本类药物

D: 此类药物需在餐前即刻服用

答案: D

30. 促进微管的装配，抑制其解聚

A: 长春碱

- B: 他莫昔芬
- C: 紫杉醇
- D: 羟喜树碱

答案：C

31. (2017 年真题) 导致视神经炎的抗结核药的是 ()

- A: 利福喷丁
- B: 利福平
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：D

32. 第 3 代二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

- A: 替格雷洛
- B: 替罗非班
- C: 氯吡格雷
- D: 噻氯匹定

答案：A

33. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是 ()

。

- A: 两性霉素 B
- B: 特比萘芬
- C: 伏立康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

34. (2015 年真题) 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是 ()。

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 乙酰唑胺

答案：D

35. 可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

- A: 依折麦布
- B: 瑞舒伐他汀
- C: 阿昔莫司
- D: 利血平

答案：C

36. 降低心脏前、后负荷，对急性心肌梗死及高血压所致的慢性心力衰竭效果较好 ()

- A: 多巴酚丁胺
- B: 氨力农
- C: 硝普钠
- D: 地高辛

答案：C

37. 氯霉素类

- A: 禁用于早产儿、新生儿
- B: 禁用于 8 岁以下儿童
- C: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

D: 禁用于胆道阻塞患者

答案：A

38. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

A: 哌替啶

B: 布桂嗪

C: 可待因

D: 阿司匹林

答案：A

39. 预防和治疗各种原因引起的肝性脑病使用

A: 复方氨基酸注射液（3AA）

B: 苯丙氨酸

C: 复方氨基酸注射液（9AA）

D: 复方氨基酸（18AA- I）

答案：A

40. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致的感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为（）

A: 糖皮质激素

B: 右旋糖酐

C: 酚妥拉明

D: 阿托品

答案：A

41. 属于叶酸类抗代谢类药物的是

A: 巯嘌呤

- B: 吉西他滨
- C: 长春瑞滨
- D: 甲氨蝶呤

答案：D

42. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 无心脏不良反应
- B: 可作为术后预防呕吐的常规用药
- C: 对泌乳素的分泌无影响
- D: 对化疗所致的呕吐有效

答案：C

43. 治疗肾性尿崩症

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：A

44. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及记忆障碍药是

- A: 胞磷胆碱
- B: 多奈哌齐
- C: 吡拉西坦
- D: 利斯的明

答案：C

45. 属于第四代头孢菌素的药物是

- A: 头孢氨苄
- B: 头孢拉定
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢哌酮

答案：C

46. 抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

- A: 丝裂霉素
- B: 阿霉素
- C: 环磷酰胺
- D: 放线菌素 D

答案：D

47. 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮
- B: 能降低血清前列腺特异性抗原（PS）水平
- C: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发
- D: 易引起直立性低血压

答案：D

48. 影响骨和牙齿生长的是

- A: 左氧氟沙星
- B: 青霉素
- C: 氯霉素
- D: 四环素

答案：D

49. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是()

- A: 提高窦房结和普肯耶纤维的自律性
- B: 缩短心房和普肯耶纤维的动作电位时程、有效不应期
- C: 加快普肯耶纤维和窦房结的传导速度
- D: 阻滞心肌细胞的 Na

答案：D

50. 以下药物中，易被胃酸破坏的是

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 罗红霉素
- D: 阿奇霉素

答案：B

51. 因全身应用可产生严重的肾毒性、故目前仅限于局部应用的是

- A: 去甲万古霉素
- B: 替考拉宁
- C: 万古霉素
- D: 杆菌肽

答案：D

52. 与长春新碱合用可增强神经毒性

- A: 非格司亭
- B: 异烟肼
- C: 替尼泊苷
- D: 铂类

答案：C

53. 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害，临床用药需要重点关注的抗癫痫药是()

- A: 苯妥英钠
- B: 氯硝西泮
- C: 丙戊酸钠
- D: 苯巴比妥

答案：C

54. 关于枸橼酸铋钾用药注意事项的说法，错误的是

- A: 如有服用左甲状腺素，需间隔 2 小时服用
- B: 服药期间口中可能带有氨味并可使舌苔及大便灰黑色
- C: 妊娠期妇女、肾功能不全者禁用
- D: 为了更好地保护胃黏膜，可与牛奶同服

答案：D

55. 神经毒性较严重的是

- A: 卡铂
- B: 奥沙利铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 顺铂

答案：B

56. 主要经胆汁排泄(仅有 5%左右经肾排泄)，可用于肾功能轻中度不全患者的磺酰脲类药物是()

- A: 格列齐特
- B: 格列吡嗪

C: 格列美脲

D: 格列喹酮

答案: D

57. 留钾利尿药若每日服用 1 次，最宜的服用时间是

A: 早餐前 1 小时

B: 早餐时

C: 午餐前 1 小时

D: 午餐时

答案: B

58. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A: 10%~30%

B: 大于 90%

C: 1

D: 30%~90%

答案: B

59. 关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

A: 主要用于治疗急性白血病

B: 是二氢叶酸合成酶抑制剂

C: 是二氢叶酸还原酶抑制剂

D: 强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸

答案: B

60. 有关纤维蛋白溶解药的叙述，错误的是

A: 该药也称为血栓溶解药

B: 主要不良反应为凝血障碍

C: 主要代表药有链激酶、尿激酶

D: 能使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶

答案：B

61. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

A: 甲氧苄啶

B: 复方新诺明

C: 磺胺嘧啶

D: 磺胺多辛

答案：C

62. 关于双嘧达莫的描述，不正确的是

A: 抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取周围腺苷

B: 使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）增多

C: 常用于肾病综合征的抗凝治疗

D: 使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）减少

答案：D

63. （2020 年真题）关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

A: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快

B: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%

C: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用

D: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药

答案：C

64. 基于甲状旁腺激素研发出的促进骨形成的药是

- A: 唑来膦酸
- B: 特立帕肽
- C: 依普黄酮
- D: 雷洛昔芬

答案：B

65. 决定皮肤外用药物临床疗效的关键因素是

- A: 药物浓度
- B: 皮肤温度
- C: 经皮吸收
- D: 剂型

答案：C

66. 甲氧苄啶与磺胺合用是因为

- A: 双重阻断细菌的叶酸代谢
- B: 相互对抗不良反应
- C: 抗菌谱相似
- D: 减少泌尿道损害

答案：A

67. 属于叶酸类抗代谢类药物的是()

- A: 吉西他滨
- B: 巯嘌呤
- C: 长春瑞滨
- D: 甲氨蝶呤

答案：D

68. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 二甲双胍
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 艾塞那肽

答案：B

69. 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物

- A: 大环内酯类
- B: 氟喹诺酮类
- C: 氨基糖苷类
- D: 四环素类

答案：B

70. (2017 年真题) 在痛风急性期禁用的药物是 ()

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 布洛芬
- D: 舒林酸

答案：B

71. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

- A: 网织红细胞计数
- B: 血红蛋白
- C: 血清铁蛋白
- D: 巨核细胞计数

答案：D

72. 哮喘急性发作首选的治疗药物是 ()。

- A: 短效 β
- B: 吸入性糖皮质激素
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

73. 对浅表和深部真菌感染都有效的抗真菌药物是

- A: 灰黄霉素
- B: 酮康唑
- C: 特比萘芬
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

74. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿
- B: 氟康唑抑制卡马西平代谢
- C: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖
- D: 氟康唑可使华法林代谢加快

答案：D

75. 用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘，也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

- A: 孟鲁司特
- B: 茶碱
- C: 沙丁胺醇
- D: 沙美特罗

答案：A

76. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 替米沙坦
- B: 埃索美拉唑钠
- C: 美托洛尔
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

77. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

- A: 普萘洛尔
- B: 特布他林
- C: 碘化钾

D: 利多卡因

答案：A

78. 被还原后的代谢物可抑制细菌的 DNA 代谢过程，促使细菌死亡，并可抑制阿米巴原虫的氧化还原反应，使原虫的氮链发生断裂的是

A: 替硝唑

B: 甲氧苄啶 (TMP)

C: 莫西沙星

D: 磺胺甲噁唑 (SMZ)

答案：A

79. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂，可抑制血小板聚集的是 ()

A: 尿激酶

B: 噻氯匹定

C: 华法林

D: 肝素

答案：B

80. (2018 年真题) 关于奥司他韦作用特点的说法，错误的是 ()

A: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

B: 治疗流感时，首次使用奥司他韦应当在流感症状出现后的 36 小时以内

C: 应严格掌握奥司他韦适应证，不能用于流感的预防

D: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦

答案：C

81. 对衣原体有效的是

A: 替硝唑

B: 万古霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案：C

82. 属于第四代喹诺酮类药物的是

A: 萘啶酸

B: 吡哌酸

C: 诺氟沙星

D: 莫西沙星

答案：D

83. （2016 年真题）与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是

A: 二磷酸果糖

B: 碳酸钙

C: 三磷酸腺苷

D: 葡萄糖

答案：D

84. 以下哪项不是糖皮质激素的不良反应

A: 心律失常

B: 诱发癫痫

C: 电解质紊乱

D: 伤口愈合缓慢

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/677024014046010024>