

主管护师-护理学（中级）专业知识综合模考卷 1

单选题（共 100 题，共 100 分）

(1.) 豆渣样白带多见于( )

- A. 细菌性阴道炎
- B. 念珠菌阴道炎
- C. 滴虫阴道炎
- D. 宫颈糜烂（江南博哥）烂
- E. 外阴炎

**正确答案： B**

**参考解析：**念珠菌阴道炎阴道分泌物典型特点为干酪样白带或豆渣样白带。

(2.) 正式临产的标志是

- A. 见红
- B. 胎膜早破
- C. 下腹隐痛
- D. 有规律的子宫收缩
- E. 先露入盆

**正确答案： D**

**参考解析：**临产诊断是有规律且逐渐增强的子宫收缩，同时伴有进行性子宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降。

(3.) 腹部损伤行腹腔穿刺。抽得不凝血液，应诊断为

- A. 空腔脏器破裂
- B. 实质性脏器破裂
- C. 后腹膜血肿
- D. 误穿入腹腔血管
- E. 前腹壁血肿

**正确答案： B**

**参考解析：**实质脏器损伤主要表现为腹腔内出血，流到腹腔的血液经腹膜的脱纤维作用使血液不凝固，故抽得不凝血是提示腹部实质性脏器破裂的重要指征。

(4.) 判断甲亢治疗效果的重要标志是

- A. 情绪变化
- B. 食欲变化
- C. 体重变化
- D. 甲状腺大小变化
- E. 脉率及脉压变化

**正确答案： E**

**参考解析：**

基础代谢率是评定甲状腺功能亢进程度的主要指标，基础代谢率%=(脉率+脉压)-111。正常值为±10%，根据升高的程度来判断甲状腺功能亢进的程度，因此患者的脉率与脉压变化是判断甲状腺功能亢进治疗效果的主要指标。

(5.)女性，检查为念珠菌阴道炎。护士指导其选用阴道清洗液为

- A. 呋喃西林
- B. 1%乳酸
- C. 氯己定
- D. 1：5000 高锰酸钾
- E. 2%~4%碳酸氢钠

**正确答案： E**

**参考解析：**念珠菌在酸性环境适于其生长，因此阴道灌洗应用 2%~4%碳酸氢钠灌洗或坐浴，消灭其生长环境。

(6.)急性下壁心肌梗死易发生的心律失常为

- A. 室上性心动过速
- B. 心室颤动
- C. 房性期前收缩
- D. 病窦综合征
- E. 心房纤颤

**正确答案： D**

**参考解析：**下壁心肌梗死常易发生慢性心律失常，如房室传导阻滞等，并伴有血压下降。

(7.)牵引复位的适应证是

- A. 跟骨压缩骨折
- B. 桡骨裂缝骨折
- C. 胫骨青枝骨折
- D. 股骨干斜形骨折
- E. 骨盆骨折

**正确答案： D**

**参考解析：**牵引术适应于骨干骨折或关节脱位复位后不稳定需保持对位者。B、C 属于稳定性骨折，不需要牵引复位。

跟骨的压缩性骨折一般石膏固定，可逐渐愈合，同时应消炎消肿治疗避免周围的软组织的并发症。如果有明显的错位影响关节应手术复位固定治疗恢复正常的形状。A 错。

使用外固定器治疗骨盆骨折是急诊外科抢救患者生命的治疗方法，目前它已被公认为对严重骨盆创伤患者能确实稳定骨盆骨折的一种治疗方法。既可控制骨断端出血，又能迅速减轻疼痛和便于翻身。E 错。

(8.)以下哪项症状或体征对于肝硬化失代偿期的诊断最有意义

- A. 右上腹间歇性隐痛

B. 肝功能异常

- C. 食欲缺乏
- D. 腹水
- E. 大便情况

**正确答案： D**

**参考解析：**失代偿期主要为肝功能减退和门脉高压症两类临床表现，脾大、侧支循环的建立和开放、腹水是门脉高压的三大表现。

(9.)关于消化性溃疡疼痛特点描述正确，除外

- A. 长期性、周期性、节律性
- B. 胃溃疡疼痛位于剑突下正中偏左
- C. 十二指肠溃疡疼痛多发生于空腹或夜间
- D. 十二指肠溃疡疼痛常在进食后 0.5~1 小时出现
- E. 十二指肠溃疡疼痛时进食可帮助缓解

**正确答案： D**

**参考解析：**十二指肠溃疡的疼痛多在餐后 3~4 小时出现，持续至下次进餐，进食后可减轻或缓解。

(10.)孕妇 24 岁，妊娠 6 周，早孕表现不包括

- A. 停经
- B. 尿频
- C. 晨起呕吐
- D. 腹泻
- E. 乳头刺痛

**正确答案： D**

**参考解析：**停经是妊娠最早、最重要的症状。在妊娠 6 周左右出现恶心、晨起呕吐等早孕反应，12 周左右消失。尿频是因增大的子宫压迫膀胱而引起；在雌、孕激素的影响下，乳房逐渐增大。孕妇自觉乳房轻度胀痛及乳头刺痛。

(11.)女，13 岁。右胫前有一鸡蛋大小隆起，质硬，边界欠清，局部剧痛，夜间痛尤甚，皮温高，X 线片有骨膜反应。考虑患者最可能出现

- A. 骨巨细胞瘤
- B. 软骨肉瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 尤文肉瘤
- E. 骨肉瘤

**正确答案： E**

**参考解析：**根据病人发病年龄和临床表现，可以判断出病人患有骨肉瘤。

(12.)女，50 岁。患 1 型糖尿病 10 年。5 年前开始使用胰岛素治疗。近 2 周擅自停用胰岛素，改服中药。3 天前患者腹股沟处长一疖子，经抗生素治疗未见好转，并出现恶心、呕吐、头痛、呼吸深快、脉细速。急送医院检查：血糖 24mmol/L，血酮升高，尿酮强阳性，白细胞增高。该患者被诊断为

- A. 感染性休克
- B. 酮症酸中毒
- C. 高渗性非酮症性昏迷
- D. 乳酸性酸中毒
- E. 低血糖昏迷

**正确答案： B**

**参考解析：**病人为 1 型糖尿病，有停用胰岛素和感染史，结合临床表现可判断为酮症酸中毒。

(13.) 缓解急性心肌梗死胸部疼痛宜用

- A. 吗啡
- B. 休息和吸氧
- C. 索米痛片（去痛片）
- D. 硝酸甘油
- E. 非甾体类抗炎药

**正确答案： A**

**参考解析：**解除疼痛用哌替啶 50~100mg 肌肉注射或吗啡 5~10mg 皮下注射，或罂粟碱 30~90mg 肌肉注射。

(14.) 急性呼吸性酸中毒的主要治疗措施是

- A. 应用 5% 碳酸氢钠溶液
- B. 增加通气量
- C. 积极补充液体
- D. 限制摄入高钾食物
- E. 利尿增加酸从肾排出

**正确答案： B**

**参考解析：**呼吸性酸中毒的主要治疗措施是改善肺泡通气量，一般不宜补碱。

(15.) 初孕妇，26 岁，妊娠 12 周，出现厌食、恶心、呕吐及右上腹疼痛，皮肤黄疸。肝功能检查：均高于正常，乙型肝炎表面抗原阳性。该孕妇最可能的情况是

- A. 妊娠剧吐
- B. 妊娠肝内胆汁淤积症
- C. 妊娠合并急性胆囊炎
- D. 妊娠合并乙型肝炎
- E. 先兆子痫

**正确答案： D**

**参考解析：**HBsAg 是 HBV 感染的特异性标志，见于慢性肝炎、病毒携带者。因此该病人可诊断为妊娠合并乙型肝炎。

(16.) 现将 2 份生理盐水配上 1 份 1.4% 碳酸氢钠液体，护士计算其张力为

- A. 等张

- B. 2/3 张
- C. 1/2 张
- D. 1/4 张
- E. 2/5 张

**正确答案：** A

**参考解析：** 2 份生理盐水：1 份 1.4%碳酸氢钠液体的张力为  $(2+1) / (2+1)$ ，即等张。

(17.) 下列哪种物质适用于金属物质中毒的解毒

- A. 亚甲蓝
- B. 胆碱酯酶复活剂
- C. 二巯基丙醇
- D. 维生素 C
- E. 阿托品

**正确答案：** C

**参考解析：** 金属解毒药：依地酸二钠钙多用于铅中毒；二巯基丙醇多用于治疗锑、铅、汞、砷、铜等中毒。以上药物与金属结合，形成稳定而可溶的金属螯合物排出体外。

(18.) 肺气肿患者，双肺叩诊音呈

- A. 鼓音
- B. 实音
- C. 浊音
- D. 过清音
- E. 清音

**正确答案：** D

**参考解析：** 肺气肿叩诊为过清音。

(19.) 法洛四联症患儿，男，2 岁，今晨突然晕厥、抽搐，最可能的原因是

- A. 合并脑血栓
- B. 合并脑肿瘤
- C. 合并脑膜炎
- D. 高热
- E. 肺动脉漏斗部肌肉痉挛

**正确答案：** E

**参考解析：** 法洛四联症脑缺氧发作机制。

(20.) 左半结肠癌的主要表现应除外

- A. 腹泻、便秘
- B. 腹胀
- C. 腹痛
- D. 肠梗阻

E. 腹部肿块

**正确答案： E**

**参考解析：**腹部肿块是右半结肠癌的表现。

(21.)关于左侧小脑幕切迹疝的临床表现描述正确的是

- A. 昏迷、右侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪
- B. 昏迷、左侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪
- C. 昏迷、左侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪
- D. 昏迷、双侧瞳孔散大，双侧肢体瘫痪
- E. 昏迷、双侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪

**正确答案： C**

**参考解析：**小脑幕切迹疝的表现是同侧瞳孔变化，对侧肢体瘫痪。

(22.)下列病人中适宜安装人工心脏起搏器的病人是

- A. 一度房室传导阻滞
- B. 心房颤动
- C. 高血压
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 二度 I 型房室传导阻滞

**正确答案： D**

**参考解析：**三度房室传导阻滞为紧急情况，应立即报告医师给予心脏起搏器等处理。

(23.)女，29 岁。停经 52 天，阵发性腹痛伴阴道出血 2 天。妇科检查：子宫饱满，双附件（-），宫口开大 1cm，该患者最可能的情况是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 稽留流产
- D. 习惯性流产
- E. 感染性流产

**正确答案： B**

**参考解析：**难免流产由先兆流产发展而来，表现为阴道出血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查：子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，但组织尚未排出。

(24.)治疗休克首要和最基本的措施是

- A. 积极处理原发病
- B. 纠正酸碱平衡失调
- C. 应用血管活性药物
- D. 纠正微循环障碍
- E. 尽快恢复有效血容量

**正确答案： E**

**参考解析：**扩容是治疗休克首要而基本的措施。

(25.)乙肝疫苗第1次接种时间是

- A. 出生后1~2天
- B. 出生1个月以上
- C. 出生4个月以上
- D. 出生8个月以上
- E. 1岁以上

**正确答案： A**

**参考解析：**乙肝疫苗接种第1次为出生后24小时内，第2次为第1个月时，第3次为第6个月时。

(26.)在新生儿期，先天性甲状腺功能减退症患儿最早出现的症状是

- A. 低体温
- B. 易哭闹
- C. 不能正常饮食
- D. 腹胀
- E. 生理性黄疸延长

**正确答案： E**

**参考解析：**先天性甲状腺功能减退症在新生儿期最早出现的表现为生理性黄疸时间延长，达2周以上。

(27.)新生儿Apgar评分指标不包括

- A. 心率
- B. 体温
- C. 呼吸
- D. 皮肤颜色
- E. 喉反射

**正确答案： B**

**参考解析：**Apgar评分包括心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色。

(28.)患儿男，11个月。自5个月起常有抽搐发作，至今不能独坐和认识父母。查体：表情呆滞，皮肤白皙，头发黄褐色，尿有鼠臭味。该患儿最可能的情况是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 21-三体综合征
- C. 苯丙酮尿症
- D. 脑肿瘤
- E. 癫痫

**正确答案： C**

**参考解析：**

典型的苯丙酮尿症表现为智力低下，出生后 3~6 个月可出现呕吐、喂养困难、生长缓慢等症状，逐渐加重，1 岁左右症状明显。90% 的患儿的毛发逐渐变为棕色或黄色、皮肤变白、1/3 患儿皮肤干燥，常有湿疹、虹膜色泽变浅，尿液和汗液有鼠尿味。

(29.) 三度房室传导阻滞伴阿-斯综合征的首选治疗是

- A. 阿托品
- B. 异丙肾上腺素
- C. 安装人工心脏起搏器
- D. 去甲肾上腺素
- E. 呼吸兴奋药

**正确答案： C**

**参考解析：**二度 II 型房室传导阻滞和完全性房室传导阻滞病人，心室率缓慢，伴有血流动力学障碍，出现阿-斯综合征时，应立即按心搏骤停处理。反复发作者应及时安装人工心脏起搏器。

(30.) 患儿，女，3 天，生后持续性发绀，最可能的情况是

- A. 肺透明膜病变
- B. 室间隔缺损
- C. 法洛四联症
- D. 动脉导管未闭
- E. 主动脉狭窄

**正确答案： C**

**参考解析：**因心脏结构的异常，静脉血流入右心后不能全部流入肺循环达到氧合作用，有一部分或大部分自右心或肺动脉流入左心或主动脉，直接进入体循环，出现持续性发绀。常见有法洛四联症、大动脉错位等。

(31.) 颈椎骨折脱位合并颈髓横贯伤的早期会出现

- A. 心动过速
- B. 呼吸运动减弱
- C. 胸部以下感觉障碍
- D. 大、小便失禁
- E. 上肢肌肉无力

**正确答案： B**

**参考解析：**颈髓内有呼吸中枢。

(32.) 男，32 岁。被车撞伤左胸，造成第 4~7 肋骨骨折，左胸中量积液，行胸腔闭式引流，引流出血性液体 540ml，其血胸属于

- A. 少量血胸
- B. 中等量血胸
- C. 大量血胸
- D. 感染性血胸

E. 纤维性血胸

正确答案： B

**参考解析：**500~1000ml 的出血属于中量血胸。

(33.) 呼吸系统疾病最常见的症状是

- A. 咳嗽
- B. 咳痰
- C. 痰中带血
- D. 呼吸困难
- E. 发热

**正确答案：** A

**参考解析：**咳嗽是呼吸系统疾病最常见的症状之一。

(34.) 对于臀位阴道分娩不正确的说法是

- A. 临产发动后卧床保持体力
- B. 严密监测胎心
- C. 勿灌肠
- D. 少做肛门检查
- E. 阴道口见胎足，为子宫颈口开全

**正确答案：** E

**参考解析：**阴道口见胎足，不能作为子宫颈口开全的标志。

(35.) 急性胰腺炎最基本的治疗方法是哪一项

- A. 手术治疗
- B. 使用抗生素
- C. 营养支持
- D. 禁食及胃肠减压
- E. 解痉、止痛

**正确答案：** D

**参考解析：**禁食及胃肠减压可减少胃酸与食物刺激胰液分泌，减轻腹痛与腹胀。是治疗急性胰腺炎最基本的方法。

(36.) 在初次使用胰岛素治疗时，一般选用

- A. 速效胰岛素制剂从小剂量开始
- B. 长效胰岛素制剂从大剂量开始
- C. 速效胰岛素制剂从大剂量开始
- D. 速效胰岛素与长效白胰岛素制剂联合应用
- E. 长效胰岛素制剂从小剂量开始

**正确答案：** A

**参考解析：**胰岛素个人剂量差异很大，需严格个体化。一般初始先用速效制剂，小量开始，逐渐增量。

(37.) 初产妇，28 岁，宫口已开全 2.5 小时后，胎儿还未娩出。该产妇发生了

- A. 第二产程延长
- B. 潜伏期延长

- C. 胎盘滞留
- D. 胎盘嵌顿
- E. 活跃期停滞

**正确答案： A**

**参考解析：**第二产程初产妇超过 2 小时，经产妇超过 1 小时尚未分娩，为第二产程延长。

(38.)男，35 岁。发热 10 天，心悸 2 天。心电图示：室性心动过速，心室率 170 次/分。静脉推注利多卡因无效，测血压 70/42mmHg，应准备立即给予

- A. 非同步电复律
- B. 同步电复律
- C. 继续静脉注射利多卡因
- D. 静脉注射胺碘酮
- E. 静脉注射普鲁卡因胺

**正确答案： B**

**参考解析：**阵发性室性心动过速发作时治疗首选利多卡因静脉注射，其他药物有普鲁卡因胺、苯妥英钠、胺碘酮等。如上述药物无效，或病人已出现低血压、休克、心绞痛、充血性心力衰竭、脑血流灌注不足时，可用同步直流电复律。

(39.)女，32 岁。停经 6 周。现厌食，恶心，呕吐频繁，饮水也吐，尿量少，无发热，精神萎靡，皮肤干燥。妇科检查：宫体如孕 6 周大小，宫体软，附件（-）。实验室检查：妊娠试验(+)，尿酮体（+++）。最可能的情况是

- A. 早期妊娠合并传染性肝炎
- B. 妊娠剧吐
- C. 葡萄胎
- D. 妊娠合并胃肠道感染
- E. 妊娠合并肾炎

**正确答案： B**

**参考解析：**妊娠剧吐、不能进食等可出现酮尿。又因病人妊娠试验阳性，因此可判断为妊娠剧吐。

(40.)女，57 岁。患肺脓肿，住院治疗 5 个月余仍反复咯血，首选的治疗方法是

- A. 稀释痰液及体位引流
- B. 大剂量联合使用抗生素
- C. 超声雾化吸入药物
- D. 抗炎及输血
- E. 肺叶切除

**正确答案： E**

**参考解析：**肺脓肿病程超过 3 个月，经内科治疗病变未见明显吸收，并有反复感染、咯血者可手术切除。

(41.)女，45岁。因车祸致颅内血肿，昏迷，并频繁呕吐。拟手术清除血肿，术前预防脑疝形成的有效措施是

- A. 冬眠低温疗法
- B. 避免剧烈咳嗽和便秘
- C. 限制液体摄入量
- D. 静脉注射氢化可的松
- E. 快速静脉滴注甘露醇

**正确答案： E**

**参考解析：**降低颅内压最快的方式是使用甘露醇。

(42.)肺炎球菌肺炎在炎症消散后常见有

- A. 肺部遗留纤维化
- B. 形成空洞，迁延不愈
- C. 肺组织完全恢复正常
- D. 造成胸膜粘连、增厚
- E. 以上都不是

**正确答案： C**

**参考解析：**因肺炎球菌不产生毒素，故不引起原发性组织坏死和形成空洞，炎症消散后肺组织结构多无破坏，不留瘢痕。

(43.)区分轻型与重型腹泻的依据是

- A. 呕吐、腹泻的次数
- B. 有无水、电解质紊乱
- C. 大便镜检可见脂肪球
- D. 酸中毒程度
- E. 患者精神状态

**正确答案： B**

**参考解析：**重型与轻型腹泻的区别不仅参考腹泻次数及量，最主要是有无水电和酸碱平衡紊乱。

(44.)一侧面部和肢体瘫痪为

- A. 截瘫
- B. 偏瘫
- C. 局部性瘫痪
- D. 交叉性瘫痪
- E. 软瘫

**正确答案： B**

**参考解析：**偏瘫：表现为一侧面部和肢体瘫痪，常见于一侧大脑半球病变，如脑梗死等。

(45.)对于淋病的描述正确的是

- A. 潜伏期长达3~5周

- B. 病理分急性和慢性两种
- C. 下肢水肿
- D. 慢性淋病时，淋菌存在于生殖器分泌物中
- E. 镜下血尿为早期症状

**正确答案： B**

**参考解析：**临床表现：潜伏期 3~7 天，60%~70%病人无症状。病理分为急性和慢性两种。急性淋病最早症状为尿痛、尿频、排尿困难。慢性淋病淋菌可长期潜伏在尿道旁腺、前庭大腺深处并反复发作。

(46.) 预防缺铁性贫血，早产儿补充铁剂的时间是

- A. 1 月龄
- B. 3 月龄
- C. 6 月龄
- D. 2 月龄
- E. 8 月龄

**正确答案： D**

**参考解析：**早产儿补充铁剂从 2 个月开始，足月儿从 4 个月开始，及时添加含铁丰富的辅食。

(47.) 患儿，男，7 岁，诊断为“急性淋巴细胞白血病”。以下症状提示有中枢神经系统受累的是

- A. 关节疼痛明显
- B. 发热
- C. 头痛、呕吐、嗜睡
- D. 皮肤出血点
- E. 肝、脾大及淋巴结肿大

**正确答案： C**

**参考解析：**发生脑膜白血病时可出现头痛、呕吐、嗜睡、惊厥等。

(48.) 女，5 岁。下午突然呕吐数次，随之抽搐，以昏迷待查急诊入院。查体：唾液过多，心率缓慢，瞳孔缩小，呈浅昏迷状态，本患儿最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 食物中毒
- C. 有机磷中毒
- D. 药物中毒
- E. 脑炎

**正确答案： C**

**参考解析：**毒蕈碱样症状：食欲缺乏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、流涎、多汗、视物模糊、瞳孔缩小、呼吸道分泌物增加、支气管痉挛、呼吸困难、肺水肿。该患儿表现符合毒蕈碱样症状，故医疗诊断为有机磷中毒。

(49.) 护士在向慢性胃炎患者进行健康宣教，其中不应该包括下列哪项

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/677050011021010056>