
An abstract graphic on the left side of the slide. It features a large, light gray circle. Inside this circle, there are many thin, concentric, irregular lines that create a ripple effect. In the center of these lines is a solid black, irregular shape that resembles a brain or a specific anatomical structure.

急性颅脑损伤的急救 与护理

目录

- **急性颅脑损伤概述**
- **急性颅脑损伤急救措施**
- **急性颅脑损伤护理原则**
- **常见并发症及其处理策略**
- **药物治疗与营养支持方案**
- **康复训练与生活质量提升方法**




急性颅脑损伤概述

定义与分类

定义

急性颅脑损伤是指由于外力作用于头部而造成的颅骨、脑膜、脑血管和脑组织的机械形变，引起暂时性或永久性脑功能障碍。



分类

根据损伤程度和部位，可分为轻型、中型、重型和特重型颅脑损伤；根据损伤部位，可分为开放性和闭合性颅脑损伤。



发病原因及危险因素




发病原因

交通事故、高处坠落、暴力打击、
工伤事故等。



危险因素

年龄（儿童和老年人更易受伤）、
性别（男性多于女性）、职业
（建筑工人、军人等高风险职业）
、酗酒、药物滥用等。




临床表现与诊断依据


临床表现

头痛、恶心、呕吐、意识障碍、瞳孔改变、癫痫发作、肢体瘫痪等。

诊断依据

根据病史、临床表现和影像学检查（如CT、MRI等）进行综合诊断。同时，需密切关注患者病情变化，及时调整治疗方案。





急性颅脑损伤急救措施



现场初步处理

1

立即拨打急救电话，告知医护人员伤者情况和所在位置。

2

评估伤者的意识、呼吸、脉搏等生命体征，检查是否有明显的外伤或出血。

3

若伤者意识清醒，可询问其症状，了解其是否有头痛、恶心、呕吐等颅内压升高的表现。



保持呼吸道通畅

STEP 01



确保伤者呼吸道畅通，及时清除口腔和鼻腔内的分泌物或异物。

STEP 02



若伤者出现呕吐，应将其头部偏向一侧，避免呕吐物堵塞呼吸道。

STEP 03




对于昏迷或呼吸困难的伤者，应立即进行气管插管或气管切开，以保持呼吸道通畅。

控制出血和降低颅内压


对于头皮裂伤或颅骨骨折引起的外出血，应用干净的纱布或绷带进行加压包扎止血。

严密观察伤者的意识、瞳孔、生命体征等变化，及时发现并处理颅内压升高的症状。



若伤者出现耳鼻漏液，提示颅底骨折，此时应避免填塞或冲洗，以免引起颅内感染。

遵医嘱给予伤者降颅内压药物，如甘露醇等，以降低颅内压，减轻脑水肿。



急性颅脑损伤护理原则

预防并发症发生

保持呼吸道通畅，及时清除呼吸道分泌物，防止窒息和肺部感染。

1

加强营养支持，提高患者免疫力，预防感染。

4

2

加强皮肤护理，保持床铺平整、干燥、无渣屑，防止压疮发生。

3

做好口腔护理，保持口腔清洁，预防口腔感染。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/677146062034006061>