

儿科学试题库+答案

1、营养不良患儿脱水时多见

- A、低渗性脱水
- B、等渗性脱水
- C、高渗性脱水
- D、高血钾症
- E、低血钾症

答案：B

2、小儿单纯型肾病综合征可出现的异常结果是

- A、持续性氮质血症
- B、24 小时尿钙增高
- C、血浆球蛋白增高
- D、病程早期血清补体 C3 降低
- E、选择性蛋白尿

答案：E

3、“4~6 个月婴儿不宜添加的食物是

- A、水果泥
- B、米粉 ”
- C、肉沫
- D、配方奶
- E、菜泥

答案：C

4、维生素 D 缺乏性佝偻病初期的临床表现是

- A、免疫力低下
- B、语言发育落后
- C、运动增多
- D、肌肉松弛
- E、非特异性神经精神症状

答案：E

5、“生后 8 个月时应接种的疫苗是

- A、流感疫苗
- B、卡介苗
- C、脊髓灰质炎疫苗
- D、百白破疫苗 ”
- E、麻疹疫苗

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

答案：E

6、表明氢离子释放急剧增加最先发生改变的是：

- A、PH 值急剧上升
- B、HC03-浓度急剧上升
- C、PH 值急剧下降
- D、HC03-浓度急剧下降
- E、氯浓度急剧上升

答案：A

7、造成先天性甲状腺功能减退症最主要的原因是

- A、甲状腺不发育或发育不全
- B、碘缺乏
- C、促甲状腺激素缺陷
- D、甲状腺或靶器官反应低下
- E、甲状腺素合成途径中酶缺乏

答案：A

8、接触麻疹的易感者需检疫观察的时间是

- A、7 天
- B、5 天
- C、14 天
- D、21 天
- E、10 天

答案：D

9、急性肾炎患儿恢复上学的标准是

- A、水肿消退
- B、血沉正常
- C、蛋白尿消失
- D、血尿消失
- E、血压正常

答案：B

10、1 岁女孩, 面色苍黄 1 个月, 易疲乏, 食欲减退。体检: 肝肋下 3cm, 质中, 脾肋下 1.5cm。查血常规:

Hb90g/L, RBC $2.45 \times 10^{12}/L$, MCV98fl, MCH34pg, MCHC35%。最可能的诊断是

- A、溶血性贫血
- B、再生障碍性贫血
- C、缺铁性贫血

D、巨幼细胞贫血

E、感染性贫血

答案：D

11、风疹与麻疹的主要鉴别点是

A、呈充血性斑丘疹

B、皮疹为全身性分布

C、皮疹1日内出齐

D、外周血白细胞减少

E、全身症状轻

答案：E

12、患儿，女，1岁。冬季发病，出现腹泻，水样大便，无腥臭味，每日7~8次。大便常规检查未见异常，患儿最可能出现的酸碱平衡紊乱是

A、代谢性酸中毒

B、混合型酸中毒

C、代谢性碱中毒

D、呼吸性碱中毒

E、呼吸性酸中毒

答案：A

13、小儿身高低于哪项数字时为异常

A、低于正常30%

B、低于正常15%

C、低于正常10%

D、低于正常20%

E、低于年龄 $\times 7 + 70$ cm

答案：A

14、1/5张生理维持液

A、生理盐水1份，加5%GS4份

B、生理盐水2份，加1.4%NaHCO₃1份

C、生理盐水2份，加1.4%NaHCO₃1份，加5%ES3份

D、生理盐水4份，加NaHCO₃2份，加5%和3份

E、生理盐水4份，加NaHCO₃2份，加5%和3份

答案：A

15、患儿，女，10岁。浮肿、尿少2天，血压130/790mmHg。尿常规检查：蛋白(+)，红细胞12个/HP。最适宜的治疗药物是

A、泼尼松

- B、螺内酯
- C、呋塞米
- D、多巴胺
- E、硝普钠

答案：C

16、正常小儿开始能随物品或声音转动头部是：

- A、3个月
- B、6个月
- C、5个月
- D、4个月
- E、7个月

答案：A

17、小儿第一年内身长的增长主要是：

- A、颈的增长
- B、头的增长
- C、躯干的增长
- D、下肢的增长
- E、各部的增长速度一致

答案：C

18、烦躁、烦渴,高热尿少,尿比重高为

- A、重度等渗性脱水
- B、高渗性脱水
- C、重底低渗性脱水
- D、中度低渗性脱水
- E、中度等渗性脱水

答案：B

19、局限性胸痛、按压后疼痛加重,提示病变主要累及的部位是

- A、胸壁软组织
- B、肋间神经
- C、壁层胸膜
- D、脏层胸膜
- E、临近胸膜肺组织

答案：A

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

20、女婴, 7 天。因拒奶 2 天, 黄疸加重就诊。查体: 一般反应差, 前凶平, 全身皮肤中度黄染, 心肺无异常, 肝肋下 3cm, 脐部少许脓性分泌物。实验室检查: 血 WBC $19 \times 10^9/L$, N 0.85%, L 0.15%, 血糖 3.5mmol/L。其最可能的诊断是

- A、新生儿溶血病
- B、新生儿化脓性脑膜炎
- C、新生儿脐炎
- D、新生儿低血糖症
- E、新生儿败血症

答案: E

21、苯丙酮尿症的遗传形式为

- A、常染色体隐性遗传
- B、X 连锁隐性遗传
- C、X 连锁显性遗传
- D、X 连锁不完全显性遗传
- E、常染色体显性遗传

答案: A

22、新生儿败血症的早期临床特点是

- A、体重不增
- B、食欲减退
- C、缺乏特异性症状
- D、不哭, 懒动
- E、发热

答案: C

23、2 岁小儿身长约

- A、50cm
- B、32cm
- C、85cm
- D、95cm
- E、75cm

答案: C

24、小儿出牙延迟的判断标准是

- A、>10 个月未出牙
- B、>6 个月未出牙
- C、>24 个月未出牙
- D、>13 个月未出牙

E、>4 个月未出牙

答案：D

25、男,6 岁。发热 2 周,轻咳,精神差,一直抗生素静脉治疗,仍发热。近 2-3 天诉头痛,时有呕吐,突起抽搐,经用止痉剂、脱水剂好转后仍有间断抽搐。为明确诊断,首要的检查是

A、血培养

B、脑脊液检查

C、血钙测定

D、PTH 测定

E、脑电图

答案：C

26、男孩,14 个月,发热咳嗽 3 天,气急发绀、烦躁不安 2 小时入院。体检:体温 39.5℃,气急,面色苍白,明显三凹征,呼吸 60 次/分,心率 180 次/分,两肺布满中细湿啰音,肝肋下 3cm。胸片示右下肺点片状阴影,该患儿紧急处理原则是

A、吸氧、镇静、强心、血管活性药

B、吸氧加用抗生素

C、地塞米松

D、镇静、退热、祛痰、止咳

E、能量合剂

答案：A

27、“正常 2 岁小儿的头围大约是

A、46cm

B、44cm

C、50cm ”

D、48cm

E、52cm

答案：D

28、男孩,4 岁。生长落后,活动后气促。查体:胸骨左缘第 2~3 肋间有 3/6 级收缩期喷射性杂音,P2 亢进。X 线片示右心房、右心室扩大,前最佳的治疗方案是

A、防治感染

B、口服卡托普利

C、随访观察

D、口服吲哚美辛

E、手术修补

答案：E

29、“1岁以内婴儿每天每公斤所需能量约为

A、130kcal

B、110kcal

C、150kcal

D、90kcal

E、70kcal

答案：B

30、“判断小儿体格发育最常用的指标是

A、智能发育水平

B、体重、身高、头围”

C、动作发育能力

D、语言发育程度

E、神经反射发育

答案：B

31、足月女婴，母乳喂养，吸吮好，哺后安睡，生后4天体重下降7%。查体反应好，面色红润，心肺(-)。此婴可能的原因是

A、生理性体重下降

B、进水多，进乳量少

C、进乳量多，进水少

D、败血症

E、呆小病

答案：A

32、足月婴，生后1天内出现黄疸，拒哺。查体：嗜睡，面色苍白，Hb90g/L，血清未结合胆红素342 μ mol/L。首选的治疗是

A、输注葡萄糖液

B、应用抗生素

C、应用病毒唑

D、换血疗法

E、光照疗法

答案：D

33、小儿体格发育的两个高峰期是

A、学龄期，学龄前期

B、青春期，幼儿期

- C、青春期, 婴儿期
- D、青春期, 学龄期
- E、学龄期, 新生儿期

答案: C

34、8 个月男孩, 持续高热, 频咳, 精神萎靡 5 天, 近 2 天气促加重, 今抽搐 3 次, 全身性发作, 嗜睡。查体: 体温 40.0℃, 呼吸 56 次/分, 心率 148 次/分, 双肺少量中细湿啰音, 左下肺可闻管状呼吸音。白细胞计数 $4.0 \times 10^9/L$, 腰椎穿刺脑压稍高, 脑脊液常规正常, 最可能的诊断是

- A、金黄色葡萄球菌肺炎
- B、肺炎链球菌肺炎
- C、毛细支气管炎
- D、腺病毒肺炎
- E、支原体肺炎

答案: D

35、支气管肺炎与支气管炎的主要区别点是

- A、发热、频咳
- B、白细胞增高
- C、呼吸音减弱
- D、气促、喘憋
- E、肺部可闻固定湿啰音

答案: E

36、易位型 21-三体综合征最常见的核型是

- A、46, XY, -21, +t21q21q
- B、46, XY, -22, +t21q22q
- C、46, XY, -13, +t13q21q
- D、46, XY, -21, +t14q21q
- E、46, XY, -15, +t15q21q

答案: D

37、1 岁男孩, 腹泻 3 天, 加重 2 天, 于 2006 年 11 月就诊。黄色水样便, 每 10 余次, 量多, 无霉臭味和腥臭味, 伴低热、呕吐, 尿量明显减少 1 天。查体: 精神萎靡, 呈嗜睡状, 方颅、枕秃, 前囟 2.0cm, 前囟、眼窝明显凹陷, 皮肤弹性差, 可见花纹, 手脚凉, 脉搏弱, 心音低钝, 双肺(-), 腹较胀, 肠鸣音正常, 肝脾不大。粪常规白细胞 1~2 个/HP, 血钠 125mmol/L, 血钾 3.5mmol/L。若患儿经有效的补液、纠酸治疗后, 突然出现惊厥, 最可能是

- A、低钠血症

君子忧道不忧贫。——孔丘

- B、低钾血症
- C、低钙血症
- D、颅内感染
- E、中毒性脑病

答案：C

38、首选的检查方法是

- A、尿三氯化铁试验
- B、染色体核型分析
- C、血钙测定
- D、血氨基酸分析
- E、血清 T3、T4、TSH 测定

答案：A

39、何时起出现第一个条件反射

- A、出生 1 周内
- B、出生 1-2 周
- C、出生 3 周时
- D、出生 4 周时
- E、以上都不是

答案：B

40、女婴, 11 个月。面色苍白伴萎靡不振 1 个月。生后混合喂养, 未添加辅食。查体: 皮肤黏膜苍白, 肝肋下 1cm, 心肺无异常。实验室检查: Hb85g/L, RBC $3.5 \times 10^{12}/L$, 红细胞平均容积 68fl, 血清蛋白降低。最可能的诊断是

- A、再生障碍性贫血
- B、缺铁性贫血
- C、叶酸缺乏性巨幼红细胞贫血
- D、溶血性贫血
- E、维生素 B12 缺乏性巨幼红细胞贫血

答案：B

41、女孩, 2 岁。发热、流涕、咳嗽 3 天, 皮疹 6 小时。查体: 精神萎靡, 前额及耳后有浅红色斑丘疹, 眼结膜充血, 口腔黏膜粗糙, 两肺呼吸音粗。最可能的诊断是

- A、幼儿急疹
- B、咽结合膜热
- C、川崎病

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

D、风疹

E、麻疹

答案：E

42、萌出第一颗恒牙的时间一般为

A、6 岁左右

B、8 岁左右

C、9 岁左右

D、5 岁左右

E、7 岁左右

答案：A

43、男, 11 个月。母乳喂养, 近 3 月面色渐苍黄, 间断腹泻, 原可站立, 现坐不稳, 手足常颤抖。体检: 面色苍黄, 略水肿, 表情呆滞。血红蛋白 80g/L, 红细胞 $2.0 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ 。该患儿可能的诊断是

A、营养性巨幼红细胞性贫血

B、维生素 D 缺乏性手足搐搦症

C、营养性缺铁性贫血

D、大脑发育不全

E、维生素 D 缺乏症

答案：A

44、女, 8 岁、3 周前曾患脓疱病。水肿、少尿、肉眼血尿 3 天, BP150/105mmHg。尿常规: 蛋白(+), 大量红细胞, 管型 1~2/HP。ASO 升高, 血沉增快, 血补体 C, 下降, 应限制钠盐摄入直到

A、血沉正常

B、尿常规正常

C、水肿消退, 血压正常

D、补体恢复正常

E、肉眼血尿消失

答案：C

45、猩红热的最常见并发症是

A、急性喉炎

B、急性肺炎

C、急性脑炎

D、急性肝炎

E、急性肾炎

答案：E

46、小儿会翻身的年龄为：

- A、4 月
- B、6 月
- C、8 月
- D、10 月
- E、7 月

答案：E

47、女孩, 9 岁, 水肿 1 个月。查体:BP135/95mmHg, 颜面和四肢明显水肿。实验室检查:尿蛋白(++++), 24 小时尿蛋白定量 2.5g, 血浆白蛋白 28g/L, 尿素氮 10mmol/L, 血补体 C30.65g/L, 患儿突然出现肉眼血尿伴腰痛, 最可能并发

- A、肾静脉血栓
- B、间质性肾炎
- C、肾衰竭
- D、肾结石
- E、泌尿系感染

答案：A

48、法洛四联症患者青紫的程度主要取决于

- A、室间隔缺损的大小
- B、室间隔缺损的部位
- C、主动脉骑跨的程度
- D、右心室肥厚的程度
- E、肺动脉狭窄的程度

答案：E

49、10 个月男婴, 不能独坐, 眼距宽, 眼裂小, 鼻梁低平, 皮肤细嫩, 舌伸出口外, 通贯掌, 可能的诊断是

- A、苯丙酮尿症
- B、先天性脑发育不全
- C、呆小病
- D、先天愚型
- E、佝偻病活动期

答案：D

50、6 个月女婴。发热 3 天, 体温 39℃。查体:一般情况良好, 咽充血, 耳后淋巴结肿大, 心肺无异常, 肝脾未触及。患儿热退后皮疹出现。可能的诊断是

- A、猩红热
- B、水痘

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/678021124137007023>