

医学研究过程中最关键的阶段是

A 科研设计

B 选题和确立问题过程

C 收集资料

D 撰写论文

临床研究的选题依据是

A 入选择热门前沿的问题

B 选择临床上迫切需要解决，疾病负担重的问题

C 以国外正在或已经开展的研究为依据

D 与国际接轨

进行临床疗效考核实验设计时，下列那一条是错的

A 随机分组，设计对照

B 要有足够的样本数

C 要有明确的疗效判断标准

D 要使调查者和被调查者明确受试因素

随机抽样的主要目的是

A 减少样本量

B 消除抽样误差

C 提高样本的代表性

D 避免研究对象主观因素对结果的影响

临床试验中的“双盲”研究是指

A 研究对象既不知道所属组别，也不知道所用药物种类

B 观察者和受试对象均不知道分组情况

C 研究组和对照组都不知道观察者的身份

D 研究组接受新药，对照组接受安慰剂

某心血管内科医师欲研究一种新型降压药的效果，试验组以该降压新药为干预措施，对照组最好给予

A 疗效明确的另一种常规降压药

B 另一种新进使用的降压药

C 不施加任何处理

D 安慰剂

关于样本含量的描述，错误的说法是

A 纳入全部病例进行研究，可以取得完整，无一遗漏结果，但可能出现系统

B 在估计样本含量的基础上，还要审视它对总体的代表性

C 临床研究中，应选择最适合的样本含量

D 样本含量越大约好

某广告声称：“用金霉素治疗 1000 名上呼吸道感染的儿童有 900 名在 72 小时内症状消失。”

我们是否可以得到以下结论：应选择金霉素治疗儿童的上呼吸道感染

A 正确

B 不正确，因为不是根据率比较

C 不正确，因为没有对照组

D 不正确，因为样本量太少

关于随机对照试验的描述，下列哪项描述不正确

A 是评价干预措施疗效的标准设计方案

B 将研究对象随机分配到干预组

C 适用于任何类型临床类问题的研究

D 可用于疫苗效果的评估

在病例对照研究中，研究对象选择时，下列何项考虑是正确的

A 应选择有暴露的病例

B 应选择有暴露的对照

C 应选择无暴露的对照

D 不应考虑其有无暴露

实验性研究中采用双盲法的主要目的是

- A 减少抽样误差的影响
- B 使实验组和对照组不知道实验目的
- C 消除研究者和研究对象对结果的主观影响
- D 使实验组和对照组人口学特征更具有可比性

临床试验中采用随机分组法，其目的是

- A 使试验更有代表性
- B 使实验组和对照组人数相等
- C 使试验因素对实验组对照组作用均衡
- D 使非实验因素对实验组对照组作用均衡

为避免各种偏倚的影响，最佳的对照类型是

- A 非随机对照
- B 自身前后对照
- C 随机同期对照

D 不同医院的对照

有关 ROC 曲线的描述哪一项不正确

A 可确定诊断试验的参考值

B 比较两个以上独立的诊断试验的优劣

C 曲线下的面积越接近 1，则该试验的准确度就越高

D 曲线上敏感度最高的点或邻近点是确定参考值的最佳临界点

关于多中心临床试验，不正确的说法是

A 完成临床试验的时间较短

B 获得结论适用面广

C 由多个中心各自独立完成

D 研究管理及执行比较复查

关于疾病预后因素的描述，不正确的说法是

A 预后因素的研究可以有助于改善疾病的预后

B 预后因素是指作用于健康人，能使其增加患病危险性的因素

C 早期治疗可以改善疾病的预后

D 医疗制度、社会经济条件、病人的病程等会影响预后

对慢性疾病的临床干预研究，除了常规的疗效、不良反应等指标外，目前提倡考虑

A 生命质量、卫生经济学指标

B 统计学指标

C 病程、病史特征

D 生存率、死亡率指标

验证病因假设最可靠的方法是

A 病例对照研究

B 现况调查

C 队列研究

D 随机对照试验

一项随机对照试验结果显示，治疗组死亡率为 5% ，无治疗的对照组死亡率为 10% ，两组死亡率差的 95% 可信区间为（-5% ， 20% ），以下哪个结论最为恰当

- A 该治疗无效
- B 该治疗有害
- C 两组死亡率的差别没有实际意义
- D 该治疗可能有效，也可能有害，尚不能作出结论

与队列研究相比较，病例对照研究的缺点是

- A 花费大，时间长
- B 确定可疑暴露因素时容易出现偏差
- C 确定疾病情况时容易出现偏差
- D 很难保证病例和对照的可比性

随机对照试验控制偏倚的主要措施是

- A 对比
- B 限制

C 随机分组

D 多元回归分析

随机对照试验不适合于研究病因主要是由于

A 伦理原因

B 代表性不好

C 真实性不好

D 费用太高

在临床研究中关于对照的处理方式，下述正确的是

A 空白对照等于不设对照

B 安慰剂对照能有效避免医德问题

C 安慰剂对照的效果与空白对照相同

D 有效对照是最常用的对照方式

下列哪项说法违背了诊断性试验的基本原则

应确定某疾病诊断试验的金标准诊断方法

B 应纳入足够的样本量

采用双盲法的比较和评估并不能影响结果真实性

D 诊断性试验和金标准诊断同期进行

决定一项临床研究结果内部真实性的最主要的因素是

A 该研究使用的偏倚控制措施

B 该研究的样本量

C 该研究的研究设计类型

D 该研究的代表性

关于研究证据的内在真实性，下面哪项描述是正确的

A 内在真实性是指研究结果避免随机误差的程度

B 内在真实性是指研究本身是否真实或有效

C 内在真实性是指研究结果的临床适用价值

内在真实性是指研究结果是否能够应用于同类人群

下列论述哪项是正确的

- A 具有内部真实性的结果就有外部真实性
- B 增加研究对象的同质性可改善外部真实性
- C 没有内部真实性的结果也可能有外部真实性

只有内部真实性而无外部真实性的证据，难以推广应用至 人群以外

临床研究证据按来源分为

- A 前瞻性研究和回顾性研究证据
- B 试验性研究和非试验性研究证据
- C 原始研究和二次研究
- D 病因、诊断、治疗和预后研究

一位研究者为了探讨新生儿黄疸的病因，他选择了 100 名患此病的婴儿，并

名为患此病的新生婴儿，然后查阅了婴儿母亲的孕期保健和产科分娩记录，

病例对照研究

B 临床试验研究

C 横断面研究

D 队列研究

开展临床研究时，有关排除标准的描述，正确的是

A 只要制定纳入标准即可，不需要专门制定排除标准

B 排除标准不是纳入标准的对立面，两者是互补的

C 制定排除标准，可进一步提高试验研究结果的可靠性

D 有试验药物过敏或不良反应者应列入排除范围

E 一般将孕妇列为新药评价试验的排除对象

关于随机对照试验的描述，下列哪些描述是正确的

A 将研究对象随机分配入组

试验组和对照组要同时进行研究

C 试验组和对照组的研究场所相同

D 试验组和对照组的试验期间一致

纳入研究的对象不能退出

选择研究课题时，应重点考虑下列哪些要素

A 科学性

B 可行性

C 创新性

D 效能性

E 复杂与全面性

内在真实性评价包括哪些方面

A 设计方案是否优选

B 实施方法是否正确

统计方法是否正确

干预措施的效应大小

E 干预措施不良反应发生率大小

临床研究设计中设对照组的目的在于

A 排除干扰因素

B 使样本具有代表性

C 使结果具有可比性

D 使符合样本条件

E 使符合研究目的

实验性研究具备下列哪些特征

A 设对照组

B 随机分组

C 人为施加干预措施

必须盲法

E 足够的样本量

临床研究过程中应考虑到

研究对象的复杂性

B 研究设计严谨

C 测量指标的不稳定性

D 临床研究的特殊性

E 研究结果的统计学分析

在临床研究设计中，提高比较组均衡性的方法包括

A 保持比较组样本含量相等

B 明确研究对象的纳入、排除标准

C 采用随机化分组

D 统一临床指标检测标准

E 采用匹配设计方案

在临床药物疗效评价研究中使用的安慰剂应该与试验药物

A 在色香味上相同

B 在给药途径上相同

C 在治疗效果上相同

D 在给药途径上相同

E 在毒副反应上相同

随机对照试验的优点包括哪些

A 随机分配研究对象入组，组间可比性好

B 随机分配研究对象入组，可减少选择性偏倚

C 盲法测量结果，结果更真实可靠

D 不存在伦理问题

E 高质量的单个 RCT，可成为系统评价的可靠资源

可用于疾病预后的评价指标有

A 病死率、生存率

B 病残率

C 复发率、缓解率

D 健康相关生存质量

E 患病率

有关生命质量的叙述，下列哪些是正确的

A 生命质量是患者的主观感受

B 不同的患者具有不同的生命质量，即便是患同一疾病、或患同一疾病相同以
完全不相同

C 患者的生命质量与其文化背景、期望、价值观念以及对事物的要求等

D 不同的民族、不同的种族生命质量可以不同

E 生命质量不能用于评价疾病预后的指标

循证医学是指

A 利用系统评价的医学

B 利用 meta 分析的医学

C 将最佳证据、医生临床经验和病人意见有机结合的医学实践

D 查找证据的医学

循证医学实践的核心是

A 素质良好的临床医生

B 最佳的研究证据

C 临床流行病学基本方法和知识

D 患者的参与和合作

关于循证医学，下列说法错误的是

A 循证医学实践得到的最佳证据在用于具体病人的时候具有特殊性，必须

B 循证医学实践将为临床决策提供依据，因此唯一强调的是证据

C 循证医学不等于 Meta 分析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/678022120076006132>