

2024 甘肃省阿克塞哈萨克族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试真题（各地真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 发病急剧，常累及双眼（或间隔 1~2 天）伴有大量的黏液性分泌物（眼屎），于夜间分泌较多，在晨起时常会被分泌物糊住双眼的是
- A: 过敏性结膜炎
 - B: 急性卡他性结膜炎
 - C: 流行性结膜炎
 - D: 流行性出血性结膜炎

答案：B

2. 能增加感染和肿瘤风险的抗风湿药物是
- A: 雷公藤多苷
 - B: 白芍总苷
 - C: 青藤碱
 - D: 肿瘤坏死因子(TNF- α)拮抗剂

答案：D

3. 治疗高血压伴稳定性心绞痛何种药物为宜
- A: β -受体阻滞剂
 - B: 利血平
 - C: 硝苯地平
 - D: 甲基多巴

答案：A

4. 成人血小板计数正常参考区间是

- A: $(200 \sim 300) \times 10$
- B: $(100 \sim 300) \times 10$
- C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10$

答案：B

5. 患者女,55 岁,因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体:体温 38°C 中上及左上腹有压痛。化验结果:白细胞计数 $18.7 \times 10^9/\text{L}$,血清淀粉酶 1993U/L ,血脂肪酶 6116U/L 。其诊断可考虑是 ()

- A: 急性胃炎
- B: 急性胰腺炎
- C: 急性阑尾炎
- D: 急性胆囊炎

答案：B

6. 感冒伴随咳嗽的临床表现是

- A: 多为轻咳或干咳,偶见少量薄白痰,并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛
- B: 可有低热或高热,清瘦、轻咳、盗汗,有黄绿色痰
- C: 有慢性咳嗽,伴有大量脓痰及反复咯血
- D: 多发生于儿童,为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声,病程可达 2~3 个月

答案：A

7. 沿疗滴虫性阴道炎首选的药物是 ()

- A: 甲硝唑栓

- B: 吲哚美辛栓
- C: 伏立康唑片
- D: 莫匹罗星软膏

答案：A

8. 患者，女，55 岁，化验结果：TC4.0mmol/L（参考值参<5.2mmol/L），TG8.1mmol/L（参考值 0.56~1.70mmoL/L），应首选的调脂药物为

- A: 烟酸
- B: 氟伐他汀
- C: 苯扎贝特
- D: 依折麦布

答案：C

9. 患者，女，63 岁，患有支气管哮喘 3 年。近日出现咳嗽、多痰、发热（体温 38.7℃）等症状，家人来药店购药。针对患者的情况，药师给予的建议是

- A: 建议左氧氟沙星胶囊 400mgqd、氨溴索 10mltid、对乙酰氨基酚 300mgqid 在家治疗
- B: 建议头孢克洛干混悬剂 250mgtid、愈创木酚甘油醚片 0.2gtid、布洛芬 0.2gqid 在家治疗
- C: 建议家属送患者去医疗机构就诊
- D: 建议头孢氨苄胶囊 250mgqid、氨溴索 10mlqd、右美沙芬 15mgtid 在家治疗

答案：C

10. 属于浓度依赖性抗生素的是

- A: 美沙拉秦肠溶片
- B: 多黏菌素

C: 青霉素

D: 林可霉素

答案: B

11. 现代临床药物治疗更多依赖于循证医学的支持。循证医学证据分为几种，下列证据级别和推荐强度最高的是

A: 同质病例对照研究的系统评价

B: 单个大样本随机对照试验

C: 大样本病案系列

D: 同质随机对照试验的系统评价

答案: D

12. 静脉滴注给药前不宜选用氯化钠注射液溶解或稀释，以免出现浑浊的药品是

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 瑞替普酶

C: 依托泊苷

D: 阿昔洛韦

答案: A

13. 患者，女，52岁，患有2型糖尿病，餐前血糖正常，餐后升高，一直服用阿卡波糖控制。近期反映常出现低血糖表现，应建议患者随身携带

A: 果糖

B: 巧克力

C: 葡萄糖水

D: 麦芽糖

答案: C

14. (2015 年真题) 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用 ()。

- A: 左旋多巴
- B: 苯海索
- C: 多巴丝肼
- D: 司来吉兰

答案：B

15. 治疗腹痛较重或反复呕吐性腹泻宜选用的药物是

- A: 山莨菪碱
- B: 泛昔洛韦
- C: 双歧杆菌
- D: 庆大霉素

答案：A

16. 中度贫血的评价指标是血红蛋白 (Hb) 含量为 (g / L)

- A: <30
- B: 90~120
- C: 30~60
- D: 60~90

答案：D

17. 遭遇蛇类咬伤，最先采取的应急措施是

- A: 用布带等在伤口的近心端 5cm 处捆住
- B: 就地取材在伤口的远心端捆扎
- C: 用绳索等在伤口的近心端捆扎

D: 就地取材将伤口捆扎

答案：A

18. 马兜铃酸可导致

A: 前列腺素合成障碍

B: 肾间质纤维化

C: 阻塞肾小管、肾小球

D: 肾小管坏死

答案：B

19. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 肝功能损害

B: 粒细胞减少

C: 头痛

D: 皮疹

答案：B

20. 关于抗抑郁药的合理使用，下列说法错误的为（）

A: 多数需要至少 2 周才会起效

B: 在单胺氧化酶抑制剂停用的 14 天内不能使用 SSRIs 等抗抑郁药物

C: 如单药治疗无效时，考虑两种作用机制不同的抗抑郁药联合使用

D: 不能突然停止使用，以避免出现症状反弹和戒断综合征

答案：C

21. （2019 年真题）患者，女，29 岁，孕 29+6 周，血压 160/100mmHg，尿蛋白（-），该患者降压药应选用

- A: 卡托普利
- B: 氨氯地平
- C: 甲基多巴
- D: 厄贝沙坦

答案：C

22. 某患者，女性，57 岁，高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持剂量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 肾上腺素
- B: 苯妥英钠
- C: 阿托品
- D: 利多卡因

答案：C

23. 属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动力药是

- A: 昂丹司琼
- B: 甲氧氯普胺
- C: 莫沙必利
- D: 多潘立酮

答案：C

24. 主要降低 TG 兼降低 TC 的药物首选

- A: 阿昔莫司
- B: 氯贝丁酯
- C: 考来烯胺
- D: 氟伐他汀

答案：B

25. (2021 年真题) 在一定范围内, 其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是 ()

- A: HbA1c
- B: HDL-C
- C: TG
- D: LDL-C

答案：B

26. 连续使用不应超过 10 日, 并在使用期间定期测量眼压的滴眼液是

- A: 阿昔洛韦滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 磺胺醋酰钠滴眼液
- D: 泼尼松滴眼液

答案：D

27. 使用硫酸亚铁片预防缺铁性贫血, 元素铁的预防量是

- A: 100mg/次
- B: 60mg tid
- C: 60mg qd
- D: 60mg bid

答案：C

28. (2018 年真题) 下列药物中, 可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是 ()

- A: 银杏叶片
- B: 阿司匹林

C: 叶酸

D: 口服避孕药

答案: D

29. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC 15×10

A: 慢性肾盂肾炎

B: 急性肾小球肾炎

C: 急性肾盂肾炎

D: 急性膀胱炎

答案: C

30. 较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药物是

A: 布洛芬

B: 环孢素

C: 比沙可啶

D: 酮康环孢素唑

答案: D

31. (2016 年真题) 从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是 ()

。

A: 伪麻黄碱

B: 对乙酰氨基酚

C: 氯苯那敏

D: 布洛芬

答案: C

32. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

- A: 2HRZE / 4HR
- B: 2HRZE / 4HR
- C: 3HRZE / 9HR
- D: 2HRE / 7HR

答案：C

33. 抑制细菌核酸合成的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢米诺
- D: 利福喷汀

答案：D

34. 患者，男，60岁，因上臂出现湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 10%樟脑软膏
- B: 利巴韦林软膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 特比萘芬乳膏

答案：C

35. 可作为紧急避孕药，性生活后 72h 内必须服用的药物是

- A: 口服左炔诺孕酮(1.5mg)
- B: 甲羟孕酮 150mg 肌内注射
- C: 口服低剂量孕激素避孕药(炔诺酮 0.35mg)
- D: 短效复方口服避孕药

答案：A

36. 可中和碘类物质中毒的洗胃液是

- A: 淀粉溶液
- B: 3%鞣酸溶液
- C: 活性炭混悬液
- D: 1: 5000 高锰酸钾

答案: A

37. 苯巴比妥中毒较深，血药浓度达到一定水平后，需采用血液净化进行解救，一般要求

- A: 浓度超过 20mg / L 时给予血液净化
- B: 浓度超过 40mg / L 时给予血液净化
- C: 浓度超过 60mg / L 时给予血液净化
- D: 浓度超过 80mg / L 时给予血液净化

答案: D

38. 其含量用生育酚当量表示的是

- A: 维生素 B
- B: 维生素 E
- C: 维生素 D
- D: 维生素 A

答案: B

39. 应在餐前服用的药物是()

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 吡罗昔康片
- C: 氨茶碱片
- D: 呋塞米片

答案：A

40. 患儿，男，12 岁，连续 3 日夜间咳嗽就诊，首选的止咳药是

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 氨溴索
- D: 糖皮质激素

答案：A

41. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A: 粪肠球菌
- B: 大肠埃希菌
- C: 葡萄球菌
- D: 变形杆菌

答案：B

42. 依据 CTP 评分，肝功能不全 B 级病人用药剂量为正常患者剂量的

- A: 25%维持剂量
- B: 40%维持剂量
- C: 50%维持剂量
- D: 30%维持剂量

答案：A

43. 通过与肠黏膜接触，刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排出柔软成形粪便的药物是

- A: 硫酸镁
- B: 比沙可啶
- C: 乳果糖

D: 甘油栓

答案：B

44. (2017 年真题) 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h，已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是 ()

A: 15 滴

B: 25 滴

C: 50 滴

D: 7 滴

答案：B

45. 兴奋交感神经，引起高血压的药物是

A: 伪麻黄碱

B: 糖皮质激素

C: 咖啡因

D: 重组人促红细胞生成素

答案：C

46. 下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

A: 青霉素 G

B: 华法林

C: 地西泮

D: 头孢呋辛

答案：C

47. 饭后半小时服用的药物是 ()

A: 枸橼酸铋钾

B: 雷贝拉唑

C: 吉法酯

D: 瑞巴派特

答案: C

48. 临终关怀是对于预期寿命少于几个月的慢性病终末期患者的一项特殊疗护项目

A: 5

B: 12

C: 6

D: 10

答案: C

49. 缺铁性贫血最早和最常见的症状是

A: 食欲不振

B: 头晕

C: 乏力、困倦、活动耐力减退

D: 记忆力减退

答案: C

50. 长期高磷血症会导致心脏、血管钙化，腹膜透析者必须在进食的同时服用的药物是

A: 磷化物

B: 磷结合剂

C: 铁剂

D: 钙结合剂

答案: B

51. 常用的抗肿瘤药给药途径有：动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径用于对组织无刺激性的药物

- A: 动脉注射
- B: 腔内注射
- C: 静脉注射
- D: 肌内注射

答案：D

52. 药品不良事件简写为

- A: AE
- B: DUI
- C: ADE
- D: ADR

答案：C

53. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

- A: 阿米替林
- B: 艾司唑仑
- C: 丁螺环酮
- D: 舍曲林

答案：D

54. 巴比妥类重度中毒时出现的中枢神经系统症状为

- A: 昏迷、血压降低、呼吸抑制、心动缓慢和晕厥
- B: 可引起狂躁发作
- C: 可见心律失常、心搏骤停
- D: 呼吸减慢、变浅不规则，或呈潮式呼吸

答案：B

55. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇片 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋、话不成句，被紧急送往医院。

- A: 福莫特罗干粉吸入剂
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 沙丁胺醇片
- D: 沙美特罗-氟替卡松干粉吸入剂

答案：D

56. 李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

- A: 卡托普利
- B: 呋塞米
- C: 维拉帕米
- D: 硝酸甘油

答案：A

57. II 期临床试验很难发现“低于 1% 发生频率”的不良反应，缘于

- A: 考察不全面
- B: 管理漏洞
- C: 观察时间短
- D: 病例数目少

答案：D

58. 抗癫痫药所致的骨质疏松治疗

- A: 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐
- B: 单独用双膦酸盐

C: 长期口服维生素 D

D: 用甲状旁腺激素

答案: C

59. 主要用于伴有血清 PSA 水平过高、前列腺体积增大的前列腺增生症患者的治疗药物是

A: 米多君

B: 奥昔布宁

C: 非那雄胺

D: 坦索罗辛

答案: C

60. 可用于了解肾小球滤过功能的是

A: 尿素氮

B: 肌酐

C: 胆固醇

D: 淀粉酶

答案: A

61. 糖尿病合并肾病者应首选的药物是

A: 格列喹酮

B: 罗格列酮

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案: A

62. 噻嗪类利尿剂的主要不良反应是

A: 直立性低血压

- B: 支气管痉挛
- C: 足踝部水肿
- D: 血尿酸升高

答案：D

63. 上市后药品临床在评价阶段是

- A: II 期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: IV 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：C

64. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断服用沙丁胺醇 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。因秋冬季交替出现明显喘憋，话不成句，被紧急送医预防治疗。

- A: 沙丁胺醇片
- B: 布地奈德气雾剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

答案：C

65. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

- A: 别嘌醇
- B: 丙磺舒
- C: 秋水仙碱
- D: 阿司匹林

答案：B

66. 可以导致中性粒细胞减少的药物是

- A: 辛伐他汀
- B: 头孢氨苄
- C: 甲巯咪唑
- D: 对乙酰氨基酚

答案: C

67. 每次配方尽可能 1 次完成，是针对药品调配环节防范措施中的

- A: 规范操作、坚持核对
- B: 及时沟通
- C: 环境整齐、安静
- D: 保证足够的人力配备

答案: A

68. 以下咨询问题的分类属于药品名称的是

- A: 这药能治我这种病吗
- B: 这次拿的"×××"(商品名)是我以前一直服用的"格列齐特"吗
- C: 这种药需要服用多久
- D: 中午忘吃药了怎么办

答案: B

69. 验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

- A: II 期临床试验
- B: III 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: 临床预试验

答案: B

70. 可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

- A: 随访了解效果，并建立档案
- B: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- C: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- D: 对问题进行确定并归类

答案：A

71. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A: 左旋氨氯地平
- B: 曲美他嗪
- C: 普伐他汀
- D: 哌唑嗪

答案：A

72. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 阿莫西林-克拉维酸钾+阿奇霉素
- B: 多西环素
- C: 左氧氟沙星+阿奇霉素
- D: 阿奇霉素

答案：A

73. 治疗肠道蛔虫病可选用()

- A: 双八面体蒙脱石散

B: 聚乙醇 4000

C: 阿苯达唑

D: 莫沙必利

答案：C

74. 服用药物对粪外观的影响,利福平

A: 红至黑色

B: 橘红至红色

C: 变红或黑色

D: 黄色

答案：B

75. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

A: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿

B: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用

C: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性

D: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险

答案：A

76. 可提示急性肝炎的是

A: γ -谷氨酰转移酶升高

B: A/G 值低于 1

C: 血清碱性磷酸酶升高

D: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高

答案：D

77. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片
- B: 停用二甲双胍肠溶片
- C: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- D: 停用阿托伐他汀钙片

答案：B

78. 患者，77 岁，因感冒发热咳嗽，自服酚麻美敏片、维 C 银翘片，三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是()

- A: 银翘
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 维生素
- D: 氯苯那敏

答案：D

79. 适用于各种类型的心绞痛

- A: 普萘洛尔
- B: 硝酸酯类
- C: 地高辛
- D: 利多卡因

答案：B

80. 可用于治疗高氨血症的药物是

- A: 乳果糖
- B: 开塞露
- C: 番泻叶

D: 硫酸镁

答案：A

81. 患者，男，72 岁，因“冠心病、高血压、2 型糖尿病”长期用药治疗，服用药物包括阿司匹林肠溶片、马来酸依那普利片、辛伐他汀片、富马酸比索洛尔片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片、硝酸甘油片。近日患者出现一些药物不良反应症状，前来药店咨询药师。

A: 盐酸二甲双胍

B: 马来酸依那普利

C: 阿司匹林

D: 富马酸比索洛尔

答案：B

82. 关于肿瘤疼痛控制的治疗原则，叙述不正确的是

A: 按阶梯给药

B: 提倡无创给药

C: 按时给药

D: 按需给药

答案：D

83. 可单独用于轻度、早期高血压的是

A: 氢氯噻嗪

B: 呋塞米

C: 甘露醇

D: 阿米洛利

答案：A

84. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 洛伐他汀
- C: 氢氯噻嗪
- D: 卡托普利

答案：C

85. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 二巯丙醇“驱汞”治疗
- B: 药用炭吸附中毒物质
- C: 弱碱中和强酸
- D: 毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒

答案：B

86. 关于皮肤病外用剂型的选择，错误的说法

- A: 皮损处于亚急性期时，可酌情选用糊剂、粉剂和洗剂
- B: 有渗液者，先用溶液剂湿敷，后用油剂
- C: 慢性期皮损增厚，呈苔藓样变时，多用软膏剂和乳膏剂
- D: 急性期局部有红肿、水疱、糜烂时，多选用糊剂和乳膏剂

答案：D

87. 治疗胃食管反流病，铝碳酸镁的正确服药时间是

- A: 三餐前 30min

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 餐后、睡前

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/678053054042007022>