

北京住院医师内科 I 阶段：心脏病

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：进行二尖瓣替换手术时，容易损伤哪支冠状动脉（ ）
A. 右冠状动脉
B. 对角支
C. 前降支
D. 回旋支
E. 左冠状动脉主干
- 单项选择题：以下哪种情况不致发生心肌梗死（ ）
A. 冠状动脉内膜下出血使管腔闭塞时
B. 冠状动脉持续痉挛使管腔闭塞时
C. 冠状动脉原有严重病变又发生室性心动过速
D. 冠状动脉病变严重的患者进食大量脂肪食物
E. 已充分建立侧支循环的冠状动脉分支发生闭塞
- 单项选择题：男性，50岁，近2周出现尿少、腹胀，肝肋下4.0cm，压痛(+)，双下肢轻度水肿。下列检查中对确诊右心衰竭最有意义的是（ ）
A. 颈静脉怒张
B. 肝颈静脉回流征(+)
C. UCG检查示肺动脉压升高
D. 经漂浮导管测定肺动脉高压
E. 下肢水肿呈可凹性
- 单项选择题：男性，68岁，2周前曾发生急性心肌梗死，现出现心前区跳动性疼痛，闻及心包摩擦音，肌钙蛋白正常，治疗首选（ ）
A. 异烟肼
B. 阿司匹林
C. 糖皮质激素
D. 地高辛
E. 呋塞米
- 单项选择题：急性肺源性心脏病最常见的原因（ ）
A. 环境中低氧
B. 急性心肌梗死
C. 急性肺动脉栓塞
D. 脂肪栓塞
E. 肺血管炎
- 单项选择题：冠状动脉粥样硬化主要危险因素错误的是（ ）
A. 脑栓塞
B. 血脂异常
C. 年龄

- D. 吸烟
E. 高血压
- 7、单项选择题：有关肺动脉瓣狭窄，下列不正确的是（ ）
A. 肺动脉主干多出现狭窄后扩张
B. 由于肺动脉瓣狭窄，右心室压力始终高于左心室压力
C. 肺动脉瓣狭窄可合并肺动脉瓣二瓣化
D. 可合并肺动脉狭窄或右室漏斗部狭窄
E. 右室漏斗部可出现继发性肌性肥厚狭窄
- 8、单项选择题：男性，74岁，5年来劳力时发生心前区疼痛，放射至咽部，休息1分钟完全缓解，每月发作1~2次。近1周来每天发作3~4次，发生于行走中，每次持续10~15分钟。最可能的诊断是（ ）
A. 急性心肌梗死
B. 稳定劳力型心绞痛
C. 心脏神经官能症
D. 不稳定型心绞痛
E. 自发性心绞痛
- 9、单项选择题：女性，66岁，反复咳嗽、咳痰伴喘息30年。2周前因下肢水肿、尿少和呼吸困难加重给予抗生素和利尿剂等治疗，症状有明显减轻。2天前突然出现意识障碍。血气分析示 pH7.55、PaO₂65mmHg、PaCO₂60mmHg、HCO₃⁻45mmol/L，血 K⁺3.0mmol/L、Na⁺128mmol/L、Cl⁻76mmol/L，WBC12.6×10⁹/L，中性粒细胞85%。患者出现意识障碍最可能的情况是（ ）
A. 肺性脑病
B. 低钠血症
C. 感染中毒性脑病
D. 代谢性碱中毒
E. 抗生素的副作用
- 10、单项选择题：急性心肌梗死溶栓治疗的直接依据是（ ）
A. 多伴有斑块破裂
B. 多伴有闭塞性血栓形成且成分以纤维蛋白为主
C. 多伴有闭塞性血栓形成且成分以血小板为主
D. 多伴有闭塞性血栓形成且凝血酶激活
E. 多为严重的冠状动脉病变
- 11、单项选择题：有关主动脉窦瘤的手术治疗，下列错误的是（ ）
A. 手术需在体外循环下完成
B. 急性破裂者，积极控制心衰，尽早手术
C. 合并主动脉瓣关闭不全者应行主动脉瓣替换术
D. 合并室间隔缺损者应该一并缝合修补
E. 主动脉窦瘤没有破裂也应手术治疗
- 12、单项选择题：女性，78岁，因剧烈心前区疼痛6小时不缓解，急诊心电图提示广泛前壁心肌梗死。查体发现：BP100/60mmHg，呼吸急促，30次/分，口唇发绀，双肺底闻及细小水泡音，心率120次/分，心尖部可闻第4心音，最可能的诊断是（ ）
A. 急性广泛前壁心肌梗死合并肺部感染
B. 急性广泛前壁心肌梗死合并心律失常
C. 急性广泛前壁心肌梗死合并心力衰竭
D. 急性广泛前壁心肌梗死合并心源性休克
E. 急性广泛前壁心肌梗死合并肺栓塞
- 13、单项选择题：肾上腺素能β受体阻滞剂适用于（ ）
A. 劳力性心绞痛
B. 心功能不全
C. 支气管哮喘

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/678057036073006063>