2024安徽省和县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题完整题库【考点梳理】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染的药物是

A：红霉素

B：万古霉素

C：克拉霉素

D：克林霉素

答案：B

2.可引起乳房肿大的药物是()

A：苯海拉明

B：西咪替丁

C：阿司咪唑

D：组胺

答案：B

3.影响骨和牙齿生长的是

A：氯霉素

B：青霉素

C：左氧氟沙星

D：四环素

答案：D

4.氯霉素与剂量和疗程无关的严重不良反应是()

A: 可逆的性骨髓抑制

B: 灰婴综合征

C: 二重感染

D: 严重的再生障碍性贫血

答案：D

5.干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

A: 5-氟尿嘧啶

B: 环磷酰胺

C: 多柔比星

D: 吉非替尼

答案：A

6.中毒后可用维生素B6来对抗的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

B: 异烟肼

C: 利福平

D: 对氨基水杨酸

答案：B

7.常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

A: 男子乳房女性化

B: 锥体外系反应

C: 女性月经不调

D: 室性心律失常

答案：B

8.下列哪种药物长期使用将引起药物性鼻炎()

A：抗组胺药

B：糖皮质激素

C：减鼻充血药

D：肥大细胞膜稳定剂

答案：C

9.（2019年真题）主要通过选择性抑制5-HT再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

A：吗氯贝胺

B：帕罗西汀

C：马普替林

D：度洛西汀

答案：B

10.克林霉素与红霉素合用()

A：后者血药浓度下降，药效降低

B：后者血药浓度升高，不良反应增加

C：不良反应叠加

D：药理作用拮抗

答案：D

11.高钠血症是指

A：血钠>130mmol/L

B：血钠>145mmol/L

C：血钠>135mmol/L

D：血钠>140mmol/L

答案：B

12.常用于痤疮的治疗，因易引起前庭神经毒性，已不作为脑膜炎治疗药的是

A: 米诺环素

B: 多西环素

C: 氯霉素

D: 青霉素

答案：A

13.低剂量用药时对中枢和外周多巴胺D2，受体有拮抗作用，而高剂量用药时有较弱的5-HT?受体阻断作用，可用于化疗所致恶心呕吐的是

A: 帕洛诺司琼

B: 氯丙嗪

C: 甲氧氯普胺

D: 劳拉西泮

答案：C

14.通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

A: 华法林

B: 茶碱

C: 地高辛

D: 丙戊酸钠

答案：A

15.主要经肝代谢，主要代谢产物有促智作用的药物是

A: 阿尼西坦

B: 舍曲林

C: 多奈哌齐

D: 艾地苯醌

答案：A

16.卡马西平用于

A：特发性震颤

B：神经源性尿崩症

C：慢性脑功能不全

D：早期帕金森病

答案：B

17.下列抗结核药物中也可以用于治疗麻风病的是()

A：吡嗪酰胺

B：异烟肼

C：利福平

D：链霉素

答案：C

18.亚胺培南西司他丁一般不宜用于

A：对其他药物耐药的革兰阴性杆菌感染

B：严重需氧菌与厌氧菌混合性感染

C：病原菌未查明严重感染

D：社区获得性感染

答案：D

19.下列抗心律失常药中，属于 β 受体阻断剂的代表药是()。

A：溴苄胺

B：普萘洛尔

C：胺碘酮

D：索他洛尔

答案：B

20.有明显肾毒性的药物是

A：青霉素

B：诺氟沙星

C：庆大霉素

D：四环素

答案：C

21.（2017年真题）患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162mmHg，心率72次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

A：碳酸钙D

B：双氯芬酸

C：辛伐他汀

D：氨基葡萄糖

答案：B

22.长期大剂量服用可产生欣快感，可能出现药物依赖性的具有阿片样作用的止泻药是

A：硫酸镁

B：地芬诺酯

C：洛哌丁胺

D：蒙脱石散

答案：B

23.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A：10～15mg

B：5～10mg

C：2～4mg

D：20～40mg

答案：D

24.（2020年真题）曲妥珠单抗的适应证是

A：转移性结直肠癌

B：晚期恶性黑色素瘤

C：人表皮生长因子受体-2（HER-2）过度表达的乳腺癌

D：表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

答案：C

25.通过阻断血管紧张素Ⅱ受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

A：氨力农

B：地高辛

C：美托洛尔

D：氯沙坦

答案：D

26.以上属于阿片类药物轻度戒断症状的是

A：胃痉挛、心动过速、极度疲乏

B：哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

C：神经过敏、失眠、恶心、呕吐

D: 惊厥、震颤、反射加速、发热

答案：B

27.关于茶碱给药途径叙述不正确的是

A: 进餐时或餐后服药，吸收较慢

B: 肌注有刺激性

C: 灌肠吸收慢

D: 空腹口服吸收快

答案：C

28.壬二酸的作用特点不包括

A: 局部使用能显著减少滤泡内丙酸杆菌的生长

B: 可直接抑制皮肤表面的细菌

C: 对厌氧茵无抑制和杀灭作用

D: 可竞争性抑制产生二氢睾酮的酶过程

答案：C

29.奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是()

A: 抑制Ca

B: 促进K

C: 抑制Na

D: 促进Ca

答案：C

30.主要用于糖尿病，特别是1型糖尿病的治疗的药物是()

A: 磺酰脲类

B: A和B均无效

C: 二甲双胍

D: 胰岛素

答案：D

31.（2019年真题）患者，女75岁，既往有2型糖尿病史18年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗10余天，临床应关注的典型不良反应是（）

A: 红人综合征

B: 肌肉震颤

C: 抗生素相关性腹泻

D: 急性溶血性贫血

答案：C

32.口服呋喃妥因可用于治疗()

A: 呼吸道感染

B: 尿路感染

C: 肠道感染

D: 肺感染

答案：B

33.格列本脲的作用特点是

A: 增强胰岛素的作用

B: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平

C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

D: 抑制胰高血糖素的分泌

答案：B

34.患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸人、氨茶碱静脉滴注治疗。

A：腹部B超

B：血常规

C：胸部CT

D：茶碱血药浓度

答案：D

35.关于维A酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

A：有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

B：不宜用于皮肤皱褶部位

C：为了加强疗效，可以一日多次给药

D：使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用

答案：C

36.治疗阴道滴虫病的首选药物是()

A：甲硝唑

B：呋喃妥因

C：克林霉素

D：多黏菌素

答案：A

37.作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

A：莫沙必利

B：多潘立酮

C：甲氧氯普胺

D：西沙必利

答案：B

38.属于水杨酸类解热镇痛药的是

A：阿司匹林

B：布洛芬

C：对氨基水杨酸钠

D：阿糖腺苷

答案：A

39.下列关于抗酸剂的描述，正确的是()

A：常用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状及预防溃疡发生

B：抗酸剂可直接中和胃酸，升高胃内容物pH

C：氢氧化铝能直接中和胃酸，并被胃肠道吸收

D：碳酸氢钠是非吸收性抗酸剂

答案：B

40.关于黄体酮的叙述，下列说法正确的是

A：具有雄激素作用

B：是天然孕激素

C：是短效类口服避孕药的组成成分

D：是长效类口服避孕药的组成成分

答案：B

41.氨力农常见的不良反应是

A：色觉异常

B：血小板计数减少

C：视物模糊

D：严重低血压

答案：B

42.主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

A：阿莫罗芬

B：特比萘芬

C：制霉菌素

D：联苯苄唑

答案：B

43.（2021年真题）乙内酰脲类药通过减少钠离子内流而使神经细胞稳定，限制Na+通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是（）

A：左乙拉西坦

B：苯妥英钠

C：加巴喷丁

D：卡马西平

答案：B

44.以上属于成瘾产妇的新生儿戒断症状的是

A：哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

B：神经过敏、失眠、恶心、呕吐

C：惊厥、震颤、反射加速、发热

D：胃痉挛、心动过速、极度疲乏

答案：C

45.可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

A：西妥昔单抗

B：英夫利昔单抗

C：利妥昔单抗

D: 贝伐单抗

答案：C

46.华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()。

A: 维生素B

B: 维生素B

C: 依诺肝素

D: 维生素B

答案：C

47.对铜绿假单胞菌作用较强的头孢菌素是()

A: 头孢拉定

B: 头孢噻吩

C: 头孢唑林

D: 头孢哌酮

答案：D

48.属于II类抗心律失常药()

A: 奎尼丁

B: 利多卡因

C: 胺碘酮

D: 普萘洛尔

答案：D

49.治疗肺孢子菌病的首选药物是()

A: 呋喃妥因

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 氯霉素

D: 左氧氟沙星

答案：B

50.可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

A: 阿托普利

B: 阿利克仑（阿利吉仑）

C: 硝普钠

D: 氨氯地平

答案：C

51.周某，男，31岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 叶酸

B: 四氢叶酸

C: 硫酸亚铁

D: 维生素B12

答案：C

52.（2016年真题）具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

A: 过氧苯甲酰

B: 异维A酸

C: 维A酸

D: 阿达帕林

答案：A

53.（2019年真题）患者女，58岁，血糖升高10年，口服二甲双胍治疗，高血压病史5年，未规律治疗，近期查体：血压158/95mmHg，尿常规示蛋白尿（+++），适宜该患者使用的降压药物是（）

A: 硝苯地平

B: 甲基多巴

C: 普萘洛尔

D: 依那普利

答案：D

54.血浆半衰期较长的治疗阴茎勃起功能障碍的5型磷酸二酯酶抑制剂的是

A: 西地那非

B: 甲睾酮

C: 丙酸睾酮

D: 他达拉非

答案：D

55.苯妥英钠的血药浓度超过多少可出现眼球震颤症状

A: 15μg/ml

B: 10μg/ml

C: 20μg/ml

D: 25μg/ml

答案：C

56.易发生持续性干咳不良反应的药品是()。

A: 硝苯地平

B: 福辛普利

C: 硝酸甘油

D: 氢氯噻嗪

答案：B

57.为了保护亚胺培南，防止其在肾中破坏，应与其配伍的药物是()

A: 克拉维酸

B: 西司他丁

C: 他唑巴坦

D: 舒巴坦

答案：B

58.（2019年真题）患者，女，36岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午10点及下午4点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（）

A: 甲氧氯普胺

B: 颠茄

C: 多潘立酮

D: 奥美拉唑

答案：D

59.次水杨酸铋是

A: 抗分泌药

B: 吸附剂

C: 微生态制剂

D: 抗动力药

答案：A

60.对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用氨溴索的同时，不宜联合应用的药品是

A：右美沙芬

B：感冒颗粒

C：利巴韦林

D：对乙酰氨基酚

答案：A

61.大剂量糖皮质激素冲击疗法用于

A：顽固性支气管哮喘

B：湿疹

C：变态反应性疾病

D：中毒性感染和休克

答案：D

62.（2016年真题）可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A：重组人促红素

B：人血白蛋白

C：硫酸亚铁

D：维生素B12

答案：A

63.（2017年真题）主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是（）

A：利血平

B：依折麦布

C：瑞舒伐他汀

D：阿昔莫司

答案：C

64.可使维生素B

A：异烟肼

B：糖皮质激素

C：丙磺舒

D：雌激素

答案：D

65.下列属于钾离子竞争性酸抑制剂的药物是

A：米索前列醇

B：法莫替丁

C：沃诺拉赞

D：奥美拉唑

答案：C

66.不属于血管紧张素转换酶抑制剂(ACEⅠ)类药物作用特点是()

A：ACEI可引起反射性心率加快

B：ACEI禁用于双侧肾动脉狭窄者

C：ACEI可防治高血压患者心肌细胞肥大

D：ACEI对肾脏有保护作用

答案：A

67.属于Ⅰc类抗心律失常药的是

A：普罗帕酮

B：胺碘酮

C：奎尼丁

D：利多卡因

答案：A

68.对铜绿假单胞菌作用强()

A：羧苄西林

B：青霉素V

C：氟氯西林

D：青霉素G

答案：A

69.患者男,8岁,静脉滴注美洛西林后立即出现胸气短、呼吸困难喉头水肿,考虑为青霉素类抗生素的过敏反应按照其发生机制,该患者发生的过敏反应在分型上属于（）

A：Ⅱ型变态反应

B：Ⅲ型变态反应

C：Ⅳ型变态反应

D：Ⅰ型变态反应

答案：D

70.起效缓慢,可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是（）

A：艾塞那肽

B：利拉鲁肽

C：瑞格列奈

D：罗格列酮

答案：D

71.关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误是

A：联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染

B：治疗急性感染通常疗程不宜超过7～14日

C：两类药不能混入同一容器内

D: 可在身体同一部位给药

答案：D

72.头孢曲松()

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

C: 用于非典型致病原感染

D: 肾毒性较大

答案：A

73.患者，男，45岁，因“咳嗽、咳痰1周，发热2天”入院，诊断为社区获得性肺炎，两次痰培养为金黄色葡萄球菌(MSRA)，适合选用的是

A: 万古霉素

B: 双氯西林

C: 苄星青霉素

D: 阿莫西林

答案：A

74.肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵

A: 可降低血氨浓度，诱发肝性脑病

B: 可增加血氨浓度，诱发肝性脑病

C: 可降低门脉压力，诱发出血

D: 可升高门脉压力，诱发出血

答案：B

75.可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

A: 灰黄霉素

B：环丙沙星

C：克霉唑

D：咪康唑

答案：B

76.主要用于口服给药的广谱青霉素类是

A：头孢噻肟

B：头孢哌酮

C：阿莫西林

D：庆大霉素

答案：C

77.下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

A：噻吗洛尔

B：左氧氟沙星

C：毛果芸香碱

D：丙美卡因

答案：C

78.静脉注射可出现舌头麻木()

A：链霉素

B：多西环素

C：四环素

D：氯霉素

答案：B

79.头孢拉定

A：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B：肾毒性较大

C：口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

D：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：B

80.关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

A：能降低血清前列腺特异性抗原（PS）水平

B：可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

C：小剂量可促进头发生长，用于治疗素源性胞发

D：易引起直立性低血压

答案：D

81.氯霉素类

A：禁用于胆道阻塞患者

B：禁用于8岁以下儿童

C：禁用于18岁以下儿童及青少年

D：禁用于早产儿、新生儿

答案：D

82.阻断M

A：氢氧化铝

B：雷尼替丁

C：奥美拉唑

D：哌仑西平

答案：D

83.一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A：粪肠球菌

B：嗜酸乳杆菌

C：梭状芽孢杆菌

D：双歧杆菌

答案：C

84.（2016年真题）会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性（感觉障碍、痉挛）的行为是

A：日光浴

B：接触塑料制品

C：饮用热饮

D：冷水浴

答案：D

85.骨髓抑制最严重的是()

A：亚叶酸钙

B：卡铂

C：奥沙利铂

D：顺铂

答案：B

86.散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

A：复方托吡卡胺滴眼液

B：碘苷滴眼液

C：毛果芸香碱滴眼液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/678062104047007022