

2024 年广西壮族自治区博白县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库大全及参考答案（综合题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2017 年真题）患者，77 岁，因感冒发热咳嗽，自服酚麻美敏片、维 C 银翘片，三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是（）

- A: 银翘
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 维生素
- D: 氯苯那敏

答案：D

2. 患者，女，72 岁，主诉“眼干、眼红、刺激感、砂砾感”，医师初步诊断为干眼症，建议患者选用

- A: 吡诺克辛滴眼液
- B: 聚乙烯醇滴眼液
- C: 左氧氟沙星滴眼液
- D: 山莨菪碱滴眼液

答案：B

3. 下列不良事件中，属于假劣药事件是（）

- A: 亮菌甲素事件
- B: 康泰克 PPA 事件
- C: 万洛（罗非昔布）事件

D: 拜斯亭(西立伐他汀)事件

答案: A

4. 归属于用药记录的是

A: 对药物治疗的建设性意见

B: 同时合并应用的药品

C: 主要实验室检查数据

D: 主治医师签名

答案: B

5. 以下药物中，肝病患者应该慎用的是

A: 泛酸钙

B: 甘草酸二铵

C: 谷氨酸

D: 氯丙嗪

答案: D

6. 口服吐根糖浆催吐用于解救

A: 丙咪嗪中毒

B: 磷化锌中毒

C: 三唑仑中毒

D: 巴比妥中毒

答案: A

7. 以下肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断心肌梗死

B: 诊断急、慢性白血病

C: 诊断痛风

D: 诊断恶性贫血

答案：A

8. (2016 年真题) 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是 ()。

A: 吡嗪酰胺

B: 乙胺丁醇

C: 利福平

D: 异烟肼

答案：C

9. 10 岁以上的儿童 2 型糖尿病患者适宜选择的降糖药是

A: 格列美脲

B: 二甲双胍

C: 瑞格列奈

D: 胰岛素

答案：B

10. 患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊，住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 氯吡格雷

C: 阿司匹林

D: 华法林钠

答案：B

11. 5%葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是 ()

- A: 10
- B: 30
- C: 25
- D: 33.3

答案：C

12. 尽量不用带数字的术语来表示

- A: 及时回答不拖延
- B: 解释的技巧
- C: 保护患者的隐私
- D: 特别关注特殊人群

答案：B

13. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 注意关节保暖
- B: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用
- C: 遵医嘱，不得自行增加剂量
- D: 应适当减轻体重

答案：B

14. 治疗真菌性阴道炎可选用

- A: 克霉唑栓
- B: 复方角菜酸酯栓
- C: 复方苯甲酸酊
- D: 阿达帕林凝胶

答案：A

15. 大剂量或连续使用顺铂导致

- A: 肾间质纤维化
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 肾小管坏死
- D: 阻塞肾小管、肾小球

答案：C

16. （2016 年真题）患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是（ ）。

- A: 司来吉兰
- B: 多奈哌齐
- C: 左旋多巴
- D: 普拉克索

答案：C

17. 描述是否充分、详细、准确是评价

- A: 摘要
- B: 前言
- C: 讨论
- D: 结果

答案：D

18. 痛风急性发作期不宜服用，以防发生转移性痛风发作的是

- A: 苯溴马隆
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱

D: 泼尼松

答案：A

19. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 多索茶碱

B: 西地兰

C: 硝普钠

D: 硝苯地平

答案：B

20. 布洛芬作为非处方药主要用于治疗

A: 发热

B: 抑郁

C: 感冒

D: 鼻炎

答案：A

21. 服用药物对粪外观的影响,水杨酸钠

A: 橘红至红色

B: 红至黑色

C: 变红或黑色

D: 黄色

答案：B

22. 一般高血压患者服用降压药，建议控制在

A: <130 / 80mmHg

B: <140 / 80mmHg

C: <120 / 80mmHg

D: <140 / 90mmHg

答案：D

23. 严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

A: 避免使用

B: 必须减量应用

C: 须谨慎使用，必要时减量给药

D: 一般无需调整剂量

答案：B

24. 上市后药品再评价阶段属于

A: III期临床试验

B: I 期临床试验

C: IV期临床试验

D: II 期临床试验

答案：C

25. 可用口服吐根糖浆 15ml，饮水 500ml 催吐解救的中毒是

A: 三唑仑中毒

B: 丙戊酸钠中毒

C: 磷化锌中毒

D: 丙米嗪中毒

答案：D

26. 在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

- A: 中国国家处方集
- B: 药物不良反应
- C: 国家基本药物处方集
- D: 新编药理学

答案：A

27. (用药与尿液检查异常)阿司匹林可能引起

- A: 尿酮体
- B: 尿沉渣结晶
- C: 尿血红蛋白
- D: 尿肌酐

答案：C

28. 治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘,宜选择的药物是()

- A: 比沙可啶
- B: 东莨菪碱
- C: 乳果糖
- D: 硫酸镁

答案：C

29. 抗高血压药物的禁忌证双侧肾动脉狭窄（）

- A: 氢氯噻嗪
- B: 美托洛尔
- C: 维拉帕米

D: 依那普利

答案：D

30. 患者男 62 岁无吸烟饮酒史患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示 AST145U/L, ALT134/L, 排除了其他疾病因素后停用阿托伐他汀肝功能逐步恢复正常。二个月后，改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应该与他汀类药物之间的因果关系应评价为()

A: 可能无关

B: 肯定

C: 可能

D: 很可能

答案：B

31. 下列不属于艾滋病的基本特征的是

A: T 淋巴细胞功能下降

B: 自然杀伤细胞（NK 细胞）活性下降

C: B 淋巴细胞功能失调

D: 体重减轻或非正常的生长减慢

答案：D

32. 评价二级信息的标准是

A: 索引的完备程度，收载杂志的数量

B: 作者是否为该领域的专家

C: 研究方法是否科学合理

D: 研究目的是否明确

答案：A

33. 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，肌肉痉挛，四肢感觉异常，导致这种症状的药物是

- A: 异烟肼
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

34. 药学服务的对象是

- A: 患者家属
- B: 患者
- C: 广大公众
- D: 医务人员

答案：C

35. （2019 年真题）患者，女，29 岁，孕 25+6 周近日出现乏力、困倦食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

- A: 口服每次 5ml，一日 3 次
- B: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量
- C: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后，再继续静脉滴注余下剂量
- D: 快速静脉注射

答案：C

36. 最常用的解热镇痛药为

- A: 谷维素
- B: 塞来昔布

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案：C

37. 与两性霉素 B 合用在体外有拮抗作用

A: 强心苷

B: 酮康唑

C: 链霉素

D: 碳酸氢钠

答案：B

38. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

A: 120~160g / L

B: 30~60g / L

C: 60~90g / L

D: 90~120g / L

答案：D

39. (2016 年真题) 与左旋多巴合用，可提高疗效的是 ()。

A: 奥美拉唑

B: 克拉维酸钾

C: 苄丝肼

D: 叶酸

答案：C

40. 治疗严重先兆子痫的首选药物为

A: 硫酸镁

B: 依那普利

C: 美托洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案: C

41. 发热血常规检查白细胞计数低于正常值，可能有

A: 麻疹

B: 病毒感染

C: 感冒

D: 细菌感染

答案: B

42. 消化性溃疡发病机制中的防御因子为

A: Hp 感染

B: 酒精

C: 前列腺素 E

D: 吸烟

答案: C

43. 简化治疗方案是提高患者依从性的有效方法，以下方案中最符合此原则的是

A: 使用半衰期较长的药物或缓、控释制剂，每日 1 次给药

B: 少用药的方案

C: 短疗程的方案

D: 注射给药方案

答案: A

44. 患者，男，61 岁，查体空腹血糖升高来诊，中等体型，无烟酒等不良嗜好。该患者既往慢性肾炎病史，伴轻中度肾功能不全。

- A: 二甲双胍
- B: 格列喹酮
- C: 格列美脲
- D: 胰岛素

答案：D

45. 属于 B 级高危药品的是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 血液透析液
- D: 全胃肠外营养液

答案：D

46. 对于尿比重叙述正确的是

- A: 尿比重数值的大小取决于尿量的多少
- B: 尿比重是指在 4℃时尿液与同体积纯水的重量之比
- C: 急性肾小球肾炎可引起尿比重降低
- D: 新生儿的正常尿比重一般高于成人的正常尿比重

答案：B

47. 白细胞分类中，淋巴细胞参考范围为

- A: 20%~40%
- B: 1%~5%
- C: 50%~70%
- D: 3%~8%

答案：A

48. 下列药物中，解救复方樟脑酊中毒的特效药是

- A: 硫酸铜
- B: 纳洛酮
- C: 氟马西尼
- D: 碳酸氢钠

答案：B

49. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，P108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 西地兰
- B: 多索茶碱
- C: 硝苯地平
- D: 硝普钠

答案：A

50. 第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

- A: 一次 4mg，每日 3 次
- B: 一次 2mg，每日 3 次
- C: 一次 10mg，每日 1 次
- D: 一次 4mg，每日 1 次

答案：C

51. (肾功能不全者的药物排泄机制)弱酸性药物离子化减少

- A: 肾小管分泌减少
- B: 肾血流量减少
- C: 肾小管重吸收增加
- D: 肾小球滤过减少

答案：C

52. 第一类精神药品处方印刷用纸是

- A: 淡黄色
- B: 淡绿色
- C: 淡红色
- D: 淡橙色

答案：C

53. 主要经肾脏排泄的药物或活性代谢产物易在体内蓄积，是由于

- A: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- B: 肾功能随年龄增长而减退
- C: 胆汁分泌缺乏
- D: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长

答案：B

54. 妥布霉素可导致药源性肾病的机制是

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 肾小球滤过率下降
- C: 结晶沉积
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案：B

55. 适用于伴有前列腺体积增大的良性前列腺增生症的是（）

- A: 特拉唑嗪
- B: 米多君
- C: 奥昔布宁
- D: 非那雄胺

答案：D

56. 高血压合并消化性溃疡者不宜用

- A: 利血平
- B: 硝苯地平
- C: 比索洛尔
- D: 吲达帕胺

答案：A

57. 慢性沙眼患者禁用的药品是

- A: 硫酸锌滴眼剂
- B: 醋酸可的松滴眼剂
- C: 利福平滴眼剂
- D: 酞丁安滴眼剂

答案：B

58. 通常开封启用 4 周后，不宜再继续使用的剂型是（）

- A: 含漱剂
- B: 直肠栓剂
- C: 软膏剂
- D: 滴眼剂

答案：D

59. 蒽环类抗生素容易引起心脏毒性，可以采用的预防药物是

- A: 维生素. 辅酶 Q
- B: 糖皮质激素
- C: 肾上腺素
- D: 抗组胺药

答案：A

60. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用量为

A: 0.5gtid

B: 0.5gqd

C: 0.2gqd

D: 0.1gtid

答案：C

61. 患者通过电话、网络或信件询问是

A: 被动方式

B: 质问方式

C: 指令方式

D: 主动方式

答案：A

62. 淡红色处方作为

A: 麻醉药品和第一类精神药品处方

B: 儿科处方

C: 普通处方

D: 急诊处方

答案：A

63. 不需要睡前服用的他汀类药物为

A: 阿托伐他汀

B: 辛伐他汀

C: 洛伐他汀

D: 普伐他汀

答案: A

64. (2018 年真题) 服用华法林期间应进行监测的指标是 ()

A: RBC

B: APTT

C: INR

D: ALT

答案: C

65. 以下哪项不是药物流产的适应证 ()

A: B 超确诊为宫内妊娠

B: 妊娠 $\leq$ 49 日

C: 多次人工流产术史

D: 本人自愿、年龄 $>$ 40 岁的健康女性

答案: D

66. 关于口服避孕药的使用，下列说法不正确的是 ()

A: 口服避孕药中的雌激素可使 HDL-C 降低

B: 口服避孕药引起的不规则阴道出血，如流血偏多者，每晚在服用避孕药同时加服雌激素直至停药

C: 口服避孕药引起的类早孕反应，一般不需特殊处理，坚持服药数个周期后可自然消失

D: 应用复方短效口服避孕药者，停药后即可妊娠

答案: A

67. (2018 年真题) 老年女性，心功能衰竭，服用呋塞米及螺内酯片，正确的使用方法是 ()

- A: 舌下含服
- B: 应同时碱化尿液
- C: 清晨服用
- D: 用温水调服

答案：C

68. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的合格人员，是衡量互联网信息的

- A: 归因性
- B: 权威性
- C: 新颖性
- D: 合理性

答案：B

69. 应用高剂量时可导致脑病的抗菌药物是

- A: 青霉素
- B: 头孢唑林
- C: 美罗培南
- D: 头孢哌酮

答案：B

70. 可使阿莫西林免受 β -内酰胺酶破坏的药品是()。

- A: 西司他丁
- B: 三唑巴坦
- C: 右旋糖酐
- D: 克拉维酸钾

答案：D

71. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

- A: $1/5 \sim 1/2$
- B: $1/7 \sim 1/5$
- C: $3/5 \sim 3/4$
- D: $1/10 \sim 1/5$

答案：A

72. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂(他汀类)所导致的药源性损害是

- A: 胃肠道
- B: 肝脏
- C: 肺
- D: 肾脏

答案：B

73. 多晒太阳、防跌倒，最适合于

- A: 高血压
- B: 焦虑障碍
- C: 骨质疏松
- D: 糖尿病

答案：C

74. 患者,男,52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作,长期自行服用泼尼松片 20mgq

- A: 骨质疏松
- B: 低血压
- C: 消化性溃疡
- D: 该患者可能出现的不良反应中,不包括的是 ()

答案：D

75. 青蒿素与乙胺嘧啶联用增效的机制是

- A: 促进机体的利用
- B: 作用于不同的靶点
- C: 延缓或降低抗药性
- D: 竞争性拮抗作用

答案：C

76. 长期慢性便秘者不宜长期大量使用的是

- A: 乳果糖
- B: 硫酸镁
- C: 番泻叶
- D: 开塞露

答案：C

77. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 洛伐他汀
- D: 卡托普利

答案：B

78. 新生儿服用氯霉素，因其在体内蓄积导致灰婴综合征，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 基础疾病因素
- B: 年龄因素

C: 遗传因素

D: 性别因素

答案: B

79. 患者，男，60 岁，从晨起后收缩压和舒张压迅速升高，在上午 9～10 时达到高峰，而晚上开始降低，于睡眠时降至低谷。那么该患者应用降压药时，关于用药时间的说法，正确的是

A: 一般每日仅服一次长效抗高血压药如氨氯地平且以清晨 7 时左右为最佳服用时间

B: 一般每日需要服用长效抗高血压药如氨氯地平 2 次，早、晚各一次最好

C: 一般每日晚上睡前服抗高血压药，服用培哚普利、氨氯地平、左旋氨氯地平等

D: 一般每日仅服一次长效抗高血压药如氨氯地平且以晚上 7 时左右为最佳服用时间

答案: A

80. 稳定型心绞痛缓解期的治疗选用

A: 低分子肝素

B: 硝酸甘油

C: 氯贝丁酯

D: 阿司匹林

答案: D

81. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径，半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择()

A: 2～3 个半衰期给药 1 次

B: 静脉滴注给药

C: 每个半衰期给药 1 次

D: 每日给药 1 次

答案: B

82. 超常处方

A: 无适应证用药

B: 无正当理由不首选国家基本药物

C: 黄连素用于细菌性腹泻

D: 二甲双胍用于糖尿病患者

答案: A

83. 以下药品中，最容易受湿度影响而变质的是

A: 水溶性基质栓

B: 滴眼剂

C: 胰岛素制剂

D: 肝素等生物制品

答案: A

84. 评价房颤患者抗凝出血风险的方法是

A: FEV1 占预计值%

B: HAS-BLED 评分

C: CTP 分级

D: CHA₂DS₂-VASc 评分

答案: B

85. 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,不需要使用额外的避孕措施

B: 不再继续服用此周期药物,经过一个 7 天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

C: 在常规时间 20:00 服用 4 月 25 日的药片,不用补服 4 月 24 日的药片

D: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

答案: A

86. 以下药物中,妊娠妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

A: 沙立度胺

B: 甲氨蝶呤

C: 辛伐他汀

D: 苯妥英钠

答案: A

87. 在检查尿沉渣的项目中,最能提示是肾实质性病变的证据是

A: 尿沉渣白细胞

B: 尿沉渣结晶

C: 尿沉渣磷酸盐结晶

D: 尿沉渣管型

答案: D

88. 患者,女,58 岁,既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

目前体检:身高 160cm,体重 70kg。实验室检查:白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$,红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$,总胆红素 $11 \mu mol / L$,总胆固醇 $6.0 mmol / L$,空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/678102103045007022>