



院外延伸护理服务— PICC导管维护

精选ppt

院外护理服务-PICC维护流程:

- ❖ 接到护理部通知，确认信息，携用物前往患者家中。
- ❖ 至患者家中，向患者或家属确认信息无误后，评估患者基本情况，适合操作者，向其解释操作目的、注意事项及操作中可能出现的并发症，经患者或家属同意后，在院外延伸护理服务PICC导管维护同意书上签字。
- ❖ 操作完毕向患者或家属确认PICC导管维护完毕，拍照留存，并在院外延伸护理服务确认单上签字。（医护及患者或家属）
- ❖ 返回医院后将同意书及确认单交由护理部统一留存保管，并完成外出护理服务登记。

- ❖ 如评估不适合家中PICC导管维护时，向患者及家属做好解释工作，建议其前往医院进行PICC导管维护。并及时与护理部进行沟通，协调退款事宜。
- ❖ 如操作中出现特殊情况，冷静面对，配合医生进行处理，必要时及时将患者送回医院救治。

PICC导管维护上门前评估

- ◆ 询问、了解患者意识状态及合作程度。
- ◆ 评估患者PICC导管的厂家和类型（三向瓣膜式、前端开口式、耐高压注射型、单腔或多腔）。
- ◆ 评估患者的手臂情况及皮肤情况。
- ◆ 询问患者穿刺点有无发红、肿胀、渗血及渗液；导管有无移动；贴膜有无潮湿、脱落、污染，是否到期、最近一次维护时间；询问过敏史；是否需要PICC导管附件（思乐扣）

❖ PICC导管有以下情况建议来医院维护：

- 1) 患者堵管（在冲管时无法推注冲管液）
- 2) 导管脱出5cm以上
- 3) 导管破裂、砂眼
- 4) 拔管

PICC导管上门维护前:

- ❖ (1) 用物准备
- ❖ **外出箱:** 工作服、一次性口罩、一次性帽子、PICC导管维护同意书、PICC导管维护确认书
- ❖ 另备医疗废物垃圾袋

实施流程：

准备

- ①护士准备 向患者或家属解释
- ②患者准备 体位、手臂下垫治疗巾
 - (1) 评估，测量臂围，询问酒精和胶布过敏史
 - (2) 洗手，戴口罩，准备用物
 - (3) 去除贴膜
 - (4) 洗手或者使用手消，准备胶布
 - (5) 以穿刺点为中心消毒皮肤，消毒导管外露部分
 - (6) 更换接头、冲管
 - (7) 贴膜、固定
 - (8) 功能锻炼指导，健康教育宣教
 - (9) 记录

患者健康教育单

- ❖ 尊敬的_____（女生/先生）：
- ❖ 为了帮助您早日恢复健康，请您仔细阅读以下内容，并积极配合。
- ❖ 1.保持局部清洁干燥，勿擅自撕下贴膜。
- ❖ 2.置管后若出现以下情况请及时与护士联系：
 - ❖ ①贴膜出现卷曲、松动、潮湿；
 - ❖ ②穿刺点及周围红、肿、疼痛、渗出；
 - ❖ ③PICC外露刻度有变化；
 - ❖ ④穿刺点周围皮肤红疹、水疱、瘙痒；、穿刺上肢疼痛、肿胀等。
- ❖ 3.输液时置管侧肢体自由摆放，适当抬高。睡眠时，保持舒适体位，尽量避免压迫置管侧肢体。
- ❖ 4.淋浴前使用保鲜膜将贴膜上下10cm严密包裹，切忌浸湿贴膜。
- ❖ 5.治疗间期或出院后每7天到医院更换贴膜和外露接头并冲管，保持PICC功能状态。
- ❖ 护士签名： 年 月 日

PICC置管后并发症及处理

一、穿刺点渗血（早期）

❖ 临床表现:

1. 穿刺点渗血
2. 穿刺点疼痛。
3. 穿刺点有硬结



穿刺点渗血处理方法

用物准备：

常规维护用物（治疗盘、20ml生理盐水注射器或10ml预冲式冲洗器、7或9号头皮针头、肝素帽或正压接头、纱块、输液贴、胶布、皮尺、剪刀、弯盘、免洗手消毒液、2把中弯钳、松节油、棉签、PICC护理包）、思乐扣和肝素盐水（根据评估导管情况定）、无菌纱布、藻酸盐敷料。

穿刺点渗血处理方法

1. 严格无菌操作，常规维护后，穿刺点局部用无菌纱布按压或藻酸盐敷料覆盖，再用弹力绷带包扎，可有效避免穿刺点渗血。
2. 根据出血的多少，决定换药的频次。
3. 嘱置管侧上肢避免过频活动、用力。



穿刺点渗血的健康教育

- ❖ 避免在置管侧肢体测血压，翻身时避免留置导管的肢体受压。
- ❖ 适当限制置管侧肢体活动，穿衣服时应先穿置管侧肢体，脱衣服时应先脱未置管侧肢体
- ❖ 如果穿刺点出血较多时，可立即用手按压穿刺点，局部压迫止血后到医院就诊。

二、机械性静脉炎

❖ 临床表现:

1.沿静脉走行的红、肿、痛，有“红线”样改变，触之

有条索状改变

2.多发生在插管后 2-10 天

3.有时可以表现成局限症状:

局部的硬结



机械性静脉炎的处理方法

❖ 用物准备:

常规维护用物、喜疗妥（患者准备）、如意金黄散、蜂蜜、纱布（8*8）、治疗巾1块

机械性静脉炎的处理方法

1. 在肿胀部位给予喜疗妥涂擦，涂擦范围：

穿刺点贴膜上方沿静脉走向，用手指指腹涂擦，

用热水袋局部热敷，温度以肌肤正常能耐受为宜，
3次/d，连续3d，不可用力揉搓，置管侧上臂；

2. 红肿严重者可用如意金黄散加蜂蜜调匀后外敷，
外敷范围同喜疗妥外敷范围，1~2次/d，连
续3d；

机械性静脉炎的健康教育

- ❖ 嘱患者每次涂药前，先用温水毛巾清洁涂擦区域皮肤。
- ❖ 涂如意如意金黄散后，用纱布包裹，以免弄脏衣物。
- ❖ 指导患者抬高患肢，以利于静脉回流，减轻局部水肿，避免肘关节活动，适当增加手指的精细、灵巧性活动

三、穿刺点感染

❖ 临床表现:

穿刺点周围皮肤出现红肿、硬结、异味，按压后可出现脓性分泌物。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/685114200141011310>