

主管护师-护理学（中级）专业知识综合模考卷 2

单选题（共 100 题，共 100 分）

(1.) 属于休克早期表现的是

- A. 血压下降，脉压增大
- B. 血压基本正常而脉压减小
- C. 血压下降脉（江南博哥）压正常
- D. 精神淡漠，反应迟钝
- E. 四肢厥冷、脉搏细速

正确答案： B

参考解析：A、C、D、E 是休克晚期表现。

(2.) 休克病人出现 DIC 时应使用

- A. 鱼精蛋白
- B. 肝素
- C. 维生素 C
- D. 6-氨基己酸
- E. 氨甲苯酸

正确答案： B

参考解析：DIC 早期用肝素。

(3.) 血栓闭塞性脉管炎局部缺血期典型的临床表现是

- A. 干性坏疽
- B. 趾甲生长缓慢、增厚变形
- C. 间歇性跛行
- D. 静止痛
- E. 足背动脉搏动消失

正确答案： C

参考解析：早期血管还未完全闭塞，只是运动后血管痉挛，引起病人疼痛，表现为间歇性行。

(4.) 一般情况下肺炎球菌肺炎在炎症消散后常见有

- A. 肺部实变
- B. 肺部留有空洞
- C. 造成胸膜粘连、增厚
- D. 肺组织完全恢复正常
- E. 以上都不是

正确答案： D

参考解析：一般情况下肺炎球菌肺炎炎症消散后，肺组织完全恢复正常。

(5.) 急性肺脓肿停用抗生素的指征是

- A. 咳嗽咳痰消失
- B. 体温正常

- C. 体征恢复正常
- D. X 线胸片示脓肿液平消失
- E. X 线胸片示炎症吸收，留有纤维条影

正确答案： E

参考解析： 抗生素治疗宜持续 8~12 周，直至 X 线胸片上空洞和炎症完全消失，或仅有少量稳定的残留纤维化。

(6.) 病态窦房结综合征病人最佳的治疗方法是

- A. 静脉注射阿托品
- B. 口服麻黄碱
- C. 静脉滴注烟酰胺
- D. 静脉滴注异丙肾上腺素
- E. 安装永久性心脏起搏器

正确答案： E

参考解析： 病态窦房结综合征的治疗原则：无症状者应做密切临床观察，有症状者应选择心脏起搏器治疗。

(7.) 关于慢性胃窦胃炎的临床表现，下列应除外的是

- A. 不引起恶性贫血
- B. 呕吐
- C. 常与溃疡病同在
- D. 血清壁细胞抗体多为阳性
- E. 持续性腹痛

正确答案： D

参考解析： 慢性胃窦胃炎病人血清学检查血清促胃液素水平可降低或正常，可存在抗壁细胞抗体，但滴度低。

(8.) 下列属于肝性脑病前驱期的表现是

- A. 腱反射亢进
- B. 定向力减退
- C. 手足抽搐
- D. 脑电图异常
- E. 喜怒无常

正确答案： E

参考解析： 一期（前驱期）轻度性格改变和行为失常。病人应答尚准确，但有时吐字不清且较缓慢。可有扑翼样震颤，脑电图多数正常。

(9.) 空腔脏器破裂后的临床表现主要是

- A. 腹腔内出血
- B. 腹膜炎
- C. 血细胞比容下降
- D. 血尿淀粉酶升高

E. 腹腔穿刺为不凝固的鲜红色血液

正确答案： B

参考解析：空腔脏器破裂的主要表现是腹膜炎，而实质脏器破裂的主要表现是出血。

(10.)骨科牵引的主要目的是

- A. 防止感染
- B. 减轻疼痛
- C. 减轻肌肉痉挛
- D. 整复和维持复位
- E. 促进损伤神经恢复

正确答案： D

参考解析：其他不属于牵引的目的。

(11.)胃造口术的适应证除外

- A. 食管癌致食管梗阻者
- B. 脑卒中伴吞咽苦难者
- C. 食管瘢痕狭窄
- D. 十二指肠外伤者
- E. 食管气管瘘者

正确答案： D

参考解析：十二指肠外伤病人可能存在十二指肠瘘，通过胃造口注入食物可能漏入到腹腔。

(12.)正常 10 个月小儿生长发育异常的是

- A. 能推车走几步
- B. 能辨认熟悉的人
- C. 可站立
- D. 乳牙 4 颗
- E. 头围 48cm

正确答案： E

参考解析：头围 48cm 应是 2 岁小儿的头围正常值。

(13.)可预防急产的措施是

- A. 经产妇宫口开 4cm，初产妇宫口开全送产房
- B. 常规肥皂水灌肠
- C. 分娩时行会阴侧切
- D. 预产期前提前住院待产
- E. 人工破膜

正确答案： D

参考解析：

防止急产的发生：①对有急产史的产妇提前住院待产；②发现宫缩过频、过强时，立即报告医师，并做好接生和抢救新生儿的准备；③左侧卧位，吸氧等。

【该题针对“产力异常.”知识点进行考核】

(14.)有关子宫收缩力的叙述不正确的是

- A. 子宫收缩力是分娩的主要力量
- B. 子宫收缩乏力可导致产后出血
- C. 规律的宫缩对称
- D. 子宫收缩上段弱、下段强，称极性
- E. 子宫体部肌纤维收缩时变短、变粗，间歇时放松

正确答案： D

参考解析：子宫底部收缩力最强、最持久，向下则逐渐减弱、变短，宫缩的这种下行性梯度称为宫缩的极性。

(15.)儿童生长发育规律错误的是

- A. 生长发育是一个连续过程
- B. 有规律可循
- C. 各系统器官发育速度不平衡
- D. 存在性别差异
- E. 生殖系统的发育先快尔后回缩

正确答案： E

参考解析：发育先快而后回缩的是淋巴系统，生殖系统是先慢后快。

(16.)分娩机制中内旋转可使胎头

- A. 前囟转至耻骨弓下面
- B. 后囟转至骶骨前方
- C. 矢状缝与中骨盆前后径相一致
- D. 矢状缝与骨盆入口横径相一致
- E. 矢状缝与骨盆出口横径相一致

正确答案： C

参考解析：胎头为适应骨盆纵轴而旋转，使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致，称为内旋转。

(17.)关于革兰阴性杆菌肺炎的特点，下列应除外的是

- A. 大多数病人有发热
- B. 引起肺组织坏死脓肿形成
- C. 咳暗红色胶胨状黏痰
- D. 常为健康的青壮年
- E. 抗生素治疗后体温多在 2~3 日降至正常

正确答案： D

参考解析：革兰阴性杆菌多见于老年人、久病体弱者。

(18.)麻疹疫苗第一次接种时间是

A. 出生后 28 天

- B. 3 个月以上
- C. 6 个月以上
- D. 8 个月以上
- E. 1 岁以上

正确答案： D

参考解析：麻疹疫苗的初次年龄是出生后 8 个月以上。

(19.) 下列疾病需选用碱性阴道冲洗液的是

- A. 念珠菌阴道炎
- B. 滴虫阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 宫颈糜烂
- E. 外阴炎

正确答案： A

参考解析：念珠菌阴道炎阴道灌洗用 2%~4%碳酸氢钠。

(20.) 小儿，女，6kg，每日应摄取的总热量是

- A. 500kcal
- B. 600kcal
- C. 660kcal
- D. 720kcal
- E. 900kcal

正确答案： C

参考解析：婴儿应按每日每千克 110kcal 计算能量，故 6kg 小儿每日总热量是 660kcal。

(21.) 张力性气胸最有效的治疗方法是

- A. 胸腔闭式引流
- B. 高流量吸氧
- C. 呼吸兴奋药
- D. 激素
- E. 气管插管

正确答案： A

参考解析：张力性气胸需要进行排气治疗。

(22.) 既扩张小动脉也扩张小静脉的血管扩张药是

- A. 硝普钠
- B. 异山梨酯
- C. 多巴酚丁胺
- D. 硝苯地平
- E. 多巴胺

正确答案： A

参考解析：硝普钠可同时扩张小动脉及静脉，同时降低心脏前后负荷。

(23.) 下列关于心房颤动的治疗应除外的是

- A. 洋地黄
- B. 地尔硫䇲
- C. 同步电复律
- D. 非同步电复律
- E. 胺碘酮

正确答案： D

参考解析：急性期应首选同步电复律治疗。心室率不快，发作时间短暂者无需特殊治疗；如心率快且发作时间长，可用洋地黄减慢心室率，维拉帕米、地尔硫䇲等药物也可终止心房颤动。对持续性心房颤动病人，如有恢复正常窦性心律指征时，可用同步直流电复律或药物复律。

【该题针对“心律失常*”知识点进行考核】

(24.) 以下先天性心脏病中属无分流型的是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 法洛四联症
- D. 动脉导管未闭
- E. 主动脉缩窄

正确答案： E

参考解析：法洛四联症属右向左分流型；房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭属左向右分流型；主动脉缩窄属无分流型先天性心脏病。

(25.) 控制典型心绞痛发作的最佳药物是

- A. 比索洛尔
- B. 普尼拉明
- C. 硝酸甘油
- D. 阿托品
- E. 异山梨酯

正确答案： C

参考解析：硝酸酯类药物是最有效、作用最快终止心绞痛发作的药物，可扩张冠脉，增加冠脉血流量，同时扩张外周血管，减轻心脏负担而缓解心绞痛。如舌下含化硝酸甘油 0.3~0.6mg。

(26.) 妊娠合并肝炎对母体的影响不包括

- A. 产褥期血栓形成
- B. 早孕反应加重
- C. 重症肝炎，常并发 DIC
- D. 可导致妊娠高血压综合征
- E. 易发生产后出血

正确答案： A

参考解析：肝炎对孕妇的影响包括孕早期可加重妊娠反应，晚期则使妊娠期高血压疾病发生率增高。分娩时易发生产后出血。重症肝炎时，常并发 DIC。

(27.) 急性心肌梗死的发热体温一般为

- A. 37.5℃
- B. 38℃
- C. 38.5℃
- D. 39.5℃
- E. 40℃

正确答案： B

参考解析：于发病 24~48 小时起有发热，体温在 38℃ 左右，多由坏死组织吸收引起，多在 1 周内恢复正常。

(28.) 属于孕 20 周末胎儿的发育特征为

- A. 皮下脂肪开始沉着
- B. 临床上用听诊器可听到胎心音
- C. 身长 40cm
- D. 指（趾）甲已达指端
- E. 各脏器均已发育

正确答案： B

参考解析：妊娠 20 周末：胎儿身长约 25cm，体重约 300g。临床可听到胎心音，出生后已有心跳、呼吸、排尿及吞咽运动。妊娠 24 周末各脏器均已发育；妊娠 36 周末指（趾）甲已达指（趾）尖。

(29.) 下列疾病需要安装人工心脏起搏器治疗的是

- A. 一度房室传导阻滞
- B. 窦房结功能衰竭
- C. 心房扑动
- D. 心室扑动
- E. 二度 I 型房室传导阻滞

正确答案： B

参考解析：病态窦房结综合征最理想的治疗是安装心脏起搏器。

(30.) 妊娠合并心脏病的孕妇，临产时的处理不正确的是

- A. 临产用抗生素，至产后 1 周
- B. 可适当用镇静药
- C. 常规不使用洋地黄预防心力衰竭
- D. 尽量缩短产程
- E. 产后出血较多时应尽量避免输血

正确答案： E

参考解析：为防止产后出血过多，可遵医嘱输血、输液，仔细调整滴速。

【该题针对“心脏病.”知识点进行考核】

(31.)属于质子泵抑制药的是

- A. 雷尼替丁
- B. 阿托品
- C. 氢氧化铝
- D. 奥美拉唑
- E. 米索前列醇

正确答案： D

参考解析：奥美拉唑是 H^+-K^+-ATP 酶泵抑制药。

(32.)原发性肝癌最常见的最早出现的症状是

- A. 食欲缺乏
- B. 发热
- C. 肝大
- D. 肝区疼痛
- E. 黄疸

正确答案： D

参考解析：原发性肝癌起病隐匿，早期缺乏典型表现。早期病人可无任何症状和体征。中晚期可出现肝区疼痛。

(33.)腹部触诊为揉面感最多见于

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性弥漫性腹膜炎
- C. 结核性腹膜炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 肝癌破裂出血

正确答案： C

参考解析：腹壁柔韧感是腹膜遭受轻度刺激或有慢性炎症引起腹壁紧张度增加的一种表现，触之似揉面团一样，故又称揉面感，可见于结核性腹膜炎各型。

(34.)有机磷农药中毒死亡的主要原因是

- A. 休克
- B. 心室颤动
- C. 心搏骤停
- D. 消化道出血
- E. 呼吸衰竭

正确答案： E

参考解析：有机磷中毒的死因主要为呼吸衰竭，其原因是肺水肿、呼吸肌瘫痪或呼吸中枢抑制所致。

(35.)女，40岁，接触性出血。宫颈活检后确诊为宫颈癌Ⅰ期，首选治疗方法是

- A. 放疗+激素治疗

- B. 放疗
- C. 手术治疗
- D. 免疫疗法
- E. 综合疗法

正确答案： C

参考解析：癌症早期尽量行手术治疗。

(36.)有机磷农药中毒出现烦躁、抽搐时，忌用的药物是

- A. 地西洋
- B. 阿托品
- C. 吗啡
- D. 异丙肾上腺素
- E. 地塞米松

正确答案： C

参考解析：有机磷农药中毒忌用抑制呼吸中枢的药物如吗啡、巴比妥类。

(37.)热痉挛病人最常见的表现是

- A. 腓肠肌痉挛、疼痛
- B. 肱二头肌痉挛
- C. 呼吸肌痉挛，呼吸肌麻痹
- D. 胸大肌痉挛，胸痛
- E. 腹肌痉挛

正确答案： A

参考解析：热痉挛（中暑痉挛）大量出汗后大量饮水，盐分补充不足，使血中钠、氯浓度降低，病人常感到四肢无力.阵发性肌肉痉挛和疼痛，常呈对称性，以腓肠肌痉挛最为多见，体温多正常。

(38.)女，32岁。入院时体重56kg，剖腹探查术后，测血清钠157mmol/L，口渴，尿少，尿比重1.052。此病人目前的水、电解质状况是

- A. 混合性缺水
- B. 低渗性缺水
- C. 等渗性缺水
- D. 高渗性缺水
- E. 水中毒

正确答案： D

参考解析：正常血清钠的范围是135~145mmol/L，此病人为157mmol/L，属于典型高渗性脱水。

(39.)女，25岁。行内镜下逆行胰胆管造影术，术后3小时诉腹部胀痛。查体：生命体征平稳，上腹部轻压痛。下列处理不正确的是

- A. 平卧，放松腹肌
- B. 协助病人做B超

- C. 观察腹部体征变化
- D. 嘱病人进全流食
- E. 使用抗生素

正确答案： D

参考解析：ERCP 检查的并发症是急性胆管炎和急性胰腺炎，病人出现腹痛症状，护士应该按急腹症处理，先暂时禁食。

(40.)男，62 岁。有吸烟史 20 余年，并有慢性咳嗽、咳痰 15 年，近年出现呼吸困难并呈不断加重现象，应首先考虑的是

- A. 肺癌
- B. 慢性支气管炎
- C. 慢支肺气肿
- D. 肺脓肿
- E. 肺炎链球菌肺炎

正确答案： C

参考解析：肺气肿的主要症状是在慢性支气管炎的基础上出现进行性加重的呼吸困难。【该题针对“慢性阻塞性肺气肿”知识点进行考核】

(41.)女，30 岁。活动后心悸、气促 4 年，偶感心前区疼痛。查体：血压 140/40mmg，心界向左下扩大，胸骨左缘第 3 肋间闻及舒张期叹气样杂音，最可能的诊断是

- A. 冠心病心绞痛
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 风心病，主动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 肥厚性心肌病

正确答案： C

参考解析：主动脉瓣关闭不全体检第 2 主动脉瓣区可听到舒张早期叹气样杂音。

(42.)男，68 岁。诊断为 2 型糖尿病 20 年，此次因血糖控制不稳定收住入院。体检时发现刺激双下肢足背至踝部无疼痛反应或减弱，该病人最可能发生了

- A. 运动觉障碍
- B. 浅感觉障碍
- C. 定位觉障碍
- D. 复合感觉障碍
- E. 深感觉障碍

正确答案： B

参考解析：痛觉为浅感觉。【该题针对“神经系统疾病概述”知识点进行考核】

(43.)男，28岁。因口服敌敌畏而急诊入院，经急救治疗后症状缓解，又突然病情反复，再度陷入昏迷，此时，可能最大的原因是

- A. 阿托品的使用过量
- B. 洗胃不彻底
- C. 碘解磷定用量不足
- D. 迟发性神经病
- E. 中间综合征

正确答案： B

参考解析：急性中毒者有时经急救好转后，突然出现病情反复，病人可再度陷入昏迷，或出现肺水肿而死亡。反复原因可能与洗胃及皮肤去除毒物不彻底或过早停药有关。

(44.)可出现早期症状轻，而晚期症状重的是

- A. 脾破裂
- B. 消化道出血
- C. 阑尾炎
- D. 结肠破裂
- E. 胃破裂

正确答案： D

参考解析：1. 胃肠破裂可见膈下游离气体。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

2. 脾破裂可伴失血性休克症状。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

3. 结肠内液体少而细菌多，结肠破裂病人一般早期症状轻而晚期症状重。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

(45.)可伴失血性休克症状的是

- A. 脾破裂
- B. 消化道出血
- C. 阑尾炎
- D. 结肠破裂
- E. 胃破裂

正确答案： A

参考解析：1. 胃肠破裂可见膈下游离气体。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

2. 脾破裂可伴失血性休克症状。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

3. 结肠内液体少而细菌多，结肠破裂病人一般早期症状轻而晚期症状重。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

考核】

(46.)可出现膈下游离气体的是

- A. 脾破裂
- B. 消化道出血
- C. 阑尾炎
- D. 结肠破裂
- E. 胃破裂

正确答案： E

参考解析：1.胃肠破裂可见膈下游离气体。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

2.脾破裂可伴失血性休克症状。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

3.结肠内液体少而细菌多，结肠破裂病人一般早期症状轻而晚期症状重。【该题针对“专业知识-外科休克病人的护理概述临床表现、治疗要点”知识点进行考核】

(47.)适于检查已婚妇女子宫直肠陷窝病变的是

- A. 外阴检查
- B. 阴道B超
- C. 肛腹诊
- D. 三合诊
- E. 双合诊

正确答案： D

参考解析：前庭大腺炎是病原体侵入前庭大腺引起的炎症，包括前庭大腺脓肿和前庭大腺囊肿。前庭大腺位于大阴唇后部，因此可行外阴检查。

三合诊：经直肠、阴道、腹部联合检查称三合诊。检查内容除与双合诊相同外，还可扪清后倾或后屈子宫的大小，清楚地了解盆腔后壁的情况，可发现子宫后壁、直肠子宫凹陷、子宫骶韧带及双侧盆腔后壁的病变，以及扪诊阴道直肠隔、骶骨前方及直肠内有无病变等。

(48.)适于前庭大腺肿大的检查是

- A. 外阴检查
- B. 阴道B超
- C. 肛腹诊
- D. 三合诊
- E. 双合诊

正确答案： A

参考解析：前庭大腺炎是病原体侵入前庭大腺引起的炎症，包括前庭大腺脓肿和前庭大腺囊肿。前庭大腺位于大阴唇后部，因此可行外阴检查。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/685120030030012131>