

武汉大学

2019 年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题

科目名称：护理综合（A 卷 B 卷）科目代码：308

考试时间：3 小时 满分 300 分

可使用的常用工具：无 计算器 直尺 圆规（请在使用工具前打✓）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。

一、选择题(共 120 小题，每小题 1 分，共 120 分)

1. 我国的第一所正式护士学校成立于（ ）
A. 1780 年，北京 B. 1788 年，上海 C. 1880 年，北京
D. 1888 年，福州 E. 1898 年，南京
2. 乳癌病人乳房出现酒窝征的原因是（ ）
A. 表皮破溃 B. 周围组织或皮肤被肿块累积
C. 乳头深部癌肿侵及乳管致乳头凹陷 D. 癌肿侵入 cooper 韧带使皮肤凹陷
E. 皮下淋巴管被癌细胞堵塞
3. 以下哪一项属于以人的健康为中心阶段的护理特点（ ）
A. 系统化地贯彻“护理程序” B. 建立以病人为中心的护理教育模式
C. 按护理程序的工作方法对病人实施整体护理
D. 护理方法是执行医嘱和护理常规 E. 强调护理是一门专业
4. 甲状腺危象的好发时间是（ ）
A. 术后 36—72 小时 B. 术后 12—36 小时 C. 术后 48 小时
D. 术后 24—48 小时 E. 术后 4—12 小时
5. 以病人为中心的护理特点是（ ）
A. 护患是合作伙伴 B. 护士是医生的助手 C. 医患是合作伙伴
D. 护士具有诊断和处理病人健康问题的能力 E. 应用护理程序进行护理
6. 急性胰腺炎时，慎用（ ）
A. 抗胆碱能药物 B. 吗啡止痛 C. 补充血容量 D. 给予钙盐 E. 胃肠减压
7. 下列哪项不属于护士的专业素质（ ）
A. 有护理专业知识 B. 有较高的慎独修养 C. 有协调管理能力
D. 有运用护理程序解决病人健康问题的能力 E. 良好的沟通能力
8. 下列关于排痰的措施，不妥的是（ ）
A. 多饮水以利于痰液稀释
B. 痰多且无力咳痰者应以祛痰为主
C. 咳嗽反射减弱或消失的病人应给予机械吸痰
D. 为了增加病人的耐受能力，体位引流应在餐后半小时内进行
E. 勤翻身拍背可促进排痰
9. 患者，女，60 岁，因发热、咳嗽 3 天入院，入院后诊断为“慢性支气管炎急性发作”，以下护士收集到的病人资料，其中属于主观资料的是（ ）
A. 体温 39.5℃ B. 咳白色痰 C. 急性面容 D. 头痛 3 小时 E. 呼吸 20 次/分
10. 应用奥瑞姆自理模式护理病人时，护理系统的选择取决于（ ）
A. 医生的医嘱 B. 病人的病情 C. 病房护士的编制 D. 病人的自理能力

：码号证考准

题写要不内线封密

：业专考报

：名姓

11. 32

对其不适合 ()

- A. 给予清淡、营养丰富、易消化食物 B. 为病人提供一个安静、舒适的环境
C. 监测体温、尿液性状的变化 D. 禁用盆浴 E. 经常预防性服用抗菌药物
12. 护理记录单采用 PIO 形式, 其中“O”代表的意义是 ()
A. 健康问题 B. 护理诊断 C. 护理目标 D. 护理措施 E. 护理计划实施的效果
13. 骨折临床愈合标准, 不确切的是 ()
A. 患肢无纵轴叩击痛 B. 局部无异常活动 C. X 线摄片骨折线消失
D. 解除外固定后不变形 E. 受伤上肢向前平举 1 公斤持续 1 分钟
14. 首先将压力的概念用于生物医学领域, 被称为是“压力之父”的是 ()
A. 加拿大生理、心理学家席尔 B. 美国心理学家拉扎勒斯
C. 美国精神病学家霍姆斯 D. 美国精神病学家拉赫
E. 美国生理心理学家沃尔特·坎农
15. 成长与发展的心理社会领域内容不包括 ()
A. 道德 B. 认知 C. 情感 D. 生理 E. 社会
16. () 是诊断早期胃癌的有效方法。
A. 内镜检查 B. X 线钡餐检查 C. B 超检查 D. CT 检查 E. 病理检查
17. 艾瑞克森的人格发展亲密对孤独的危机在哪期 ()
A. 幼儿期 B. 学龄前期 C. 学龄期 D. 青春期 E. 青年期
18. 帕金森病病人在接受左旋多巴及其混合制剂治疗时, 不宜同时使用的药物 ()
A. 维生素 A B. 维生素 C C. 维生素 B6 D. 维生素 B2 E. 维生素 D
19. 正性解决指标学会自控而不失自尊, 能与人共处, 是心理社会发展学说中的 ()
A. 学龄期 B. 幼儿期 C. 学龄前期 D. 青春期 E. 青年期
20. 对于脑脊液漏病人的护理措施中不包括 ()
A. 用药水清洗鼻腔预防感染 B. 耳漏病人取患侧卧位 C. 嘱病人勿擤鼻涕
D. 禁止填塞鼻孔 E. 禁止经鼻腔插胃管
21. 以下对于颅内压增高头痛的特点的描述中正确的是 ()
A. 夜间轻 B. 打喷嚏时加重 C. 咳嗽时减轻 D. 低头时减轻 E. 晨起较轻
22. 下列不属于护理差错的是 ()
A. 错抄、漏抄医嘱, 而影响病人治疗者
B. 各种检查、手术因漏做皮肤准备或备皮划破多处, 而影响手术及检查者
C. 手术标本丢失或未及时送验, 增加病人痛苦, 影响诊断者
D. 因病人自述三天前用过青霉素, 即直接给病人注射青霉素造成病人过敏死亡者
E. 发生 II 度褥疮、II 度烫伤, 短期治疗难以治愈者
23. 关于纽曼的健康系统模式, 下列描述不正确的是 ()
A. 理论目的是解释护理对象系统与环境间互动的关系
B. 压力源可分为人体内压力源、人际间压力源和人际以外压力源
C. 人是一种与环境相互影响的开放系统
D. 当系统不稳定或不平衡时, 人就不健康
E. 环境中包含主要刺激、相关刺激和固有刺激
24. 危险性护理诊断的书写格式是 ()
A. PES 公式 B. PE 公式 C. PS 公式 D. P 公式 E. ES 公式
25. 1986 年, 美国高等护理教育学会规定护理本科生应具备的核心能力不包括 ()
A. 批判性思维 B. 评估 C. 诊断 D. 技能 E. 沟通

26.

27. 婴儿对外部世界信任感的建立始于 ()

- A. 胎儿期 B. 新生儿期 C. 婴儿期 D. 幼儿期 E. 学龄前期

28. 鼓励自立、自强和自我决策力应在哪期进行 ()

- A. 生殖期 B. 肛门期 C. 性蕾期 D. 潜伏期 E. 口欲期

29. 病人武某, 男, 42岁。2天前在山上游玩时被树枝扎伤手掌, 次日出现类似感冒的症状, 全身乏力, 头晕, 头痛, 吃东西费力, 今日出现张口困难, 面部肌肉抽搐等症状。查体: T36.8℃, P70次/分, R15次/分, BP98/70mmHg; 伤口细长, 局部红肿, 有压痛。预防该病最有效的措施是 ()

- A. 注射 TAT B. 注射人体免疫球蛋白 C. 彻底清创
D. 注射胎盘球蛋白 E. 大量应用抗生素

30. 艾瑞克森的人格发展主动对内疚的危机在哪期 ()

- A. 幼儿期 B. 学龄前期 C. 学龄期 D. 青春期 E. 青年期

31. 有传染性、需隔离的外科感染性疾病是 ()

- A. 指头炎 B. 淋巴管炎 C. 疔 D. 丹毒 E. 急性蜂窝组织炎

32. 按照罗依适应模式, 外科手术后病人的疼痛为 ()

- A. 主要刺激 B. 相关刺激 C. 固有刺激 D. 条件刺激 E. 一般刺激

33. 护士在执行医嘱时, 如对医嘱内容有怀疑应 ()

- A. 拒绝执行 B. 自行改为正确后再执行 C. 按医嘱执行
D. 向开医嘱的医生询问以证实医嘱的准确性再执行 E. 以上都不是

34. 一病人由于患肺癌产生了对死亡的恐惧, 这种压力源属于 ()

- A. 心理性 B. 躯体性 C. 社会性 D. 文化性 E. 发展性

35. 病人, 男, 52岁, 因脑肿瘤致颅内压增高, 行脑室引流术后 3h, 引流管无脑脊液流出, 不正确的处理方法是 ()

- A. 报告医师 B. 用生理盐水冲洗 C. 将引流瓶降低
D. 将引流管轻轻旋转 E. 必要时换管

36. 某病人所居住的病室室温为 31℃, 相对湿度为 70%, 此环境对病人的影响是 ()

- A. 闷热难受 B. 水分蒸发慢, 散热增加 C. 水分蒸发快, 散热增加
D. 咽喉疼痛 E. 肌肉紧张而产生不安

37. 中凹卧位的正确姿势为 ()

- A. 头胸部抬高 5°~10°, 下肢抬高 10°~20°
B. 头胸部抬高 30°~40°, 下肢抬高 40°~50°
C. 头胸部抬高 20°~30°, 下肢抬高 30°~40°
D. 头胸部抬高 10°~20°, 下肢抬高 20°~30°
E. 头胸部抬高 40°~50°, 下肢抬高 50°~60°

38. 口腔有绿脓杆菌感染的病人应选用的漱口液是 ()

- A. 0.02%呋喃西林溶液 B. 1%~3%过氧化氢溶液 C. 2%~3%硼酸溶液
D. 0.1%醋酸溶液 E. 1%~4%碳酸氢钠溶液

39. 炎性浸润期压疮出现大水疱, 正确的处理是 ()

- A. 涂厚层滑石粉, 包扎 B. 剪去表皮无菌纱布, 包扎 C. 抽出水疱内液体, 消毒, 包扎
D. 揭去表面, 贴新鲜蛋膜 E. 用 1:5000 呋喃西林清洁创面

40. 化学消毒灭菌法不包括 ()

- A. 喷雾法 B. 浸泡法 C. 洗涤法 D. 擦拭法 E. 熏蒸法

41. 正确的结核菌素试验结果判断的方法是 ()

24

24

48

72

E. 注射后 12 小时测量皮肤局部红晕直径

42. 紧急胃镜检查应在上消化道出血后 ()

A. <24h B. 24-48h C. 48-72h D. >72h E. 出血停止

43. 不符合隔离原则的一项是 ()

A. 隔离单位标记明显 B. 门口设消毒盆、手刷、毛巾 C. 脚垫用消毒液浸湿
D. 使用过的物品冲洗后立即消毒 E. 穿隔离衣后不得进入值班室

44. 护士处理医嘱时, 应最先处理的是 ()

A. tid B. sos C. prn D. st E. hs

45. 下列属于备用医嘱的是 ()

A. 病危 B. 氧气吸入 prn C. 测血压 q4h D. 二级护理 E. 流质饮食

46. 濒死期病人的临床表现是 ()

A. 呼吸停止 B. 心跳停止 C. 反射性反应消失
D. 体温逐渐下降, 接近室温 E. 呼吸衰竭

47. 以下疾病与大肠癌关系最为密切的是 ()

A. 家族性结肠息肉病 B. 溃疡性结肠炎 C. 结肠克罗恩病
D. 结肠结核 E. 结肠血吸虫性肉芽肿

48. 病人对以前的错误行为表现出后悔, 积极配合治疗, 该病人处于心理反应的哪一期 ()

A. 否认期 B. 愤怒期 C. 协议期 D. 忧郁期 E. 接受期

49. 洗胃的适应证不包括 ()

A. 幽门梗阻病人 B. 食物中毒 C. 巴比妥类药物中毒
D. 胃穿孔手术前准备 E. 有机磷农药中毒

50. 患者女性, 28 岁, 既往体检时发现肝功能正常, 抗 HBs 阳性, 反复查 HBV 其他血清标记物均为阴性。表示此患者为 ()

A. 乙型肝炎有传染性 B. 乙型肝炎病情稳定 C. 乙型肝炎病毒携带者
D. 乙型肝炎恢复期 E. 对乙型肝炎病毒有免疫力

51. 发生溶血反应时, 病人最早出现的主要表现为 ()

A. 寒战、高热、恶心、呕吐 B. 头部胀痛、面部潮红、恶心、呕吐、腰背部剧痛
C. 呼吸困难、血压下降、闻及肺部哮鸣音 D. 少尿、蛋白尿
E. 瘙痒、皮疹、颜面部水肿

52. 增加血红蛋白在尿中溶解度的药物是 ()

A. 5%碳酸氢钠 B. 3.8%枸橼酸钠 C. 11.2%乳酸钠 D. 0.9%氯化钠 E. 5%葡萄糖氯化钠

53. 静脉输液过程中发生空气栓塞的致死原因是气栓阻塞 ()

A. 上腔静脉入口 B. 下腔静脉入口 C. 肺动脉入口 D. 主动脉入口 E. 肺静脉入口

54. 男性, 72 岁, 慢性咳嗽、咳痰 20 余年, 每年持续 3~4 个月, 近 1 年出现活动后气短, 伴双下肢水肿。今日晨起突感左上胸针刺样疼痛, 继之出现呼吸困难、大汗, 不能平卧, 来院就诊。询问病史的重点应是 ()

A. 胸痛的部位、性质及伴随症状 B. 冠心病、心绞痛病史 C. 吸烟史
D. 近期心电图检查情况 E. 家族史

55. 下列哪种情况是最急需处理的? ()

A. 头皮血肿 B. 线性骨折 C. 凹陷性骨折, 深度为 0.5cm
D. 脑震荡 E. 颅内血肿并有脑疝迹象

56. 下列哪项不是急性阑尾手术术后给予半卧位的主要目的 ()

57. 肌肉注射时，运用连线法进行体表定位，注射部位为（ ）
- A. 髂前上棘和尾骨连线的外上 1/3 B. 髂嵴和尾骨连线的中 1/3
C. 髂嵴和尾骨连线的外上 1/3 D. 髂前上棘和尾骨连线的中 1/3
E. 髂前上棘和尾骨连线的后 1/3
58. 护理留置导尿管病人，不妥的是（ ）
- A. 每日更换集尿袋 B. 每周更换导尿管 C. 每周清洁尿道口 2 次
D. 嘱病人多喝水 E. 停止留置导尿前，间歇性夹闭引流管
59. 采集做尿爱迪计数的尿标本时加入甲醛的目的是（ ）
- A. 固定尿中有机成分 B. 防止尿液改变颜色 C. 保持尿中化学成分不变
D. 防止尿中的激素被氧化 E. 避免尿液被污染而变质
60. 肝昏迷病人禁用何种溶液灌肠（ ）
- A. 等渗盐水 B. 肥皂水 C. 等渗冰盐水 D. 碳酸氢钠水 E. 温开水
61. 哪种液体成份与细胞外液最接近（ ）
- A. 5%葡萄糖盐水 B. 0.9%氯化钠溶液 C. 林格氏液 D. 平衡盐液 E. 低分子右旋糖酐
62. 各型休克的共同特点是（ ）
- A. 血压下降 B. 中心静脉压下降 C. 脉压下降 D. 尿量减少 E. 微循环灌流不足
63. 甲状腺大部分切除术后发生呼吸困难和窒息与下列哪项因素无关（ ）
- A. 手术创伤的应激诱发的危象 B. 切口内出血压迫气管 C. 气管软化塌陷
D. 喉头水肿 E. 双侧喉返神经损伤所致声带麻痹
64. 南丁格尔率领的护理队伍使克里米亚战争中的病死率由 50% 下降到了（ ）
- A. 1.2% B. 2.2% C. 3.2% D. 4.2% E. 5.2%
65. 嵌顿性疝与绞窄性疝的区别是（ ）
- A. 疝囊有无压痛 B. 疝内容物能不能回纳 C. 疝内容物有无血运障碍
D. 是否有机械性肠梗阻的表现 E. 是否引起出血
66. 一个人到陌生的环境中生活，由于语言、风俗习惯、信仰等方面的改变而引起的心理冲突，这种压力源是属于（ ）
- A. 躯体性 B. 心理性 C. 社会性 D. 文化性 E. 其它
67. 发生腹部切口疝的最主要原因是（ ）
- A. 腹壁肌被切断 B. 缝线滑脱 C. 切口感染 D. 切口过长 E. 缝合时强行拉拢创缘
68. 关于倾倒综合征病人的饮食指导，以下不正确的是（ ）
- A. 少食多餐 B. 餐后散步 C. 高蛋白饮食
D. 餐时限制饮水 E. 避免过甜、过咸食物
69. 服用下列药物时需使用吸管的是（ ）
- A. 止咳糖浆 B. 磺胺类 C. 氨茶碱 D. 硫酸亚铁 E. 胃蛋白酶
70. 直肠肛管疾病病人非手术治疗期间宜采取何种饮食（ ）
- A. 流质 B. 少渣半流质 C. 富含膳食纤维的普食 D. 普食 E. 禁食
71. 被誉为“点燃了临终关怀运动灯塔”的临终关怀机构是（ ）
- A. 美国新港临终关怀病院 B. 西欧修道院 C. 美国圣克里斯多弗临终关怀院
D. 加拿大姑息护理协会 E. 天津医学院临终关怀研究中心
72. 关于肛门坐浴，以下说法正确的是（ ）
- A. 1:1000 高锰酸钾 B. 溶液量约 1000ml C. 水温 60℃
D. 便前坐浴，解痉，促进排便 E. 坐浴时间 20-30 分钟
73. 门静脉高压症的侧枝循环中，下列错误的是（ ）

- E. 腹膜后门，体静脉分支吻合
74. 应激对机体的影响程度主要取决于（ ）
 A. 年龄大小 B. 文化程度 C. 性别差异 D. 社会地位 E. 个体承受能力
75. “白胆汁”见于（ ）
 A. 急性单纯性胆囊炎 B. 化脓性胆囊炎 C. 坏疽性胆囊炎 D. 胆囊穿孔 E. 胆囊积液
76. 胆总管引流术后，T 管引流胆汁过多提示（ ）
 A. 肝细胞分泌亢进 B. 胆管分泌胆汁过多 C. 胆囊浓缩功能减退
 D. 胆道下端梗阻 E. 十二指肠分流
77. 老年患者有会阴不适排尿不畅，血 PSA>10ng/ml，可能为（ ）
 A. 前列腺炎 B. 前列腺增生症（BPH） C. 前列腺癌
 D. 神经源性膀胱 E. 膀胱癌
78. 某青年长跑后发生腰部绞痛，继而出现肉眼血尿，最大可能是（ ）
 A. 肾肿瘤 B. 输尿管肿瘤 C. 膀胱肿瘤 D. 上尿路结石 E. 下尿路结石
79. 下列属于护理计划阶段工作内容的是（ ）
 A. 收集资料 B. 实施护理措施 C. 确定预期的护理目标
 D. 提出护理诊断 E. 评价预期目标
80. 属于稳定骨折的是（ ）
 A. 粉碎骨折 B. 嵌入骨折 C. 斜形骨折 D. 螺旋骨折 E. 椎体 1 / 3 骨折
81. 慢性血源性骨髓炎有效的治疗方法是（ ）
 A. 增强营养 B. 局部制动 C. 应用抗生素 D. 局部彻底换药 E. 手术
82. 下列关于艾滋病的说法哪项是正确的（ ）
 A. 是一种急性传染病 B. 主要通过血液传播 C. 病人是艾滋病的主要传染源
 D. HIV 主要侵犯和破坏单核-巨噬细胞 E. 部分病人无症状感染期可达 10 年以上
83. 病人，男，56 岁，头痛 3 个月，多见于清晨，常出现癫痫发作，经检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高，拟行开颅手术。病人入院后出现便秘时，不正确的处理方法是（ ）
 A. 使用开塞露 B. 腹部按摩 C. 使用缓泻剂 D. 高压灌肠 E. 鼓励病人多食蔬菜水果
84. 病人，男，52 岁，因脑肿瘤致颅内压增高，行脑室引流术后 3h，引流管无脑脊液流出，不正确的处理方法是（ ）
 A. 报告医师 B. 用生理盐水冲洗 C. 将引流瓶降低
 D. 将引流管轻轻旋转 E. 必要时换管
85. 对于脑脊液漏病人的护理措施中不包括（ ）
 A. 用药水清洗鼻腔预防感染 B. 耳漏病人取患侧卧位 C. 嘱病人勿擤鼻涕
 D. 禁止填塞鼻孔 E. 禁止经鼻腔插胃管
86. 下列哪种情况是最急需处理的？（ ）
 A. 头皮血肿 B. 线性骨折 C. 凹陷性骨折，深度为 0.5cm
 D. 脑震荡 E. 颅内血肿并有脑疝迹象
87. 世界上第一个颁布护理法的国家是（ ）
 A. 美国 B. 英国 C. 意大利 D. 瑞典 E. 加拿大
88. 乳腺癌最常发生的部位为（ ）。
 A. 乳头及乳晕区 B. 乳房外上象限 C. 乳房外下象限
 D. 乳房内上象限 E. 乳房内下象限
89. 乳腺癌的病人出现橘皮样改变的原因为（ ）
 A. 粘连 B. 肿物压迫 C. 并发炎症

90. A. ST 段降低 B. 出现 U 波 C. QRS 波增宽 D. P—R 间期延长 E. T 波高尖, QT 间期延长
91. 支气管哮喘典型的临床症状是 ()
A. 胸闷 B. 胸痛 C. 咯血 D. 干咳 E. 反复发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难
92. 慢性呼吸衰竭患者血气分析结果: $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 62\text{mmHg}$, 应给予患者 ()
A. 高浓度、高流量持续吸氧 B. 高浓度、高流量间歇给氧
C. 低浓度、低流量持续吸氧 D. 低浓度、低流量间歇吸氧 E. 酒精湿化给氧
93. 最简便有效的处理肺结核患者痰的方法是 ()
A. 煮沸 B. 焚烧 C. 深埋 D. 酒精浸泡 E. 消毒灵浸泡
94. 有关慢性支气管炎诊断标准, 咳嗽、咳痰反复发作时间应为 ()
A. 每年发作至少 1 个月, 持续 2 年以上 B. 每年发作至少 3 个月, 持续 2 年以上
C. 每年发作至少 2 个月, 持续 3 年以上 D. 每年发作至少 6 个月, 持续 4 年以上
E. 每年发作至少 3 个月, 持续 10 年以上
95. 贯穿于护理程序全过程的是 ()
A. 评估和诊断 B. 诊断和计划 C. 计划和实施 D. 实施和评价 E. 评估和评价
96. 阻塞性肺气肿病人最典型的体征是 ()
A. 紫绀 B. 一侧呼吸运动减弱 C. 桶状胸 D. 叩诊清音 E. 呼气延长伴哮鸣音
97. 肝性脑病患者, 近日出现欣快激动, 淡漠少言, 有扑翼样震颤, 请问该患者属于肝昏迷哪一期 ()
A. 前驱期 B. 昏迷前期 C. 昏睡期 D. 昏迷期 E. 兴奋期
98. 某溃疡病患者主诉疼痛失去原有的节律性, 近日在医院检查大便隐血试验阳性, 首要考虑的是 ()
A. 幽门梗阻 B. 溃疡出血 C. 溃疡癌变 D. 溃疡穿孔 E. 溃疡病缓解
99. 胃溃疡患者, 遵医嘱服用 H_2 受体阻断剂, 告知患者应在就餐时和睡前服用的原因是 ()
A. 减少胃酸分泌 B. 保持正常胃酸分泌时
C. 起中和作用 D. 减少胆汁反流 E. 增加胃酸分泌
100. 患者, 女, 52 岁, 常于餐后 4 小时左右上腹部胀痛, 进食后缓解。最近 1 周中上腹部持续性胀痛, 较以往严重, 伴恶心, 呕吐。2 小时前呕血一次后紧张, 气促明显。请问该患者潜在的护理问题是哪一项 ()
A. 疼痛 B. 体液不足 C. 活动无耐力 D. 焦虑 E. 休克
101. 急性胰腺炎患者血淀粉酶正常, 腹痛基本缓解后宜进食 ()
A. 普食 B. 低糖高脂半流质 C. 无渣流质或半流质 D. 高糖高半流质 E. 低糖低脂流质
102. 某护士戴无菌手套时, 错误的做法是 ()
A. 戴手套前先洗手、戴口罩和工作帽 B. 核对标签上的手套号码和灭菌日期
C. 戴上手套的右手持另一手套的内面戴上左手 D. 戴上手套的双手置于腰部水平以上
E. 脱手套时, 将手套翻转脱下
103. 在使用三腔二囊管压迫止血中, 患者突然出现呼吸困难、发绀, 应立即行何种措施 ()
A. 上呼吸机 B. 清除呼吸道分泌物 C. 高流量吸氧
D. 静脉注射呼吸兴奋剂 E. 抽出气囊气体, 同时检查是否脱出
104. 病人需 5 h 内输入液体 1000 ml, 如果点滴系数为 15 滴/ml, 应调节滴速为每分钟 ()
A. 50 滴 B. 45 滴 C. 40 滴 D. 55 滴 E. 60 滴
105. 男性, 68 岁, 突然剧烈头痛伴呕吐, 并迅速昏迷。体检: BP: 26.6/18.5kpa, T: 39°C, 右上下肢瘫痪, 口角右斜, 心肺未见异常。护理不妥的是 ()

106. 下列哪期固结后会造造成压迫或强迫人格 ()
 A. 幼儿期 B. 肛门期 C. 性蕾期 D. 潜伏期 E. 口欲期
107. 下列不符合肾病综合征诊断标准的是 ()
 A. 高血压 B. 高脂血症 C. 大量蛋白尿 (>3.5g/d)
 D. 水肿 E. 低白蛋白血症(血浆白蛋白<30g/l)
108. 罗依认为护理是 ()
 A. 提高病人自理能力 B. 改变环境 C. 减少、减轻压力源造成的不良后果
 D. 增进护理对象控制或适应刺激 E. 保持护理对象系统的稳定
109. 泌尿系感染的患者急性期不宜做的检查是 ()
 A. 尿常规 B. 尿细菌学检查 C. B超检查 D. 腹部平片 E. 静脉肾盂造影
110. 患者女性, 27 岁, 因患缺铁性贫血入院, 该患者在口服铁剂期间, 护士嘱咐患者 Hb 恢复正常后仍要适当延长治疗时间, 其主要目的是 ()
 A. 提高血清铁 B. 补足贮存铁 C. 血象恢复正常
 D. 增加总铁结合力 E. 以上都不正确
111. 下列关于巨幼细胞性贫血患者饮食护理不妥的是 ()
 A. 烹调时不宜温度过高或时间过长 B. 少量多餐
 C. 宜素食 D. 烹煮后不宜久置 E. 忌酗酒
112. 糖尿病最严重的并发症是 ()
 A. 皮肤感染 B. 泌尿系感染 C. 酮症酸中毒 D. 低血糖 E. 白内障
113. 使用胰岛素治疗过程中应告知患者警惕出现下列哪种情况 ()
 A. 低血糖 B. 过敏反应 C. 酮症反应 D. 肾功能损害 E. 胃肠道反应
114. 1 型糖尿病特点是 ()
 A. 发病缓慢 B. 病情较稳定 C. 血浆胰岛素水平正常或偏高
 D. 血浆胰岛细胞抗体阳性 E. 对胰岛素不敏感
115. 下面关于系统红斑狼疮的一般治疗的说法不正确的是 ()
 A. 应避免日晒 B. 活动期病人应卧床休息
 C. 慢性期或病情稳定的患者可适当活动或工
 D. 有感染时应积极治疗 E. 应多晒太阳
116. 肺结核患者治疗 2 个月症状消失, 即停药。1 年后出现低热, 复查胸片病情恶化。本例治疗失败的主要原因 ()
 A. 停药过早 B. 机体免疫力太差 C. 未规律用药 D. 化疗方案不合理 E. 细菌耐药
117. 查对制度中“七对”的内容不包括 ()
 A. 床号、姓名 B. 方法、时间 C. 浓度、剂量 D. 药物有无沉淀、混浊 E. 药名
118. 支气管肺癌最常见的早期症状是 ()
 A. 发热 B. 刺激性干咳 C. 胸痛 D. 喘鸣 E. 血痰
119. 结核病最主要的传播途径是 ()
 A. 飞沫 B. 尘埃 C. 食物和水 D. 皮肤接触 E. 毛巾或餐具
120. 下列哪项不符合无菌技术操作原则 ()
 A. 无菌操作前半小时停止清扫 B. 无菌包潮湿不能再用
 C. 从无菌容器内取出的无菌物品未用完, 应立即放回
 D. 无菌物品和非无菌物品应分开放置 E. 操作时手臂保持在腰部水平以上

二、问答题(共 5 小题, 每小题 20 分, 共 100 分)

1、试述弗洛伊德的人格发展理论中人格发展的主要时期及特点。

2

3

- 4、试述等渗性缺水的病因、临床表现及处理原则。
- 5、如何判断上消化道出血患者有继续出血或再出血？

三、病案分析题(共 4 小题, 每小题 20 分, 共 80 分)

1. 患者, 男, 28 岁。今日午餐后出门时被汽车撞伤, 伤后感腹部剧烈疼痛, 呈持续性, 伴恶心、呕吐、头晕等症状, 吐出物为血性, 带食物残渣, 被他人扶送入院。体格检查: T: 36.8℃, P: 112 次/分, R: 15 次/分, BP: 105/70mmHg, 上腹部皮肤有肿胀, 腹式呼吸减弱, 全腹有压痛及反跳痛, 肌紧张明显, 呈板状腹, 肝脾肋下未触及, 肠鸣音减弱。问题:
 - (1) 该患者的医疗诊断可能是什么?
 - (2) 目前患者的主要护理问题是什么?
 - (3) 请制定相应的护理措施。
2. 患者, 男, 70 岁。因慢性阻塞性肺气肿住院治疗。今早 9 时起开始静脉输入 5%葡萄糖溶液 500ml 及 0.9%氯化钠溶液 500ml。滴速为 50 滴/分。半小时后护士巡视到该病房, 发现病人咳嗽、咳粉红色泡沫样痰, 呼吸急促, 大汗淋漓。问题:
 - (1) 此病人可能出现了什么问题?
 - (2) 出现此问题最主要的原因可能是什么?
 - (3) 护士应采取哪些护理措施?
3. 患者, 女, 74 岁。3 小时前因剧烈运动出现胸痛, 伴左肩痛, 含服硝酸甘油疼痛不能缓解, 急送医院, 在急诊室呕吐一次, 呕吐物为胃内容, 查体: T: 37.6℃, BP: 170/100mmHg, 第一心音减弱, 未闻及病理性杂音, 心电图: V_1-V_5 导联 ST 段显著抬高 3-5mm。患者高血压 20 余年, 间断服药, 血压控制情况不详。问题:
 - (1) 为尽快明确诊断, 下一步应作哪些必要的检查?
 - (2) 该患者当前最重要的护理诊断是什么?
 - (3) 应采取哪些相应的护理措施?
4. 患者, 女, 68 岁。糖尿病史 20 余年, 患者近一周多饮、多食、多尿等症状加重, 今日逐渐出现乏力、嗜睡、呼吸加快, 呼气中有烂苹果味, 而后又出现尿量减少, 皮肤弹性差, 眼球下陷, 脉细速, 血压下降。问题:
 - (1) 该患者病情出现了什么变化?
 - (2) 引起该病情变化的常见诱因有哪些?
 - (3) 护士应该如何配合急救和护理?

武汉大学

2019 年全国硕士研究生招生考试初试自命题答案

科目名称：护理综合（A 卷 B 卷）科目代码：308

考试时间：3 小时 满分 300 分

可使用的常用工具：无 计算器 直尺 圆规（请在使用工具前打✓）

一、选择题（共 120 小题，每小题 1 分，共 120 分）

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. D | 2. D | 3. E | 4. B | 5. E |
| 6. B | 7. B | 8. B | 9. D | 10. D |
| 11. E | 12. C | 13. D | 14. A | 15. D |
| 16. A | 17. E | 18. C | 19. B | 20. A |
| 21. B | 22. D | 23. E | 24. B | 25. C |
| 26. A | 27. C | 28. A | 29. A | 30. B |
| 31. D | 32. A | 33. D | 34. B | 35. B |
| 36. A | 37. D | 38. D | 39. C | 40. C |
| 41. D | 42. B | 43. D | 44. D | 45. B |
| 46. E | 47. A | 48. C | 49. D | 50. E |
| 51. B | 52. A | 53. C | 54. A | 55. E |
| 56. C | 57. A | 58. C | 59. B | 60. B |
| 61. D | 62. E | 63. A | 64. B | 65. C |
| 66. D | 67. C | 68. B | 69. D | 70. C |
| 71. C | 72. E | 73. D | 74. E | 75. E |
| 76. D | 77. C | 78. D | 79. C | 80. B |
| 81. E | 82. E | 83. D | 84. B | 85. A |
| 86. E | 87. B | 88. B | 89. E | 90. E |
| 91. E | 92. C | 93. B | 94. B | 95. E |
| 96. C | 97. A | 98. C | 99. A | 100. B |
| 101. E | 102. C | 103. E | 104. A | 105. C |
| 106. D | 107. A | 108. D | 109. E | 110. B |
| 111. C | 112. C | 113. A | 114. D | 115. E |
| 116. A | 117. D | 118. B | 119. A | 120. C |

二、问答题（每题 20 分，共 100 分）

1. 试述弗洛伊德的人格发展理论中人格发展的主要时期及特点。

答：

口欲期（出生~1 岁） 此期的原始欲主要集中于口腔，婴儿通过吸吮、吞咽、进食等经口动来获得快乐与安全感。

肛欲期（1~3 岁） 此期的原始欲主要集中于肛门区。儿童的愉快感主要来自于排泄所带快感及自己对排泄的控制。

性蕾期（3~6 岁） 此期的原始欲集中在生殖器。儿童喜欢触摸自己的性器官，为快感的来源，并会察觉到性别差异。

潜伏期（6~12 岁） 此期性本能处于潜伏状态，主要集中于智力及身体的活动上。

生殖期（12 岁以后） 青春期开始后，原始欲又回到生殖器。其注意力从双亲转向所喜爱性伴侣，建立起正常的成熟的两性关系，性心理的发展趋向成熟。

：码号证考准

题写要不内线封密

：业专考报

：名姓

2.

答：(1)胰腺手术后引流管多，应明确名称，放置位置和各自的作用，在各个引流管上贴好标签，与相应引流装置正确连接。(2)妥善固定，防止脱出。(3)保持引流通畅，防止引流管扭曲，折叠，堵塞，如为腹腔双套管，可用生理盐水加抗生素持续慢速冲洗，维持低负压吸引，有堵塞，则用 20ml 生理盐水缓慢冲洗。(4)定时更换引流装置，严格无菌操作，保护引流管周围皮肤。(5)观察和记录引流液的颜色，性质，量。如有异常，及时找出原因。(6)定期取引流液做细菌培养，合理选用抗生素。

3. 试述慢性肺源性心脏病患者气体交换受损的护理措施。

答：

- (1) 病情观察：判断病人呼吸困难类型并动态评估病人呼吸困难的严重程度。
- (2) 环境与休息：保持并使环境安静舒适、空气洁净和温湿度适宜。
- (3) 保持呼吸道通畅：协助病人清理呼吸道分泌物和异物，指导病人正确使用支气管舒张药。
- (4) 氧疗和机械通气的护理：根据呼吸困难的类型、严重程度不同，进行合理氧疗或机械通气。
- (5) 用药护理：遵医嘱应用支气管舒张药、呼吸兴奋药等，观察药物疗效和不良反应。
- (6) 心理护理：应按为病人，在病人呼叫时及时出现在病人身边并给与心理支持以增强其安全感。

4. 试述等渗性缺水的病因、临床表现及处理原则。

答：

- (1) 病因：消化液急性丢失：大量呕吐、肠痿，急性肠梗阻、急性腹膜炎、大面积烧伤等体液丢失于第三间隙。
- (2) 临床表现：恶心、呕吐、厌食、口唇干燥、眼窝凹陷、皮肤弹性降低和少尿等；体液丢失达体重 5%，心率加快、脉搏减弱、血压不稳定或降低、肢端湿冷、组织灌注不良等。体液丢失达体重 6%-7%时，除上述表现外，还表现为休克。并伴有代谢性酸中毒。
- (3) 处理原则：积极治疗原发病，轻度等渗缺少可用等渗盐水或平衡盐溶液补充。严重缺少常用乳酸钠和复方氯化钠溶液。

5. 如何判断上消化道出血患者有继续出血或再出血？

答

- (1) 反复呕血，甚至呕吐物有咖啡色转为鲜红色。
- (2) 黑便次数增加且粪便稀薄，色泽转为暗红色，伴肠鸣音亢进。
- (3) 虽经足量补充血容量，周围循环衰竭现象未见改善，或好转后有恶化，血压波动，中心静脉压不稳定。
- (4) 血红蛋白计数，血红蛋白量和红细胞比积继续下降，网织红细胞计数持续增高。
- (5) 在补液足够、尿量正常的情况下，血尿素氮持续或再次增高。
- (6) 门静脉高压的病人原有脾大，再出血后暂时缩小，如不见脾大恢复亦提示出血不止。

三、病案分析题（每题 20 分，共 80 分）

1. 答：

- (1) 该患者的医疗诊断是：腹腔空腔脏器损伤，胃破裂的可能性大。
- (2) 主要护理问题有：体液不足——与呕吐，禁食有关；疼痛——与脏器受损有关；焦虑——与病情有关；潜在并发症——与病程或治疗手段有关；知识缺乏——与预后知识缺乏有关
- (3) 该患者入院后的护理措施主要有：①体位：绝对卧床休息，禁止随意搬动病人。②禁食，水和禁灌肠，同时行胃肠减压。③密切观察病人生命体征及腹部情况，有变化随时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/685213123032011110>