

2024 河南省平舆县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题大全（考点精编）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 β 受体激动剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 异丙托溴铵
- C: 美托洛尔
- D: 乙酰胆碱

答案：A

2. 用药时宜限制饮水的药物是（）

- A: 利托那韦片
- B: 苯溴马隆胶囊
- C: 环丙沙星片
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

3. 评判为不规范处方的是

- A: 二甲双胍用于糖尿病人
- B: 黄连素用于细菌性腹泻
- C: 无适应证用药
- D: 单张门诊处方超过 5 种药品

答案：D

4. 避免与辛伐他汀合用的药物是 ()

- A: 美罗培南
- B: 克拉霉素
- C: 头孢哌酮
- D: 万古霉素

答案: B

5. 可加重老年人慢性便秘的药物是

- A: 异丙嗪
- B: H
- C: 氯丙嗪
- D: 麻黄碱

答案: A

6. 重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

- A: 弱轻度
- B: 中度
- C: 轻度
- D: 重度

答案: D

7. 能显示药师的文献评价能力和技巧的是

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 随访了解效果，并建立档案
- C: 对问题进行确定并归类
- D: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

答案: D

8. 是否基于试验结果是评价

- A: 前言
- B: 讨论
- C: 结果
- D: 摘要

答案：B

9. 以下所列药物中，使用不当可能导致新生儿出现溶血的是

- A: 阿莫西林
- B: 维生素 C
- C: 吲哚美辛
- D: 苯妥英钠

答案：C

10. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 华法林片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 氯吡格雷片
- D: 双嘧达莫片

答案：C

11. 同时服用有利于铁的吸收的药物是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B
- C: 维生素 A
- D: 维生素 D

答案：A

12. IV 期新药临床试验样本数要求

- A: 20~30 例
- B: ≥ 300 例
- C: 主要病种 ≥ 300 例
- D: 常见病 ≥ 12000 例

答案：D

13. 6 个月~2 岁儿童 WBC 计数正常参考区间是

- A: $(200 \sim 300) \times 10$
- B: $(11.0 \sim 12.0) \times 10$
- C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- D: $(100 \sim 300) \times 10$

答案：B

14. 不宜选静滴 5%碳酸氢钠注射液、碱化尿液的情况是是

- A: 异戊巴比妥中毒
- B: 苯巴比妥中毒
- C: 司可巴比妥中毒
- D: 苯妥英钠中毒

答案：A

15. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为 ()

- A: 溶栓的同时
- B: 溶栓 24h 后
- C: 溶栓 12h 前
- D: 溶栓 12h 后

答案：B

16. 影响药品质量的环境因素不包括

- A: 振荡
- B: 日光
- C: 时间
- D: 人员设置

答案：D

17. 流行性结膜炎可选用

- A: 0.1%碘苷滴眼剂
- B: 四环素眼膏
- C: 2%色甘酸钠滴眼剂
- D: 0.1%羟苄唑滴眼剂

答案：A

18. 环磷酰胺可引起

- A: 出血性膀胱炎
- B: 溶血性尿毒症
- C: 末梢神经炎
- D: 心脏毒性

答案：A

19. 合并 3 度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

- A: 多沙唑嗪
- B: 卡托普利
- C: 哌唑嗪
- D: 维拉帕米

答案：D

20. 处方审核是处方调配的重要环节，药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方，不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

- A: 无正当理由开具高价药
- B: 无适应证用药
- C: 单张门诊处方超过 5 种药品
- D: 联合用药不适宜

答案：D

21. 洋地黄中毒引起的快速性心律失常，首选下列哪种药物

- A: 苯妥英钠
- B: 普鲁卡因胺
- C: 普萘洛尔
- D: 阿托品

答案：A

22. (2017 年真题) 治疗肠道蛔虫病可选用 ()

- A: 阿苯达唑
- B: 双八面体蒙脱石散
- C: 聚乙醇 4000
- D: 莫沙必利

答案：A

23. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 腔内注射
- B: 膀胱灌注

C: 腹腔注射

D: 动脉注射

答案: B

24. (2016 年真题) 治疗口腔溃疡时，贴敷于溃疡处，每处 1 片，一日不得超过 3 片的药物是 ()。

A: 冰硼咽喉散

B: 西地碘含片

C: 地塞米松粘贴片

D: 甲硝唑口腔粘贴片

答案: C

25. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol} / \text{L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

A: 痛风

B: 风湿性关节炎

C: 类风湿关节炎

D: 假性痛风

答案: A

26. 对 5 岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是

A: 布洛芬混悬液

B: 贝诺酯混悬液

C: 20%阿司匹林溶液滴鼻

D: 20%安乃近溶液滴鼻

答案: D

27. 患者，男，58 岁，因心前区疼痛 5 年，加重伴呼吸困难入院。入院前 6 年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

A: 严重主动脉瓣狭窄或肥厚型梗阻性心肌病的心绞痛患者优先使用硝酸酯类药物

B: 发作时可舌下含服作用较快的硝酸酯类制剂

C: 稳定型心绞痛患者合并高血压、糖尿病、心力衰竭可选用卡托普利、依那普利等药物

D: 阿司匹林是常用药物，主要不良反应为胃肠道出血或对阿司匹林过敏

答案：A

28. 患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 588.1 $\mu\text{mol/L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

A: 双氯芬酸钠片

B: 贝诺酯片

C: 阿司匹林片（300mg）

D: 别嘌醇片

答案：A

29. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“B”是指

A: 阿司匹林和 ACEI

B: 健康教育和运动

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: β 受体阻断剂和血压控制

D: 控制饮食和糖尿病

答案：C

30. 患者，女，46 岁，高血压病史 3 年，2 年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛，诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重，采用了联合用药方案：患者用药如下：

A: 双氯芬酸钠缓释片

B: 羟氯喹片

C: 甲氨蝶呤片

D: 氨氯地平片

答案：B

31. 2~3 度房室传导阻滞、充血性心力衰竭禁用 ()。

A: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

B: 利尿剂（噻嗪类）

C: ACEI

D: 利尿剂（袢利尿药）

答案：A

32. 患者，女，77岁，53kg，既往糖尿病病史10年，因“反复尿路感染4个月，加重3天”来院就诊。4个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在37.2℃~37.5℃之间，自服左氧氟沙星片0.29bid治疗5天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星0.29bid治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞(+++)，白细胞计数463.2/gl，细菌计数1262.1/μl。查体：T37.9℃P86次/分R21次/分BP132/77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛(+)，双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数 $12.35 \times 10^9/L$ 、中性粒细胞百分比86.5%，CRP69.5mg/L。血生化：AST15U/L，ALT11U/L，ALB43.29/L，Scr669mol/L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌(ESBLs+)，细菌计数 $>10^5$ cfu/ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

A: CTP 评分

B: HAS—BLED 评分

C: 计算肌酐清除率

D: CAT 评分

答案：C

33. (2015年真题) 细菌感染患者可出现()。

A: 血小板增多

B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 红细胞/血红蛋白减少

答案：B

34. 对多数药品而言，贮藏环境与药品保管的关系是

A: 在0℃以下时，温度越低，对保管越有利

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 在 10℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

C: 在 2℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

D: 在 8℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

答案：C

35. 某患者，男，78 岁既往有动脉粥样硬化史，因尿频，尿急就诊，体征和实验室检查结果为：血压 166/98mmHg，前列腺增生 >60g，前列腺特异性抗原（PAS）正常，在控制患者血压的同时，应联合选用（）

- A: 吲达帕胺
- B: 丙酸睾酮
- C: 泼尼松龙
- D: 非那雄胺

答案：D

36. 患者,男,46岁,拟行肠道手术,术前1天使用导泻药的方法是()

- A: 50%葡萄糖注射液湿敷
- B: 5%氯化钙注射液静脉滴注
- C: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- D: 50%硫酸镁溶液口服

答案：D

37. 可使高血压患者血压升高的药物是()

- A: 抗感宁胶囊
- B: 银翘解毒片
- C: 速感宁胶囊
- D: 复方酚咖伪麻胶囊

答案：D

38. 引起发冷、寒战、面部和四肢发绀,继而发热等输液反应的DMARDs是

- A: 利妥昔单抗
- B: 氯喹
- C: 硫唑嘌呤
- D: 环孢素

答案：A

39. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 压力性尿失禁
- B: 膀胱炎
- C: 急性肾盂肾炎
- D: 急迫性尿失禁

答案：C

40. 将药物治疗成本和所产生的效益归化为以货币为单位的数字，从而进行药物经济学评价，这一评价方法属于

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效用分析
- C: 成本-效果分析
- D: 成本-效益分析

答案：D

41. 妇女口服避孕药致阿米替林清除率下降，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 遗传因素
- B: 基础疾病因素
- C: 性别因素
- D: 年龄因素

答案：C

42. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的是()

- A: 苯丝肼
- B: 克拉维酸钾

C: 叶酸

D: 奥美拉唑

答案: D

43. 关于奥利司他说法错误的是

A: 可干扰维生素的吸收

B: 应在服药前 2h 补充维生素

C: 对肝脏无影响

D: 进餐时服用

答案: C

44. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 发作时可含服作用较快的硝酸酯制剂，首次服用硝酸甘油时，应注意可能发生直立性低血压

B: 稳定性心绞痛患者，合并高血压、糖尿病、心力衰竭的患者可选用卡托普利、依那普利等药物

C: 他汀类药物能有效降低 TC 和 LDLC，其主要不良反应是头痛、面色潮红、心率反射性加快和低血压等

D: 阿司匹林是常用药，主要不良反应为胃肠道出血或阿司匹林过敏

答案: C

45. 治疗药源性疾病的方法如下，最先采用的是

A: 停用致病药物

B: 调整治疗方案

C: 拮抗致病药物

D: 对症治疗

答案：A

46. 可引起驾驶员视力模糊的药物是

A: 阿米洛利

B: 东莨菪碱

C: 双嘧达莫

D: 抗过敏药

答案：B

47. 患者,女,69岁,近一个月出现入睡困难,白天有头昏、疲倦等不适感,尝试非药物治疗无改善,推荐的药物治疗方案是()

A: 氯硝西泮 2mgpoqn

B: 唑吡坦 5mgpoqn

C: 苯巴比妥 100mgpoqn

D: 地西泮 5mgpoqn

答案：B

48. 可吸附砷、沉淀汞的洗胃液是

A: 鸡蛋白

B: 药用炭混悬液

C: 3%~5%鞣酸溶液

D: 1%氯化钠溶液

答案：A

49. 适合睡前服用的是

A: 氟伐他汀

- B: 吲哚美辛
- C: 奥利司他
- D: 多潘立酮

答案：A

50. 严重铅中毒患者出现的最难救治的临床症状是

- A: 中毒性肾炎
- B: 中毒性肝炎
- C: 铅毒性脑病
- D: 贫血

答案：C

51. 患者,男,52岁支气管哮喘病史10年。因间断喘息发作,长期自行服用泼尼松片 20mgq

- A: 消化性溃疡
- B: 低血压
- C: 该患者可能出现的不良反应中,不包括的是 ()
- D: 骨质疏松

答案：C

52. 急性结膜炎患者禁用的药品是

- A: 醋酸可的松滴眼剂
- B: 利福平滴眼剂
- C: 硫酸锌滴眼剂
- D: 酞丁安滴眼剂

答案：C

53. 急性痛风性关节炎期首选药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 碳酸氢钠
- D: 苯溴马隆

答案：A

54. (2018 年真题) 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是 ()

- A: 每日早晚与食物同服
- B: 每日早晚空腹口服
- C: 每晚睡前口服
- D: 每日清晨空腹口服

答案：A

55. 外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 庆大霉素
- C: 制霉菌素
- D: 林可霉素

答案：C

56. 可提示完全梗阻性黄疸的是

- A: $>342 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：A

57. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛；血常规见 WBC15X10⁹ / L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 慢性肾盂肾炎
- B: 急性肾小球肾炎
- C: 急性肾盂肾炎
- D: 急性膀胱炎

答案：D

58. 可用于有机磷农药重度中毒，缓慢静脉注射 1~1.2g, 30 分钟后如不显效，可重复给药，好转后逐渐停药的药物是

- A: 碘解磷定
- B: 维生素 K1
- C: 乙酰胺
- D: 亚硝酸钠

答案：A

59. 就餐前 15~30 分钟给药的是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 瑞格列奈
- D: 胰岛素

答案：D

60. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁155%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid iv gtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid iv gtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 氨溴索注射液
- B: 异丙托溴铵注射液
- C: 布地奈德混悬液
- D: 硝苯地平控释片

答案：B

61. 关于该患者的治疗方案错误的是（）

- A: 当体温正常 48~72h，且达到肺炎临床稳定标准后，可停用抗菌药物
- B: 抗菌药物应持续用至胸片 X 线病灶完全吸收
- C: 在病原学送检后，可立即实施经验性抗菌治疗
- D: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗

答案：B

62. 宜于睡前服用的药品是

- A: 糖皮质激素
- B: 甲氧氯普胺
- C: 洛伐他汀
- D: 阿卡波糖

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

63. 患者，女，42 岁。左足背部出现严重冻疮，可考虑应用

A: 肝素钠乳膏

B: 樟脑软膏

C: 赛庚啉

D: 紫云膏

答案: A

64. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

A: 药物警戒作用

B: 应对投诉作用

C: 用药监督作用

D: 双向交流作用

答案: D

65. (2016 年真题) 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天

B: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天

C: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天

D: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天

答案: B

66. (2018 年真题) 患者突发心前区压榨性疼痛，立即取出硝酸甘油片，正确的使用方法是 ()

A: 舌下含服

B: 清晨服用

C: 应同时碱化尿液

D: 用温水调服

答案: A

67. (2020 年真题) 患者,男,66 岁,2 型糖尿病,长期口服二甲双胍,格列美脲,近日查空腹血糖 12.3mmol/L,糖化血红蛋白 9.0%,主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”,关于该患者药物治疗方案的说法,正确的是 ()

- A: 患者为 2 型糖尿病,加用胰岛素一日 4 次方案不适宜
- B: 门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射
- C: 因采用一日多次胰岛素治疗,格列美脲应停用
- D: 甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用

答案: C

68. 患者,男 58 岁,高血压病史 5 年,吸烟史 40 年,日均 40 支,6 小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊 BP190/120mmHg,血常规基本正常,行头部 MRI 检查后,诊断为急性脑梗死。

- A: 阿司匹林肠溶片 300mgqdpo
- B: 氯吡格雷片 75mgqdpo
- C: 华法林片 3mgqdpo
- D: 阿司匹林肠溶片 100mgqdpo

答案: D

69. 在妊娠期可致颅骨和面部畸形、腭裂的药是

- A: 沙立度胺
- B: 孕激素
- C: 叶酸拮抗剂
- D: 雄激素

答案: C

70. 下列药物中，具有肝药酶诱导作用的是

- A: 异烟肼
- B: 克林霉素
- C: 利福平
- D: 咪康唑

答案：C

71. 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

- A: 合并轻度高血压的患者
- B: 合并高胆固醇血症的患者
- C: 甲状腺切除后的患者
- D: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者

答案：D

72. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁155%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid iv gtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid iv gtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 后期发作必要时可使用 PDE-4 抑制剂
- B: 需掌握吸入技术
- C: 偶发呼吸困难可使用短效支气管舒张剂
- D: 单独应用 ICS 减少急性发作频数

答案：D

73. 属于药品不良反应的是

- A: 服用假药导致的与用药目的无关的有害反应
- B: 合格药品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的有害反应
- C: 合格药品过量服用导致的与用药目的无关的有害反应
- D: 合格药品使用方法不当导致的与用药目的无关的有害反应

答案：B

74. 以下关于调剂资格的叙述正确的是

- A: 具有本科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂
- B: 具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂
- C: 具有中专(药学专业)以上学历即可从事处方调剂
- D: 具有专科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂

答案：B

75. 欧洲药物管理局(EMA)提议“限制临床使用多潘立酮”的主要原因是

- A: 可能引起心脏相关风险
- B: 消化不良患者常擅自服用
- C: 可能引起腹胀、胃灼热
- D: 易发生严重的口腔溃疡

答案：A

76. 杨某，男性，25岁，间断上腹痛2年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂?
- B: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮?

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂？

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁？

答案：A

77. 以下所列处方书写的各项要求中，最正确的是

A: 每张处方不得超过 3 日用量

B: 处方中不得使用药品缩写名称

C: 每张处方不得合开中西药品

D: 每张处方不得超过 5 种药品

答案：D

78. 用前摇匀，尽量将痰液咳出、口内的食物咽下，含激素类制剂用后以温水漱口

A: 气雾剂

B: 阴道栓剂

C: 泡腾片

D: 膜剂

答案：A

79. 急诊处方一般不超过几日

A: 7 日常用量

B: 1 日常用量

C: 15 日常用量

D: 3 日常用量

答案：D

80. 可引起血清尿素氮增高的是

A: 胃溃疡

- B: 肾衰竭
- C: 严重肝病
- D: 急性胰腺炎

答案：B

81. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，显示儿童用药原则是

- A: 密切监护
- B: 避免食物的影响
- C: 根据儿童特点选择适宜的给药方案
- D: 严格掌握用药剂量

答案：C

82. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 格列喹酮
- D: 罗格列酮

答案：B

83. 治疗需用 10% 葡萄糖注射液 1000ml，现仅有 50% 和 5% 浓度的葡萄糖注射液，分别取 50% 和 5% 浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

- A: 500ml，500ml
- B: 889ml，111ml
- C: 111ml，889ml
- D: 200ml，800ml

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/686154224054011030>