

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

全科主治医师考试真题及答案解析 ——《相关专业知识》（二）

一、A1

1.痢疾患者粪便常规检查应取以下哪项标本

- A. 黏液
- B. 血液
- C. 脓血黏液处的粪便
- D. 脓液
- E. 无脓液的粪便

【正确答案】 C

【答案解析】 对于痢疾患者，粪便常规检查应用竹签自粪便多处取材，特别是有脓、血、黏液等异常部分。

2.动脉采血说法正确的是

- A. 多在股静脉穿刺采血
- B. 采血后不必立即送检
- C. 不必与空气隔离
- D. 常在肱动脉处采血。
- E. 采集时间不超过 15 分钟

【正确答案】 E

【答案解析】 动脉采血多在肱动脉穿刺采血，也可用肱动脉或桡动脉采血。采得的血标本必须与空气隔离，立即送检。采集时间不超过 15 分钟，2~8℃冷藏或冰水浴中送检不超过 30 分钟。

3.急性胰腺炎时尿淀粉酶与血淀粉酶间的关系是

- A. 两者同时增高
- B. HU 者持续增高，后者先高后低
- C. 前者增高迟于后者
- D. 前者增高早于后者，且下降缓慢
- E. 前者

【正确答案】 C

【答案解析】 急性胰腺炎时血淀粉酶在起病后 6~12 小时开始升高，48 小时达到高峰，尿淀粉酶 12~24 小时开始升高。

4. 当白细胞和血小板计数下降到什么程度时，应考虑减少放射剂量

- A. 白细胞小于 $6 \times 10^9/L$ ，血小板小于 $100 \times 10^9/L$
- B. 白细胞小于 $5 \times 10^9/L$ ，血小板小于 $100 \times 10^9/L$
- C. 白细胞小于 $4 \times 10^9/L$ ，血小板小于 $100 \times 10^9/L$
- D. 白细胞小于 $3 \times 10^9/L$ ，血小板小于 $100 \times 10^9/L$
- E. 白细胞小于 $2 \times 10^9/L$ ，血小板小于 $100 \times 10^9/L$

【正确答案】 C

【答案解析】 放疗中白细胞 $4 \times 10^9/L$ 、血小板 $100 \times 10^9/L$ 为警戒数，低于此数时，应考虑减少放射剂量。耳针、维生素 B₆、利血生、鲨肝醇、肌苷酸、花生衣糖浆等均有防治作用；白细胞低于 $3 \times 10^9/L$ 时，应暂停治疗，并用抗生素，辅以输鲜血。

5. 中性粒细胞减少症是指粒细胞计数绝对值低于

- A. $0.5 \times 10^9/L$
- B. $1 \times 10^9/L$
- C. $1.5 \times 10^9/L$
- D. $2 \times 10^9/L$
- E. $2.5 \times 10^9/L$

【正确答案】 D

【答案解析】 中性粒细胞的绝对值随年龄而异，在足月新生儿为 $8 \times 10^9/L$ ，早产儿为 $6 \times 10^9/L$ ，生后 1~2 月低限为 $2.5 \times 10^9/L$ ，至 1 周岁其正常低限为 $1.5 \times 10^9/L$ ，此数值直至成人期皆作为正常的低限。成人及儿童的绝对值低于 $2.0 \times 10^9/L$ ，即可诊断为中性粒细胞减少症。

6. 下列哪项不是血小板在止血中具有的功能

- A. 血块收缩功能
- B. 聚集功能

- C. 黏附功能
- D. 释放功能
- E. 活化XII因子，启动内源凝血途径

【正确答案】 E

【答案解析】 血小板在止血中不具有活化XII因子，启动内源凝血途径的功能。

7.下列哪项关于恶性肿瘤发生、发展的描述是错误的

- A. 肿瘤是一种基因病
- B. 累计癌基因的改变
- C. 单个基因改变即可引起细胞恶性转化
- D. 累计肿瘤抑制基因的改变
- E. 累计 DNA 修复基因的改变

【正确答案】 C

【答案解析】 肿瘤在本质上是基因病。各种环境和遗传致癌因素以协同或序贯的方式引起DNA 损害，从而激活原癌基因和（或）灭活肿瘤抑制基因，加上凋亡调节基因和（或）修复基因的改变，继而引起表达水平的异常，使靶细胞发生转化。被转化的细胞呈克隆性的增生，经过一个漫长、多阶段的演进过程，选择性地形成具有不同特点的亚克隆（异质化），从而获得浸润和转移的能力（恶性转化）。

8.高千伏摄影采用多少 kV 以上管电压

- A. 80
- B. 90
- C. 100
- D. 110
- E. 120

【正确答案】 E

【答案解析】 高千伏摄影是用 120kV 以上的管电压产生的能量较大的 X 线，获得在较小密度值范围内显示层次丰富的 X 线照片影像的一种摄影方法。

9.游离性胸腔积液在胸部 X 线平片上可见到，一般体积应为

- A. 20ml
- B. 50ml
- C. 100ml
- D. 200ml
- E. 300ml

【正确答案】 E

【答案解析】 少量游离性胸腔积液（约 300ml）在后前位 X 线平片上可见患侧肋膈角变钝。

10.支气管扩张的最佳检查方法是

- A. 高分辨 CT
- B. 透视
- C. X 线平片
- D. 螺旋 CT
- E. MRI

【正确答案】 A

【答案解析】 高分辨率 CT 可提高 CT 图像的空间分辨力，能更清楚显示支扩病灶。

11.扁平疣皮疹如经搔抓可沿抓痕呈串珠状排列，称

- A. 皮肤划痕征
- B. 同形反应
- C. 尼氏征
- D. Auspitz 征
- E. Gottron 征

【正确答案】 B

【答案解析】 扁平疣皮疹如经搔抓可沿抓痕呈串珠状排列，称同形反应。

12.关于银屑病的叙述，不正确的是

- A. 好发于四肢伸侧

- B. 肘膝对称发生
- C. 皮疹特点为银白色鳞屑、薄膜现象、点状出血
- D. 病程慢性
- E. 多为冬轻夏重

【正确答案】 E

【答案解析】 银屑病多慢性病程，易复发，有一定的季节性，多数患者冬重夏轻。

13. 下列哪项不是银屑病的分型

- A. 关节型银屑病
- B. 脓疱型银屑病
- C. 红皮病型银屑病
- D. 寻常型银屑病
- E. 全身型银屑病

【正确答案】 E

【答案解析】 根据银屑病的临床特征，可分为寻常型银屑病、关节炎型银屑病、脓疱型及红皮病型银屑病，因此本题选择答案 E。

14. 谵妄的主要特征是

- A. 幻觉
- B. 错觉
- C. 意识障碍
- D. 注意涣散
- E. 思维散漫

【正确答案】 C

【答案解析】 谵妄综合征：是一组表现为广泛的认知障碍，尤以意识障碍为主要特征的综合征。

15. 妄想性障碍的临床特征是

- A. 可以出现幻觉

- B. 妄想的内容多为片断的，非系统的
- C. 情感淡漠症状与妄想相伴随
- D. 以系统的妄想为突出特征
- E. 意志活动明显减退

【正确答案】 D

【答案解析】 妄想性障碍是以系统的妄想为突出特征。

16. 下列哪种症状属于感觉障碍

- A. 假性幻觉
- B. 幻想性错觉
- C. 视幻觉
- D. 内感性幻觉
- E. 听力减退

【正确答案】 D

【答案解析】 感觉是客观刺激作用于感觉器官所产生的对事物个别属性的反应，感觉障碍包括感觉过敏、感觉减退及内感性不适。

17. 哪种药物只引起精神依赖而不引起躯体依赖

- A. 酒精
- B. 氯丙嗪
- C. 巴比妥
- D. 尼古丁
- E. 眠尔通

【正确答案】 D

【答案解析】 尼古丁的依赖性主要是精神依赖，即停止吸烟后产生精神、心理上的一种渴求。

18. 睡眠障碍在神经症患者中极为常见，此类患者最多见的主诉是

- A. 早醒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686203144200010141>