2023-24年贵州省兴仁县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库【夺冠系列】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.可用于降低眼压的药物是()

A：卡替洛尔

B：阿托品

C：利福平

D：左氧氟沙星

答案：A

2.患者，女，41岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日6～8次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞8～10/HP，红细胞3～5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2片，口服，3次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2次/日。

A：肾功能

B：尿量

C：电解质

D：肝功能

答案：C

3.一般剂量长期疗法

A：变态反应性疾病

B：顽固性支气管哮喘

C：中毒性感染和休克

D：湿疹

答案：B

4.（2016年真题）治疗绦虫病的首选药品是

A：伯氨喹

B：哌嗪

C：吡喹酮

D：伊维菌素

答案：C

5.（2020年真题）急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

A：环磷酰胺

B：曲妥珠单抗

C：长春新碱

D：甲氨蝶呤

答案：C

6.与顺铂合用，致高尿酸血症的药物是

A：甲氨蝶呤

B：苯海拉明

C：丙磺舒

D：呋塞米

答案：C

7.（2019年真题）患者，女，52岁，因“闭经1年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日1次，每次1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日1次，每次2mg。

A: 泌尿系统感染

B: 血脂异常

C: 血栓性静脉炎

D: 骨质疏松症

答案：C

8.（2020年真题）抗血小板药西洛他唑属于

A: 二磷酸腺苷P2Y12受体阻断剂

B: 整合素受体阻断剂

C: 维生素K拮抗剂

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：D

9.金刚烷胺和美金刚合用

A: 增加锥体外系不良反应的风险

B: 可增加抗胆碱不良反应的危险

C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

D: 增加肾毒性

答案：C

10.分解痰液中的黏液成分如黏多糖和黏蛋白，使黏痰液化，痰液黏度降低而易于咳出的祛痰药是

A: 氯化铵

B: 氨溴索

C：碘化钾

D：表面活性剂

答案：B

11.治疗银屑病药主要作用不包括

A：恢复其正常分化状态

B：改善表皮细胞增殖速率

C：促进细胞有丝分裂

D：作用于皮肤表皮细胞

答案：C

12.大剂量碘剂

A：抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

B：使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

C：使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

D：对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

答案：B

13.（2018年真题）关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法,正确的是（）

A：孟鲁司特钠起效快,适用于哮喘急性发作

B：孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗

C：12岁以下儿童禁用孟鲁司特钠

D：孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多

答案：D

14.下列硝酸酯类药物起效最快的是

A：戊四醇酯

B：硝酸甘油

C：单硝酸异山梨酯

D: 硝酸异山梨酯

答案：B

15.关于枸橼酸铋钾用药注意事项的说法，错误的是

A: 服药期间口中可能带有氨味并可使舌苔及大便灰黑色

B: 如有服用左甲状腺素，需间隔2小时服用

C: 妊娠期妇女、肾功能不全者禁用

D: 为了更好地保护胃黏膜，可与牛奶同服

答案：D

16.西咪替丁的禁忌证是

A: 应激性溃疡

B: 卓-艾综合征

C: 胃食管反流病

D: 急性胰腺炎

答案：D

17.周某，男，31岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 四氢叶酸

B: 叶酸

C: 硫酸亚铁

D: 维生素B

答案：C

18.仅适用于少数敏感菌，衣原体属，立克次体等不典型病原体所致感染的药物是

A: 四环素

B: 甲硝唑

C: 阿奇霉素

D: 链霉素

答案：A

19.服用后可能导致口中有氨味，舌苔和大便呈灰黑色的药物是

A: 枸橼酸铋钾

B: 西咪替丁

C: 硫糖铝

D: 奥美拉唑

答案：A

20.在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是

A: 罗格列酮

B: 吡格列酮

C: 二甲双胍

D: 达格列净

答案：C

21.抗酸作用较强、快而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多

A: 碳酸钙

B: 三硅酸镁

C: 氢氧化铝

D: 氢氧化镁

答案：A

22.在妊娠期，尤其是妊娠末期或分娩期不宜应用，易发生"灰婴综合征"的药物是()

A：四环素

B：多西环素

C：青霉素

D：氯霉素

答案：D

23.可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A：阿昔洛韦

B：金刚烷胺

C：恩替卡韦

D：更昔洛韦

答案：C

24.下述不属于抗血小板类药物的是

A：非特异性纤溶酶原激活剂

B：血栓素A2（TXA2）抑制剂

C：二磷酸腺苷P2Y12受体激动剂

D：磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

25.抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

A：放线菌素D

B：环磷酰胺

C：阿霉素

D：丝裂霉素

答案：A

26.（2015年真题）通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是（）。

A: 青蒿素

B: 哌嗪

C: 氯喹

D: 噻嘧啶

答案：B

27.患者，女，46岁。以"口角歪斜3天"之主诉入院。3天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 佝偻病

B: 骨质疏松

C: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

D: 骨发育不全

答案：C

28.使用后可出现口腔苦味

A: 氯霉素

B: 更昔洛韦

C: 四环素可的松

D: 利巴韦林

答案：A

29.关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法,正确的是()

A: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多

B: 12岁以下儿童禁用孟鲁司特钠

C: 孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗

D: 孟鲁司特钠起效快,适用于哮喘急性发作

答案：A

30.氯霉素的抗菌作用原理是

A: 抑制DNA回旋酶

B: 抑制蛋白质合成

C: 干扰叶酸合成

D: 形成NAD的同系物，抑制结核菌生长

答案：B

31.对a受体和β受体均有强大的激动作用的是

A: 多巴胺

B: 肾上腺素

C: 可乐定

D: 去甲肾上腺素

答案：B

32.用于较严重的频繁干咳，极量一次100mg的药物是

A: 右美沙芬

B: 地塞米松

C: 可待因

D: 苯丙哌林

答案：C

33.（2016年真题）患者，女，55岁，临床诊断为2型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A: 餐时

B: 餐后半小时

C：餐前半小时

D：餐后1小时

答案：A

34.可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

A：阿托普利

B：硝普钠

C：氨氯地平

D：阿利克仑（阿利吉仑）

答案：B

35.患者女,32岁,孕2周既往有癫痫病史长期服用卡马西平治疗为防止引起新生儿出血,该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

A：维生素D

B：维生素B12

C：叶酸

D：维生素K

答案：D

36.属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是

A：阿那曲唑

B：丙酸睾酮

C：炔雌醇

D：他莫昔芬

答案：A

37.可促进白细胞增生的药物是

A：叶酸

B：红细胞生成素

C：维生素B

D：粒细胞集落刺激因子

答案：D

38.与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A：右雷佐生月德

B：柔红霉素

C：甲氨蝶呤

D：阿糖胞苷

答案：B

39.甲氨蝶呤、培美曲塞属于()

A：DNA多聚酶抑制剂

B：二氢叶酸还原酶抑制剂

C：胸腺核苷合成酶抑制剂

D：核苷酸还原酶抑制剂

答案：B

40.（2016年真题）鼻减充血药所致的典型不良反应是

A：血压升高

B：共济失调

C：心率减慢

D：血管舒张

答案：A

41.可抑制维生素K环氧化酶活性的抗凝血药是

A：达比加群酯

B：氨甲环酸

C：华法林

D：依诺肝素

答案：C

42.关于替加环素的使用，错误的是

A：8岁以下儿童禁用替加环素

B：替加环素抑制CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6和3A4介导的药物代谢

C：肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整

D：替加环素是P—gp的底物

答案：B

43.下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A：用药期间应监测肝肾功能

B：用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

C：与传统化疗药存在交叉耐药

D：常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

答案：C

44.抑制叶酸合成的抗癌药物是

A：顺铂

B：阿糖胞苷

C：甲氨蝶呤

D：环磷酰胺

答案：C

45.利福平

A：禁用于18岁以下儿童及青少年
B：禁用于8岁以下儿童
C：禁用于早产儿、新生儿
D：禁用于胆道阻塞患者
答案：D

46.不溶于水，微溶于有机溶剂的是
A：依托泊苷
B：替尼泊苷
C：博来霉素
D：羟喜树碱
答案：D

47.对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是
A：吸入性糖皮质激素+长效 β2受体激动剂
B：长效 β2受体激动剂+长效M胆碱受体阻断剂
C：吸入性糖皮质激素+短效M胆碱受体阻断剂
D：长效M胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂
答案：A

48.可单独用于轻度、早期高血压的是
A：乙酰唑胺
B：氢氯噻嗪
C：呋塞米
D：阿米洛利
答案：B

49.对磺胺类药物有严重过敏史的患者可选择的利尿剂是（）

A：布美他尼

B：依他尼酸

C：托拉塞米

D：呋塞米

答案：B

50.不宜口服给药的药物是

A：洛伐他汀

B：硝酸甘油

C：普萘洛尔

D：硝苯地平

答案：B

51.毒性较大，尤其对第Ⅷ对脑神经和肾损害严重的药物是

A：利福平

B：异烟肼

C：对氨基水杨酸

D：卡那霉素

答案：D

52.需要嚼碎服用的药品是

A：胰酶肠溶片

B：泮托拉唑肠溶片

C：乳酸菌素片

D：胶体果胶铋胶囊

答案：C

53.属于GLP-1受体激动剂的是()。

A：二甲双胍
B：艾塞那肽
C：阿卡波糖
D：那格列奈
答案：B

54.口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是
A：喷昔洛韦
B：泛昔洛韦
C：昔多福韦
D：伐昔洛韦
答案：D

55.干扰核酸生物合成的药物是()
A：氟尿嘧啶
B：顺铂
C：高三尖杉酯碱
D：多柔比星
答案：A

56.对肾功能影响较小的抗高血压药是
A：肼屈嗪
B：胍乙啶
C：卡托普利
D：利血平
答案：A

57.氯霉素最严重的不良反应是

A: 肝脏损害

B: 胃肠道反应

C: 抑制骨髓造血功能

D: 二重感染

答案：C

58.西沙必利的典型不良反应是

A: 肝肾功能损害

B: 嗜睡、倦怠等锥体外系反应

C: Q-T间期延长

D: 恶心、呕吐

答案：C

59.患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38．8℃，R21次，BP110／70mmHg，HR110次／分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞13．4×109／L，中性粒细胞82．1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0．59，每6小时一次。

A: 氟康唑抑制卡马西平代谢

B: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖

C: 氟康唑可使华法林代谢加快

D: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿

答案：C

60.以下哪种心律失常禁用强心苷

A: 室上性心动过速

B：心房扑动

C：室性心动过速

D：心房颤动

答案：C

61.有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

A：枸橼酸铋钾

B：碳酸钙

C：莫沙必利

D：奥关拉唑

答案：C

62.大剂量对纯合子家族性高胆固醇血症有效的他汀类调血脂药是

A：阿伐他汀

B：藻酸双酯钠

C：普伐他汀

D：氟伐他汀

答案：A

63.伊伐布雷定发挥作用特异性针对

A：心房传导

B：心室传导

C：房室传导

D：窦房结

答案：D

64.治疗绝经后妇女的骨质疏松症可选用()

A：依降钙素

B：阿法骨化醇

C：葡萄糖酸钙

D：阿仑膦酸钠

答案：D

65.为光学异构体的氟喹诺酮类药物是()

A：磺胺嘧啶

B：呋喃妥因

C：左氧氟沙星

D：氯霉素

答案：C

66.防止急性深静脉血栓形成的药物是

A：达肝素钠

B：维生素K1

C：香豆素类

D：维生素B12

答案：A

67.可减少妊娠子宫兴奋，用于治疗先兆性流产和习惯性流产的药物是

A：孕激素

B：长效避孕药

C：雌激素

D：短效口服避孕药

答案：A

68.主要用于口服给药的广谱青霉素类是

A：阿莫西林

B：头孢噻肟

C：头孢哌酮

D：庆大霉素

答案：A

69.（2016年真题）可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是

A：特比萘芬

B：氟胞嘧啶

C：伏立康唑

D：两性霉素B

答案：A

70.长期大量服用维生素K

A：疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

B：视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

C：视物模糊、疲乏、乳腺肿大

D：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：C

71.服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是（）

A：吡嗪酰胺

B：利福平

C：乙胺丁醇

D：链霉素

答案：B

72.属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的药品是

A：他莫昔芬

B：托瑞米芬

C：氟他胺

D：乙烯雌酚

答案：C

73.呋塞米的利尿作用机制主要是

A：抑制碳酸酐酶

B：抑制Na+-H+交换

C：特异性阻滞Na+通道

D：抑制Na+-K+-2Cl-同向转运子

答案：D

74.（2016年真题）属于延长动作电位时程的抗心律失常药是

A：利多卡因

B：硝酸甘油

C：美托洛尔

D：索他洛尔

答案：D

75.不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

A：酚甘油滴耳液

B：羟甲唑啉滴鼻液

C：麻黄碱滴鼻液

D：赛洛唑啉滴鼻液

答案：C

76.下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

A：依托泊苷

B：奥沙利铂

C：长春新碱

D：替尼泊苷

答案：A

77.主要经胆汁排泄的抗生素是

A：头孢哌酮

B：美洛西林

C：青霉素

D：头孢甲肟

答案：A

78.可增加肝毒性的药物是

A：β 受体阻断剂

B：甲氨蝶呤

C：利福平

D：阿糖胞苷

答案：C

79.目前治疗肺孢子菌病首选的药物是

A：卡泊芬净

B：复方磺胺甲噁唑

C：特比萘芬

D：氨曲南

答案：B

80.（2020年真题）患者，男，65岁。高血压病史8年，血压峰值180/110mmHg，冠心病史5年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

A：吲达帕胺

B：氨氯地平

C：普萘洛尔

D：赖诺普利

答案：D

81.属于抗雌激素类的抗肿瘤药是

A：炔雌醇

B：氟他胺

C：他莫昔芬

D：阿那曲唑

答案：C

82.酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是()

A：痤疮样皮疹

B：心肌损伤

C：骨髓抑制

D：血压升高

答案：A

83.头孢菌素类药的主要作用靶点是

A：核糖体的30S亚基

B：核糖体的50S亚基

C：细胞内膜PBP

D: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案：C

84.正在使用氯吡格雷的患者如需同时使用质子泵抑制剂，应选择()

A: 兰索拉唑

B: 奥美拉唑

C: 泮托拉唑

D: 埃索美拉唑

答案：C

85.长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

A: 动脉粥样硬化

B: 血小板减少症

C: 应激性大出血

D: 骨质疏松性骨折

答案：D

86.成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日25～50μg，每2周增加

A: 4μg/kg

B: 6μg/kg

C: 25μg

D: 5μg/kg

答案：C

87.代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性()

A: 氟尿嘧啶

B：巯嘌呤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/686215115110011030