

耳鼻喉科题库模拟题+答案

1、筛泡属于

- A、额窦
- B、上颌窦
- C、蝶窦
- D、筛窦
- E、海绵窦

答案：D

2、膜迷路

- A、为内耳的血供系统
- B、来源于内胚层
- C、内含内淋巴液
- D、来源于外胚层和中胚层
- E、内为骨迷路

答案：C

3、患者女性，54岁，主诉反复发作眩晕、耳胀满感、耳鸣，伴波动性听力下降。最可能的诊断是

- A、迷路炎
- B、梅尼埃病
- C、良性体位性眩晕
- D、血管性偏头痛
- E、中耳炎

答案：B

4、患儿女，2岁，左鼻塞、涕中带血伴恶臭10天。诊断应首先考虑

- A、左鼻腔异物
- B、左鼻窦炎
- C、左上颌窦癌
- D、左鼻咽癌
- E、左鼻腔癌

答案：A

5、急性鼻炎的恢复期可引起

- A、水样鼻漏
- B、黏脓性鼻漏
- C、脓性鼻漏
- D、血性鼻漏

E、干酪样鼻漏

答案：B

6、大量酸性食管腐蚀伤疑有穿孔时可应用的处理方法是

A、碳酸氢钠中和

B、洗胃处理

C、钡剂 X 先检查是否穿孔

D、应用抗生素预防感染

E、类固醇激素防止狭窄

答案：D

7、多发性鼻息肉多来源于

A、中鼻甲

B、中鼻道

C、上颌窦

D、筛窦

E、额窦+上颌窦

答案：D

8、颞肌的下缘止于

A、颞线

B、乳突尖

C、茎突

D、颧突

E、上述都不是

答案：A

9、有关室带的说法，错误的是

A、前端附着会厌的上方

B、后端附着杓状软骨声带突上方

C、外面为黏膜

D、韧带由甲状上韧带和弹性圆锥组成

E、中间有少量肌纤维

答案：A

10、刺激下鼻甲前部引起反射性疼痛的部位是

A、颧部

B、颞部

C、上列牙

D、耳部

E、前额

答案：C

11、鼓索神经多由面神经的哪一段发出

A、鼓室段

B、垂直段

C、鼓室段与垂直段交界处

D、膝状段

E、水平段

答案：B

12、关于外科感染，下列叙述哪项不正确？

A、疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

B、痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓感染

C、急性蜂窝织炎是皮下筋膜下蜂窝组织的化脓性感染

D、甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

E、脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织化脓性感染

答案：B

13、关于硬脑膜外脓肿，错误的是

A、在颅中窝或颅后窝之硬脑膜与软脑膜间形成脓肿

B、耳镜检查时常可见到有明显的搏动性脓液外溢

C、小的脓肿可无症状，有时有轻度的头痛；脓肿较大时有持续性头痛，头位变化时更明显

D、大脓肿可引起颅内压升高征象，当耳内流脓量增大时，头痛可减轻

E、颞骨和脑 CT、MRI 检查可见中耳乳突骨质破坏，硬脑膜区有阴影

答案：A

14、食管第3狭窄距门齿约

A、16cm

B、23cm

C、27cm

D、30cm

E、36cm

答案：C

15、环杓后肌是什么神经支配的

A、喉上神经内支

B、喉返神经前支

C、喉上神经外支

D、喉返神经后支

E、以上都不是

答案：D

16、深Ⅱ度烧伤，若无感染等并发症，通常愈合时间为

A、2~3日

B、1周

C、2周

D、3~4周

E、5周以上

答案：D

17、下列关于喉软骨骨化过程，描述错误的是

A、甲状软骨男性较女性骨化程度明显

B、甲状软骨翼板中央部最后骨化

C、甲状软骨最先骨化的部位是后上角

D、环状软骨骨化有明显的性别差异

E、杓状软骨可完全骨化，一般男性多于女性

答案：D

18、某患者输血100ml后，出现休克、高热、寒战、呼吸困难，经核对发现误输异型血。当前处理措施中，下列哪项不宜？

A、立即停止输血

B、静注5%碳酸氢钠溶液

C、静注20%甘露醇溶液

D、静脉途径给地塞米松

E、立即行血透

答案：E

19、关于乙状窦血栓性静脉炎，错误的是

A、在寒战、高热期如有中耳炎存在时首先应考虑此病

B、应与疟疾、伤寒鉴别，主要依据血液检查

C、打开乙状窦至正常界线，血栓必须取出

D、眼底检查可有Grove试验阳性

E、Tobey-Ayer试验阴性不能排除有血栓

答案：C

20、化学药物烧灼法使用的化学药物正确的是

A、40%硝酸银

B、1%三氯醋酸

- C、4%三氯醋酸
- D、70%硝酸银
- E、50%三氯醋酸

答案：A

21、关于咽鼓管的解剖，错误的是

- A、由骨部和软骨部组成
- B、咽鼓管外1/3为软骨部
- C、骨部和软骨部交界处最窄，称为峡
- D、咽鼓管内径最宽处为鼓室口
- E、咽鼓管自峡部向咽口处逐渐增宽

答案：B

22、下述病名哪一个不是耳廓假性囊肿

- A、耳廓浆液性软骨膜炎
- B、耳廓非化脓性软骨膜炎
- C、耳廓化脓性软骨膜炎
- D、耳廓软骨间积液
- E、耳廓假囊肿

答案：C

23、下列说法错误的是

- A、小脑病变不会影响言语形成
- B、如小儿与外界接触过少，能影响其正常的言语发育
- C、重症肌无力所致言语障碍者无语句结构方面的缺陷
- D、脑脓肿可能会引起言语障碍
- E、不良发音习惯可能导致构音障碍

答案：A

24、鼻中隔矫正手术的适应症包括

- A、鼻中隔偏曲无临床症状者
- B、鼻中隔偏曲特别是高位偏曲影响鼻窦通气引流者
- C、凝血功能障碍导致反复鼻出血者
- D、蝶窦炎引起头痛者
- E、变应性鼻炎导致严重鼻塞者

答案：B

25、甲状软骨没有

- A、甲状软骨上角
- B、甲状软骨翼板

- C、甲状软骨切迹
- D、甲状软骨下角
- E、甲状软骨弓

答案：E

26、三角襞的描述正确的是

- A、位于腭舌弓与腭咽弓相交处
- B、位于扁桃体上端
- C、由腭咽弓向下延伸包绕扁桃体前下部而形成
- D、由腭舌弓向下延伸包绕扁桃体前下部而形成
- E、由腭咽弓向上延伸包绕扁桃体前下部而形成

答案：D

27、感冒后一侧上颌磨牙疼痛，前额部头痛下午较重，同侧面颊部亦感疼痛近3天。考虑

- A、急性额窦炎
- B、急性筛窦炎
- C、急性蝶窦炎
- D、急性上颌窦炎
- E、以上都不是

答案：D

28、关于咽丛描述正确的是

- A、位于咽后壁外膜层内
- B、位于咽侧壁
- C、位于鼻咽顶部
- D、位于喉咽下部
- E、位于咽前壁

答案：A

29、上颌窦窦口开口处是

- A、上颌窦前侧壁
- B、上颌窦后外壁
- C、上颌窦上壁
- D、上颌窦底壁
- E、上颌窦内侧壁

答案：E

30、鼻咽癌累及迷走神经时表现为

- A、头痛，面部麻木

- B、眼球固定，上睑下垂，复视等
- C、软腭固定，咽反射消失
- D、声嘶
- E、舌肌萎缩，伸舌时舌尖偏向患侧

答案：D

31、引起急性扁桃体炎的主要致病菌为

- A、乙型溶血性链球菌
- B、非溶血性链球菌
- C、葡萄球菌
- D、肺炎双球菌
- E、流感病毒

答案：A

32、下鼻甲部分切除术的适应证

- A、下鼻甲前端肥大，后端息肉样变或整个下鼻甲呈桑葚样改变
- B、下鼻甲肥大，影响呼吸功能，经保守治疗无效
- C、下鼻甲骨肥大
- D、鼻中隔偏曲，宽阔侧鼻腔下鼻甲肥大
- E、以上都是

答案：E

33、根据鼻窦炎海口会议分型分期标准，全组鼻窦炎伴多发鼻息肉属于

- A、1型1期
- B、1型2期
- C、1型3期
- D、2型1期
- E、2型3期

答案：E

34、扁桃体切除术后第2天，扁桃体窝处出现一层白膜，应考虑为

- A、术后创面感染
- B、术后正常反应
- C、扁桃体残留
- D、咽缩肌坏死
- E、以上均不正确

答案：B

35、急性喉气管支气管炎时一般不出现

- A、声门上区充血肿胀显著

- B、声门下区充血肿胀显著
- C、喉气管支气管黏膜深度溃疡
- D、严重的混合性呼吸困难
- E、轻微气管拍击声

答案：A

36、半面痉挛晚期可出现

- A、眼睑痉挛
- B、口周肌肉抽动
- C、面肌肌力显著减弱，甚至出现永久性面瘫
- D、累及颈及肩部肌群
- E、发作时伴有轻微头痛或面部酸痛感

答案：C

37、鼻腔恶性肿瘤以上皮源性癌肿为主，其中未分化癌和鳞状细胞癌占

- A、10%以上
- B、20%以上
- C、40%以上
- D、80%以上
- E、90%以上

答案：D

38、感音神经性听力损失的病变部位一般可出现在

- A、外耳道
- B、鼓膜
- C、听骨链
- D、中耳
- E、耳蜗

答案：E

39、治疗鼻前庭炎时不能长期应用黄降汞软膏的原因是

- A、产生耐药
- B、可引起慢性汞中毒
- C、引起皮肤色素沉着
- D、对皮肤有刺激作用
- E、以上均不是

答案：B

40、儿童慢性上颌窦炎可行诊断性上颌窦穿刺的年龄为

- A、4岁以上

- B、5 岁以上
- C、6 岁以上
- D、7 岁以上
- E、8 岁以上

答案：C

41、患者男，36 岁，患者长期感耳痒不适，不时有少量分泌物流出。外耳道皮肤多增厚，有痂皮附着，撕脱后外耳道皮肤呈渗血状，外耳道内有少量稠厚的分泌物，有白色豆渣状分泌物堆积在外耳道深部。最可能的诊断是

- A、外耳道疔
- B、坏死性外耳道炎
- C、慢性化脓性中耳炎
- D、慢性乳突炎
- E、慢性外耳道炎

答案：E

42、扁桃体手术适应证正确的是

- A、慢性扁桃体炎反复发作或多次并发扁桃体周围脓肿者
- B、单纯扁桃体肥大
- C、扁桃体恶性淋巴瘤
- D、慢性扁桃体炎合并炎症风湿性心脏病活动期
- E、以上都正确

答案：A

43、关于鼻腔温度的变化，下列哪种情况是错的

- A、体表受凉后鼻腔温度下降
- B、饮酒或感冒后鼻腔温度升高
- C、鼻腔有炎症时鼻腔温度下降
- D、上颌窦有炎症侧鼻腔温度升高
- E、以上都对

答案：C

44、喉阻塞患者来不及做气管切开术时，可紧急切开

- A、甲状舌骨膜
- B、环气管韧带
- C、甲状会厌韧带
- D、环甲膜
- E、舌会厌韧带

答案：D

45、鼻咽纤维血管瘤侵入翼腭窝者手术治疗可采用

- A、硬腭进路
- B、鼻侧切开进路
- C、颅颌联合进路
- D、硬腭进路加颊侧切口
- E、颈侧进路

答案：A

46、老年性聋的描述正确的是

- A、多为 60 岁以上老年人
- B、双耳听力渐进性下降
- C、噪声环境言语辨别力下降明显
- D、多因螺旋神经节细胞萎缩引起
- E、以上都是

答案：E

47、中耳内外径最宽的部位是

- A、上鼓室
- B、下鼓室
- C、中鼓室
- D、后上鼓室
- E、后鼓室

答案：A

48、麻醉时最容易和最先受到影响的重要功能是

- A、心功能
- B、肾脏功能
- C、呼吸功能
- D、肝脏功能
- E、免疫功能

答案：C

49、患者扁桃体剥离术后 3 日，咽痛加剧，体温 38.5℃，检查见扁桃体窝白膜生长不均，腭弓肿胀。应首先考虑

- A、创面感染
- B、正常术后反应
- C、败血症
- D、咽旁脓肿
- E、以上均不是

答案：A

50、慢性肥厚性鼻炎鼻腔检查可见

- A、鼻粘膜呈苍白色，明显水肿
- B、粘膜肥厚，暗红色，表面不平，呈桑椹状，鼻甲骨肥大
- C、粘膜肿胀，暗红色，表面光滑
- D、鼻和鼻道内多脓涕，豆腐渣样物堆积，有恶臭
- E、粘膜肥厚，暗红色，表面不平，呈桑椹状，鼻甲骨缩小

答案：B

51、一患者咽痛数日，现一侧咽痛加剧，讲话含糊，吞咽及张口困难，最可能的诊断是

- A、急性咽炎
- B、急性扁桃体炎
- C、扁桃体周围脓肿
- D、急性喉炎
- E、急性会厌炎

答案：C

52、在慢性化脓性中耳炎的诊断中，哪一项是必不可缺的检查

- A、耳镜
- B、耳部 X 线检查
- C、听力
- D、咽鼓管吹张
- E、平衡功能

答案：A

53、药物性鼻炎发生的主要机制是

- A、鼻腔滴用的药物中含有腐蚀剂
- B、鼻腔黏膜对药物产生 I 型变态反应
- C、鼻腔黏膜对药物产生排斥反应
- D、血管收缩剂使鼻黏膜血管出现反跳性扩张
- E、药物中含有糖皮质激素

答案：D

54、关于鼻息肉的病理变化，描述错误的是

- A、高度水肿的疏松结缔组织
- B、息肉组织中的血管和腺体无神经支配
- C、息肉组织中的血管和腺体有神经支配
- D、息肉组织中腺体扩张

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/687020016133006036>