

新《双眼视觉学》考试复习题库(含答案)

一、单项选择题

1. 异常双眼视觉不包括()

- A、 复视
- B、 混淆视
- C、 同步视
- D、 克制

答案: C

2. AC/A 计算: 假如测量过程中患者瞳距 60E,近距离为内隐斜 7 棱镜度, 远距为外隐斜 3 棱镜度, 其 AC/A 为()

- A、 2
- B、 4
- C、 6
- D、 10

答案: D

3. 双眼视功能不包括()

- A、 同步视
- B、 融像
- C、 立体视
- D、 隐斜

4. 调整灵活度是测量评估调整反应的()

A、耐力和动力

B、耐力和反应力

C、动力和反应力

D、 以上都不对

答案: A

5. 调整需求的单位是()

A、米角

B、A/D

C、屈光度

D、 厘米

答案: C

6. 聚散功能训练项目不包括()

A、3点卡

B、偏振片立体图

C、聚散球

D、 远近视力表

答案: D

7. 患者看远、看近均内斜且斜视度相等是 0

A、集合过度

B、集合局限性

C、单纯内斜

D、散开过度

答案：C

8. 负相对调整正常值为 0

A、 -2.00 ± 0.50

B、 $+2.00 \pm 0.50$

C、 -1.00 ± 0.50

D、 $+1.00 \pm 0.50$

答案：B

9. 患者 AC/A 值正常，看远看近均外斜，且度数相等()

A、辐辏局限性

B、散开局限性

C、单纯性外斜

D、单纯性内斜

答案：C

10. 跟随运动的速度慢于扫视运动，约为()

A、 $50^\circ/\text{s}$

B、 $100^\circ/\text{s}$

C、 $150^\circ/\text{s}$

D、 $200^\circ/\text{s}$

答案：B

11. 刺激跟随运动的原因是()

A、声响

B、 运动物体

C、 运动感

D、 想象运动

答案： B

12. 调整功能异常类型不包括()

A、 眼运动障碍

B、 调整局限性

C、 调整过度

D、 调整疲劳

答案： A

13. 使用“跳跃集合”测量时，正常者可达()

A、 每分 10 周

B、 每分 20 周

C、 每分 30 周

D、 每分 40 周

答案： C

14. 内斜视临床中用()判断其眼位水平状况

A、 Sheard 准则

B、 1:1 准则

C、 Perci va I 准则

D、 her i ng 准则

15. 患者 AC/A 值高，看远正位，看近内斜 0

A、散开局限性

B、辐辏局限性

C、辐辏过度

D、散开过度

答案：C

16. 调整功能训练中的推进训练适应症是()

A、调整过度

B、调整局限性

C、集合过度

D、散开过度

答案：B

17. 相对眼镜放大率等于屈光不正的放大率与眼镜放大率的()

A、和

B、差

C、积

D、商

答案：C

18. 患者 AC/A 值高，看远看近均内斜，看近不小于看远()

A、辐辏过度

B、散开局限性

C、单纯性外斜

D、单纯性内斜

答案：A

19. 扫视运动特点是()

A、速度快

B、伴有克制

C、速度慢

D、精确性低

答案：A

20. Worth4 点试验确定克制范围先在()

A、22cm 处进行

B、33cm 处进行

C、44cm 处进行

D、55cm 处进行

答案：B

21. 有效缓和球镜公式 $S=P/A$,其中 P 代表 0

A、球镜

B、棱镜度

C、柱镜

D、AC/A

答案：B

22. 引起扫视运动的刺激不包括()

A、视觉目的

- B、 听觉
- C、 本体感觉
- D、 立体视觉

答案： D

23. 调整反应测量措施有()

- A、 动态检影法
- B、 馬氏杆
- C、 遮盖试验
- D、 角膜映光法

答案： A

24. 有关 Worth 四点灯检查法說法錯誤的是()

- A、 重要是检测克制的措施
- B、 可检测中心凹的克制
- C、 麻痹性斜视時看到五个光孔
- D、 双眼视功能正常時可以看到两个紅光孔或三个绿光孔

答案： D

25. 调整功能异常类型不包括()

- A、 调整局限性
- B、 调整过度
- C、 调整敏捷度异常
- D、 散开过度

答案： D

26. 调整功能测量不包括()

- A、调整幅度
- B、调整灵活度
- C、推进幅度
- D、相对调整

答案：C

27. 某人外隐斜為 9 棱镜度，按 sheard 准则规定其 B0 融像储备至少為()

- A、 6
- B、 12
- C、 18
- D、 20

答案：C

28. 当用 WORTH 四点测量時，患者显示看 5 点阐明()

- A、 正常
- B、单眼克制
- C、复视
- D、 以上都不对

答案：C

29. 计算法 AC/A,已知瞳距 64s,近距离 40cm 处测得 exo5A, 5 米处测得 eso1

△, 其 AC/A 為()

- A、 2
- B、 4

C、6

D、8

答案：B

30. 低 AC/A,看远正常，看近有明显外斜视，其状况為()

A、集合局限性

B、集合过度

C、散开局限性

D、散开过度

答案：A

31. AC/A 计算：假如测量过程中患者瞳距 60mm,近距离為内隐斜 5 棱镜度，远距

為外隐斜 3 棱镜度，其 AC/A 約為()

A、2

B、4

C、9

D、10

答案：C

32. 集合局限性的特点是()

A、看远内隐斜

B、看近正位

C、融像性聚散幅度减少

D、AC/A 比率低

33. NLP 為 B14Zi,加上-1.00 后 NLP 為 B11 Δ , AC/A 為()

A、 1

B、 3

C、 5

D、 7

答案: B

34. 扫视运动的检查测试中,常出現的問題不包括下列哪一项()

A、 扫视不精确

B、 多种间断扫视

C、 运动过量出現面部运动

D、 转换快

答案: D

35. 调整训练時所使用的反转拍為()

A、 $\pm 1.00D$

B、 $\pm 1.50D$

C、 $\pm 2.00D$

D、 $\pm 2.50D$

答案: C

36. 下列与跟随运动有关的是()

A、 运动物体

B、 声响

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/687044044050010051>