学习攻略—收藏

助考锦囊

系统复习资料汇编

考试复习重点推荐资料

百炼成金模拟考试汇编

阶段复习重点难点梳理

适应性全真模拟考试卷

考前高效率过关手册集

高效率刷题好资料分享

学霸上岸重点笔记总结

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

助：逢考必胜 高分稳过

2023 年执业药师西药药综模拟试卷

一、最佳选择题

1.利用药物代谢动力学、药物效应动力学或药物基因组学分析技术，进行治疗药物监测的药学服务属于

A.药物重整

B.循证医学

C.个体化药物治疗

D.药物警戒

E.药物临床评价

2.下列药物服用方法正确的是

A.呋塞米，睡前服用

B.多潘立酮，餐前服用

C.奥利司他，空腹服用

D.阿卡波糖，餐后服用

E.阿仑膦酸钠，餐后服用

3.患者，男，76 岁，出现记忆力障碍，易激惹、易情绪改变，由家人陪同就医。功能影像学提示脑内 Aβ 沉积，简易智能状态检查（MMSE）23 分，初步确诊为早期阿尔茨海默病。给予多奈哌齐、美金刚联合治疗。

有关患者的用药指导和教育，错误的说法是

A.服用多奈哌齐前查心电图，注意血压和心律、心率

B.服用美金刚前评估肾功能，CCr<30ml/min 时，美金刚的最大剂量 5mg q12h

C.症状一旦改善或稳定应即刻停服多奈哌齐，避免长期用药造成消化道溃疡

D.饮食方面，宜补充含谷氨酸丰富食物，如味精

E.若出现 1 次漏服，请尽快补服；但若接近下次服药时间，则无需补服

4.配伍禁忌的发生受到很多因素的影响，下列有关于该影响因素说法正确的是

A.温度越高，药物越稳定

B.混合时间越长，越容易出现配伍禁忌

C.浓度越低，稳定性越差

D.对于中药注射剂来说制剂辅料不会导致配伍禁忌的产生

E.与不同的溶媒混合导致完全相同的结果

5.关于药物在肝功能不全患者药动学和药效学变化的说法，错误的是

A.主要在肝内代谢清除的药物，半衰期延长

B.需要肝脏生物转化的前体药物，药效降低

C.蛋白结合率高的药物，血中游离药物浓度增加

D.首关消除明显的药物，药理作用维持时间缩短

E.血胆汁酸和胆红素升高，血浆蛋白与药物结合的能力下降

6.关于哺乳期妇女用药安全的说法，不正确的是

A.口服避孕药可分泌至乳汁中，降低乳汁中吡哆醇含量，哺乳期应禁用

B.依那普利可分泌至乳汁中，因含巯基可引起乳儿骨髓抑制，哺乳期应避免使用

C.头孢呋辛不易分泌至乳汁中，哺乳期宜使用

D.阿奇霉素大多数分泌至乳汁中，哺乳期不宜使用

E.青霉素 G 不易分泌至乳汁中，哺乳期宜使用

7.药师在指导合理用药时应正确的交代如何使用不同剂型的药物，下列交代的内容错误的是

A.气雾剂使用步骤：排痰、摇匀、呼气、吸气（同时按压阀门）、屏气、漱口 B.甲硝唑片，可以口服，也可以阴道给药

C.美托洛尔缓释片（

47.5mg）可根据临床需求掰开或嚼碎服用

D.泡腾片需溶解于温开水后服用

E.甲硝唑栓剂可以变型后冷藏保存再使用

8.下列有关于合理用药正确的是

A.普通感冒患者使用抗生素

B.青光眼患者使用扑尔敏

C.辛伐他汀与吉非贝齐和烟酸同时服用提高疗效

D.氯化钾不需要稀释可直接静脉注射

E.蒙脱石由于有吸附作用不建议与其他药物同服

9.下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是

A.老年人和酗酒者为高危人群

B.恶性贫血者需要终生维持治疗

C. 可静脉滴注维素 B12100～500 μ gqd

D. 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗

E. 在不能确定只是单纯叶酸缺乏引起的贫血时，叶酸应联合维生素 B12 治疗

10. 患者，女，20 岁，因咳嗽服用“阿莫西林”后出现皮疹，初始于颈部，为散在小丘疹，伴瘙痒，无其他不适，停药后皮疹消失。没有再次使用。该病例用药与不良反应因果关系评价结果是

A. 肯定

B. 很可能

C. 可能

D. 可能无关

E. 无法评价

11. 非霍奇金淋巴瘤的 CHOP 方案中不包括的治疗药物是

A. 环磷酰胺

B. 阿霉素

C. 利妥昔单抗

D. 长春新碱

E. 泼尼松

12. 患者，女，55 岁，诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法与用量正确的是

A. 7.5mg qd

B. 7.5mg tid

C. 7.5mg qod

D. 7.5mg qw

E. 7.5mg qm

13. 患者女，68 岁，既往有高血压，因水肿复诊，检查：血压 172/96mmHg，尿蛋白大于 1g/24h，血尿酸 416 μmol/L（正常值 180～440 μmol/L），血钾 6.1mmol/L，在已经服用氨氯地平的基础上，应考虑联合应用的抗高血压药品是

A. 螺内酯

B. 依那普利

C. 卡托普利 D. 呋塞米

E. 硝苯地平

14. 患者，女，50 岁，因潮热、盗汗伴脾气暴躁 3 个月，到药店咨询用药。药师追问病史，患者近 3 个月开始出现潮热、盗汗症状，并逐渐加重，由起初的每日发作 2～3 次，至现在的十余次或更多，夜间或应激状态易促发。患者在 2 年前因多发子宫肌瘤行全子宫切除术后，无月经。药师了解情况后考虑患者罹患绝经综合征可能，建议患者去医院确诊。3 日后患者重返药店，告知已确诊为绝经综合征，对于该患者宜推荐的治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/688004075011006104