

肝脏疾病诊疗专项考核试题

一、选择题

1. 关于肝性脑病的发病机制，下列错误的是（） [单选题] r

A. 色氨酸增多

B. 肝脏对酪氨酸的清除发生障碍

C. 肝脏对谷氨酸的清除发生障碍 ✓

D. 血氨增高

E. 脑星形胶质细胞对苯二氮卓（"）类受体表达上调

2. 肝硬化的患者最严重的并发症是（） [单选题] *

A. 食管胃底静脉曲张破裂出血

B. 肝性脑病 ✓

C. 低钾血症

D. 原发性肝癌

E. 自发性腹膜炎

3. 治疗酒精性肝病的关键是（） [单选题] *

A. 营养支持

B. 戒酒 ✓

C. 肝移植

D. 给予保肝药

E. 给予利胆药

4. 下列表现中，符合肝脏解毒功能下降的是（） I 单选题 F

A. 黄疸

B. 食管静脉曲张

C. 氨中毒 V

D. 凝血因子减少

E. 男性手阈发音

5. 门静脉高压症时受影响最早的侧支血管为（） [单选题 r

A. 脐静脉

B. 冠状动脉 V

C. 直肠上静脉

D. 腹膜后静脉

E. 腹壁上静脉

6. 门静脉高压症的交通支不包括（） [单选题 r

A. 白底、食管下端交通支

B. 直肠下端交通支

C. 腹壁交通支

D. 肠系膜血管交通支 ✓

E. 腹膜后交通支

7. 小结节性肝硬化的特征错误的是 () [单选题 T

A. 起病多隐匿

B. 进展较缓慢

C. 多由血吸虫病引起 ✓

。症状不明显

E. 结节大小均匀, 最大不超过 1.0cm

8. 原发性肝癌早期转移途径为 () 【单选题 r

A. 肺外转移

B. 淋巴转移

C. 直接浸润转移

D. 肝内进行转移 ✓

E. 号转移

9. 原发性肝癌的临床特点不正确的是 () [单选题] *

A. 肿块增长迅速, 肝包膜被牵拉引起疼痛

B. 门脉内癌栓可导致门脉高压

U 门脉外癌栓可以产生血管杂音 ✓

D. 癌块侵犯肝门胆管引起黄疸

Ef 中瘤生长缓慢，可以无痛

10 .与原发性肝癌发病最密切的因素是（）【单选题 r

AJff 硬化

B. 病毒性肝炎 V

C. 黄曲霉毒素

D , 饮用水污染

E 高生虫

11 .原发性肝癌按大体形态分型下述哪项不正确（） [单选题)*

A. 巨块型癌直径>10Cm

B. 孤立的直径 42Cm 的癌结节称为微小肝癌

C. 巨块型易发生坏死引起肝破裂

D 结节型易发生癌结节破裂出血 V

E. 弥漫型往往因肝功能衰竭而死亡

12 .原发性肝癌肝外血行转移最常见的部位是（） [单选法广

AJS

Bg

CW

D 肾上殿

E. 胃

13 .原发性肝癌经淋巴转移最常见的部位是（） [单选 s 三 r

A. 锁骨上淋巴结

B. 主动脉旁淋巴结

C. 胰腺旁淋巴结

。 肝门淋巴结 V

E. 脾门淋巴结

14 .引起 S 菌性肝脓肿的主要原因是（） 【单选题 r

B MBg 虫 ✓

U 坏疽性阑尾炎

D 结核感染

E. 开放性肝损伤

15 .肝脓肿的特点正确的是（） 【单选题 r

A. 细菌由干脓肿常为单发，较大

B. 阿米巴肝脓肿起病急，伴寒战、高热

C. 阿米巴肝脓 8 中较少,多为多发性

D 阿米巴肝脓肿脓液为褐色，无臭味 V

E. 阿米巴肝脓肿病人粪便中可找到阿米巴原虫

16 .肝性脑病的诱因不包括 () [单选题 r

A. 消化道出血

B. 高钾性酸中毒 V

U 便秘

D. 低血能

E. 缺氧

17 .最主要产氨场所是 () [单选题]

Aig 脏

B. 肠道 V

C. 肝脏

。 大脑

E. 骨相肌

18 .关于肝昏迷, 下述哪项是错误的 () [单选班/

A. 血中 NH_3 易入 UD 的屏 PS

B. 低钾性碱中毒时 NH_3 易入脑组织

C 肠道 PH 在 6 以下易使 NH_4^+ 变为 NH_3 ✓

D 肠道 PH 在 5 时, NH_3 不易被吸收

和?S 热增加翅的苗性

19 .关于肝性脑病的籍代谢, 下述哪项不正确 () [单选 Sgr

A. 大多数门腔分流术患者血氨及脑脊液中氨含量都增高

B. 据发性肝功检衰伺时血氨往往明显增高 ✓

C. 动脉血和脑脊液中氨含量明显相关

D. 便秘时会引起血氨增高

E. 结肠呈碱性环境时产氨增多

20 .肝昏迷前期最突出的表现是 () [单选 8 分]

A. 表情欣快, 昼睡夜醒

错乱

C. 肌张力增高

D. 行为异常、吐词不清

E. 意识模糊、扑翼震颤 ✓

21 .肝性脑病前亚期的临床表现有 () [多选 8 分]

A. 可有扑理样震颤 ✓

B. 脑电图异常

C. 定向力障碍

D. 腱反射亢进

E. 计算力下降

22 .缓慢发生的肝昏迷其最早出现的症状为 () [单选 8 分]

A. 嗜睡

B. 肝臭

C. 行为异常,欣快 4

。定向力障碍

E. 意识模糊

23 .肝性脑病昏迷期哪项不正确 () [单选题 r

A. 酬

B ^W 抽插

U 扑货样皮戴阳性 V

D , 脑电图异常

E. 反射可消失

24 .肝硬化并发肝肾综合征是 (义单选感] ”

A. 肝硬化失代偿期合并胃小管坏死

B. 肝硬化失代偿期发生亚质血症及少尿等肾功能损害 V

C. 肝硬化晚期合并急性 3 炎

D, 肝硬化代偿期并慢性肾炎

E. 肝硬化失 1 代偿期并慢性胃炎

25 .关于肝硬化自发性腹膜炎, 正确谓 S 述是 () [单选题 F

A. 一般起病急, 伴高热.寒战, 剧烈膜癌, 出现板状腹、反跳痛

B. 致病菌多为金黄色葡萄球菌

C. 易出现顽固性腹腔积液 ✓

D. 治疗时应加强利尿治疗

E. 应进行腹腔积液培养，待培养结果出来后有针对性应用抗生素治疗

26. 反映肝纤维化的血清学指标是 () { 单选题 r

A. 胆固醇

B. 乳酸脱氢酶 (LDH)

C. 谷氨酰转氨酶 (γ-GGT)

D. 透明质酸 (HA) ✓

E. 胆汁酸

27. 对肝硬化有确诊价值的是 () [单选题 r

A. 肝肿大质地偏硬

B. 脾肿大

C. 丙种球蛋白升高

D. 肝穿刺活检有假小叶形成 ✓

E. 食管吞钡 X 线检查有虫蚀样充盈缺损

28. 鉴别肝内胆汁淤滞性黄疸与肝外梗阻性黄疸最确切的方法是 () [单选题 r

A. 尿三胆测定及总胆红素测定

B. 十二指肠镜逆行胆管造影 ✓

C. 碱性磷酸酶测定

D. 氨基比林试岭

E. 谷丙转述 5 测定

29 .肝硬化早期诊断最可完的方法是 () [单选班/

A. 肝功能检直

BB 型超声

UgS 腔镜直视下活检 ✓

D. CT

E. 食管校餐透视

30 .对判断肝硬化患考预后意义不大的指标是 () [单选 Sgr

A. 腹腔积液

B. 清蛋白

U 血尿索氮 ✓

D. 凝血的原时间

E F a酶

31 .肝硬化.腹腔积液治疗。一般不主张采用 () [单选 s 三 r

A. 限制生白饮食

Bd 氏盐饮食

C. 卧床休息

D , 强烈利尿 V

E. 腹腔积液浓缩回输

32 .门好脉高压症的临床表现主要有（） [单选题 r

A. 消瘦

B. 肝肿大、肝功潴异常

C 肝掌

D, 废水 ✓

33 .门脉高压的特异性表现是（） [单选越 r

A. 腹腔积液

B. 脾肿大

C. 脾功能亢进

D 侧支循环开放 ✓

E. 肝装,蜘蛛痣

34 .诊断脂肪肝首选的检查方法是（义单选感】•

A. CT

BMRI

C. 体格检查

DB 超 ✓

E 病理

35 .非酒精性肺肪性肝病的发生主要与下列那种因素相关（） [单选题]•

庆则”

B 遗传

U 胰岛素抵抗

D. 病毒感染

E. 乙型肝炎

36 .治疗早期原发性肝癌疗效最好的非手术疗法是（） [单选题 r

A. 放射治疗

B. 肝动脉化疗栓塞治疗 V

C. 肝动脉浅注化疗

。经皮穿刺酒精注射疗法

E. 生物:台疗

37 .辅助诊断原发性肝细胞癌最早的指标是（） [单选魔广

A. 肝脏 B 超

B. 肝 CT

C. AFP ✓

DAP

E. γ-GT

38 .原发性肝细胞性肝癌最理想的肿瘤标记物是（） 【单选题 r

AAFP ✓

B. GGT2

C. CA19-9

D. CA125

E. CEA

39 .序原发性肝癌，哪种疾病能弓 I起 AFP>500 μ g / 1. () [单选题厂

A. 多量肝

B 慢性肝炎

C. 生殖腺胚胎癌 ✓

。肾脏胚胎瘤

E. 肝硬化

40 .有关 AFP 升高的临床意义，正确的是 () [单选题 1

A, AFP>2 ∞ μ g / 1. 时可诊断肝细胞癌

B. 肝转移瘤患者 AFP 常显著增高

C. 肝功异常伴有 AFP 增高提示合并肝癌

D 消化道其他肿瘤 AFP 不会升高

E. 肝细胞癌术后 AFP 又升高提示复发 ✓

41 .亚临床肝癌是指 () [单选题 F

A. 肝细胞 DNA 代谢异常

BAFP 检出而无任何症状和体征的肝癌 ✓

UB 超检出 <2cm 的肝癌

DCT 检出 <2cm 的肝癌

E. 患者仅有肝区疼痛的肝癌

42 .原发性肝癌定位诊断下述哪个方法最敏感 () [单选题 r

A. X 线

B. CT

UCT 肝动脉造影 ✓

。放射性核素肝显像

E. X 线门静脉造影

43 .下列哪项有助于鉴别肝硬化与良性活动性肝病 () [单选题) *

A. HBsAg 阳性

BAFP 阳性

C. AFP 阴性

D 肝功能明显损害

EAFP 和 A1. T 动态曲线 ✓

44 .对肝癌的临床诊断最具特异性的是 () [单选题 r

A. 肝区疼痛

B. 进行性肝大，质硬 ✓

C. 恶病质

D. 梗阻性黄疸

EW 肺部转移病灶

45 .治疗较大的单发性细菌性肝脓肿，主要治疗措施为（） [单选题 F

A. 全身应用抗生素

B. 输血，应用抗生素

C. 穿刺抽脓，应用抗生素 ✓

D. 全身支持疗法，应用抗生素

E. 手术切开引流

46. 下列哪些情况适宜作肝穿刺活检（） [单选题 r

A. 肝功能异常伴有血友病

B. 肝血管瘤

C. 大量腹水

D. 阿米巴肝脓肿 ✓

E. 肝昏迷

47 .症状出现之前肝性脑病的早期检测方法是（） [单选题 「

A. 血氨

BMffi

C. 诱发电位 ✓

。空腹血糖

E. 肝功能

48 .用于亚麻床肝性脑病筋查的检有项目是（） [单选 s 三 r

A. 视觉诱发电位

B. 躯体诱发电位

C 脑电图

D. 简易智力测验 ✓

E 血氨

49 .肝硬化患者上消化道出血后,为预防肝性脑病的主要治疗措施为（） [单选越 r

A. 加强保肝治疗

B. 应用左旋多巴

C. 弱酸溶液洗肠 ✓

D. 豆方氨基酸酵点

E 纠正酸碱平衡

50 .预后最差的肝性脑病患者是（） [单选题 r

A. 肝硬化伴胸腔积液者

B. 暴发性肝炎所致者 ✓

C. 诱因明确，且易消除者

D 肝硬化伴黄疸者

E. 肝硬化伴自发性腹膜炎者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688034101021007002>