

国家基本公卫（孕产妇健康管理）考试复习题及答案

单选题

1. 如孕早期高度怀疑胎儿有异常，可于（）周羊膜腔穿刺抽取羊水进行细胞学检查。

- A、14-16
- B、18-20
- C、20-24
- D、16-18

参考答案：B

2. 孕早期健康管理不包括（）。

- A、妇科检查
- B、询问既往史、家族史
- C、孕期营养指导
- D、骨盆内外测量

参考答案：D

3. 根据检查结果填写第1次产前随访服务记录表，对具有妊娠危险因素和可能有妊娠禁忌症或严重并发症的孕妇，及时转诊到上级医疗卫生机构，并在（）内随访转诊结果。

- A、3周
- B、1周
- C、4周

D、2周

参考答案：D

4. 关于糖尿病对妊娠的影响，描述错误的是（）。

A、糖尿病孕妇易发生羊水过少、胚胎发育异常

B、糖尿病孕妇易并发感染如肾盂肾炎、产褥感染等

C、易发生糖尿病酮症酸中毒

D、所有糖尿病孕妇所生的新生儿均按高危儿处理

参考答案：A

5. 可以开展产后42天健康检查的机构为（）。

A、正常产妇为乡镇卫生院、社区卫生服务中心

B、有助产技术服务资质的乡镇卫生院、社区卫生服务中心

C、有助产技术服务资质的机构

D、乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）

参考答案：A

6. 滞产是指分娩总产程超过（）小时。

A、10

B、18

C、24

D、36

参考答案：C

7. 初乳优点不包括（）。

A、乳糖少

- B、含蛋白质较多
- C、脂肪多
- D、含矿物质较多
- E、含有抗体，尤其是分泌型 IgA

参考答案：C

8. 足月妊娠胎心率正常的范围是（）。

- A、每分钟 130~170 次
- B、每分钟 100~140 次
- C、每分钟 110~150 次
- D、每分钟 110~160 次

参考答案：D

9. 孕前可接种乙肝疫苗等，一般在免疫注射（）个月再怀孕。

- A、6
- B、12
- C、1
- D、3

参考答案：D

10. 第 1 次产前检查服务记录表填写时，“个人史”包括（）。

- A、剖宫产史
- B、高血压病史
- C、服用药物
- D、遗传性疾病史

参考答案：C

11. 产妇需在分娩室内观察（）小时，由专人检测生命体征、宫缩及阴道出血情况。

A、4

B、3

C、2

D、1

参考答案：C

12. 在我国早产的定义为（）。

A、妊娠满 24 周至不足 37 周间分娩者

B、妊娠满 24 周至不足 40 周间分娩者

C、妊娠满 28 周至不足 40 周间分娩者

D、妊娠满 28 周至不足 37 周间分娩者

参考答案：D

13. 乡镇卫生院、社区卫生服务中心为正常产妇做产后 42 天健康检查，异常产妇到（）检查。

A、上级医疗卫生机构

B、县级医疗卫生机构

C、原分娩医疗卫生机构

D、区级医疗卫生机构

参考答案：C

14. 孕晚期建议检查项目中，妊娠（）周后进行胎心电子监护及超声检查等。

A、34

B、36

C、37

D、35

参考答案：B

15. 孕产妇保健调查的核心指标：（）

A、孕产妇系统管理率

B、早检率

C、住院分娩率

D、产检率

参考答案：A

16. 孕产妇健康管理服务要求加强宣传，在基层医疗卫生机构公示（）内容，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率。

A、母婴健康

B、产检服务

C、免费服务

D、加强服务

参考答案：C

17. 正常胎动数为 12 小时（）次。

A、>10

B、 >30

C、>15

D、>20

参考答案：B

18. 可以开展产后访视的机构为（）。

A、乡镇卫生院、社区卫生服务中心

B、有助产技术服务资质的乡镇卫生院、社区卫生服务中心

C、有助产技术服务资质的机构

D、乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）

参考答案：D

19. 正常分娩的产妇至少住院观察（）小时，以及时发现产后出血。

A、24

B、12

C、36

D、2

参考答案：A

20. 没有助产技术服务资质的基层医疗卫生机构应督促孕晚期孕产妇去有助产资质的医疗卫生机构进行（）次随访。

A、4

B、2

C、3

D、1

参考答案：B

21. () 应开展孕产妇自我监护方法、促进自然分娩、母乳喂养以及孕期并发症、合并症防治指导。

A、孕中期、晚期健康管理

B、孕早期健康管理

C、孕中期健康管理

D、孕晚期健康管理

参考答案：D

22. 为预防感染，接产要做到四消毒。下面几项中哪一项不属于四消毒的内容？()

A、全身

B、手

C、器械

D、脐带

参考答案：A

23. 胎儿娩出后 24 小时内出血量达到或超过() 者称为产后出血。

A、100ml

B、500ml

C、1000ml

D、200ml

参考答案：B

24. 孕产妇死亡是指 ()

- A、全部都对
- B、妇女在妊娠期至产后 42 天内，由于与妊娠有关所至死亡
- C、全部都不对
- D、妇女在妊娠期死亡
- E、妇女在妊娠期指分娩时，与妊娠有关所至死亡

参考答案：B

25. 孕产妇健康管理服务要求积极运用中医药方法开展（）保健服务？

- A、孕期、产褥期
- B、孕期、产褥期、哺乳期
- C、产褥期、哺乳期
- D、孕前期、孕中期、孕晚期

参考答案：B

26. 孕前保健一般指的孕前（）个月，为准备妊娠的夫妇提供以健康教育与咨询、孕前医学检查、健康状况评估和健康指导。

- A、4
- B、6
- C、2
- D、3

参考答案：B

27. 初孕妇自觉胎动多数开始于（）。

- A、妊娠 12~14 周

B、妊娠 18~20 周

C、妊娠 15~17 周

D、妊娠 21~23 周

参考答案：B

28. 关于母乳喂养，下列哪项不正确（）。

A、指导母亲如何喂奶

B、哺乳期间可吸吮橡皮奶头作安慰物

C、与其婴儿分开时应保持泌乳

D、禁止给婴儿喝饮料

参考答案：B

29. 分娩结束时，子宫底高度在脐下（）。

A、3-4 横指

B、2-3 横指

C、0-1 横指

D、1-2 横指

参考答案：D

30. 胎心减速出现在宫缩高峰期后，下降慢、持续时间长、恢复慢，临床提示的情况（）。

A、宫缩是抬头受压

B、宫缩时脐带受压，兴奋迷走神经

C、胎儿缺氧

D、胎儿受镇静药物影响

E、胎儿状况良好

参考答案：C

31. 产后（），子宫恢复到未孕时大小。

A、6-8周

B、2-4周

C、1-2周

D、4-6周

参考答案：A

32. 从优生角度来讲，女性的最佳生育年龄是（）。

A、21-23岁

B、23-25

C、18-20岁

D、24-29岁

参考答案：D

33. 开展（）个人卫生、心理和营养保健指导，特别要强调避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响，同时进行产前筛查和产前诊断的宣传告知。

A、孕早期

B、产褥期

C、孕中期

D、孕晚期

参考答案：A

34. 孕妇生殖道感染沙眼衣原体正确的是()。

- A、核酸扩增试验是诊断沙眼衣原体感染的金标准
- B、产道感染少见
- C、影响胎儿易患结膜炎、肺炎
- D、新生儿血清沙眼衣原体 IgG 阳性，表明有宫内感染

参考答案：C

35. 孕期筛查胎儿畸形时机是 ()。

- A、孕早期
- B、分娩前
- C、孕晚期
- D、孕中期

参考答案：D

36. 有关乙肝病毒母婴传播错误的说法是 ()

- A、母婴传播途径包括宫内传播、产时传播和产后传播
- B、有证据表明剖宫产可降低母婴传播概率
- C、乙肝母亲分娩新生儿经主、被动联合免疫后，可以接受母乳喂养
- D、新生儿产后感染主要与密切接触母亲的唾液和乳汁有关

参考答案：B

37. 以下哪项不是胎儿宫内窘迫的表现 ()。

- A、胎心 120 次/分
- B、胎心 170 次/分

C、胎儿电子监护出现晚期减速

D、胎动 5 次/12 小时

参考答案：A

38. 对怀孕的妇女（包括流动人口）要求在孕（）周前建立《母子健康手册》，按孕产妇健康管理要求进行服务。

A、14

B、11

C、12

D、13

参考答案：D

39. 关于妊娠期糖尿病，以下说法中不正确的是（）。

A、妊娠期有多饮、多食、多尿或外阴阴道假丝酵母菌反复发作

B、原有糖尿病基础上合并妊娠

C、妊娠期才出现糖尿病

D、药物首先推荐应用胰岛素

E、先通过干预生活方式控制血糖

参考答案：B

40. 停止长效口服避孕药需（）个月再怀孕，以消除药物的影响。

A、6

B、12

C、3

D、1

参考答案：A

41. 母婴同室是指（）。

A、母亲与其婴儿每日至少 12 小时在一起

B、母亲与其婴儿一日 24 小时在一起

C、母亲与其婴儿每日至少白天在一起

D、母亲与其婴儿每日至少 8 小时在一起

参考答案：B

42. （）负责全国孕产期保健工作管理和质量控制，定期组织专家进行检查、督导和评价。

A、妇幼保健机构

B、国家卫生行政部门

C、省级卫生行政部门

D、国家疾病预防控制中心

参考答案：B

43. 合适的生育年龄为（）。

A、大于 20 岁，小于 35 岁

B、大于 20 岁，小于 40 岁

C、大于 25 岁，小于 45 岁

D、大于 18 岁，小于 35 岁

参考答案：A

44. 产后访视率=辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数/（）×100%。

- A、该地该时间内产妇数
- B、该地该时间内出生数
- C、该地该时间内人口数
- D、该地该时间内活产数

参考答案：D

45. 关于孕前保健以下哪项是错误的？（）

- A、妇女一生中有 30 余年生育期，完全有可能进行受孕时机的选择
- B、婚后打算避孕一段时间再受孕，应该停止避孕前接受孕前保健及指导
- C、从家庭的幸福及优生的目的，应选择理想受孕时机
- D、较为理想的妊娠时机应当选择男女双方、尤其是男方的身体、精神心理均为最佳的时期

参考答案：D

46. 下列哪项与职业有害因素无关？（）

- A、子代智力发育
- B、脐带扭转
- C、低出生体重
- D、先天缺陷

参考答案：B

47. 妊娠期尖锐湿疣，以下哪项治疗不恰当？（）

- A、手术切除疣体

- B、干扰素局部涂擦
- C、80-90%三氯醋酸涂擦病灶局部
- D、病灶局部激光治疗

参考答案：B

48. 开展孕早期健康管理的机构为（）。

- A、有助产技术服务资质的乡镇卫生院、社区卫生服务中心
- B、有助产技术服务资质的机构
- C、乡镇卫生院、社区卫生服务中心
- D、乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）

参考答案：C

49. （）应对产妇进行心理保健、性保健与避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养6个月、产妇和婴幼儿营养等方面的指导。

- A、产后42天健康检查
- B、孕晚期健康管理
- C、产后访视
- D、产后访视、产后42天健康检查

参考答案：A

50. 孕产妇健康管理服务对象是辖区内居住的（）。

- A、新生儿
- B、产妇
- C、准备妊娠夫妇
- D、孕产妇

参考答案：D

51. 以下预产期推算方法正确的是（）。

A、末次月经的最后一天日期的月份加 10 或减 2 为预产期月份数，
天数减 7 为预产期日

B、末次月经的第一天日期的月份加 10 或减 2 为预产期月份数，
天数减 7 为预产期日

C、末次月经的第一天日期的月份加 9 或减 3 为预产期月份数，
天数加 7 为预产期日

D、末次月经的最后一天日期的月份加 9 或减 3 为预产期月份数，
天数加 7 为预产期日

参考答案：C

52. 妊娠合并尖锐湿疣以下哪项是不恰当的？（）

A、有垂直传播的危险

B、妊娠足月外阴阴道病变广泛，应剖宫产终止妊娠

C、极易造成胎儿宫内感染

D、妊娠期病灶增长快

参考答案：C

53. 孕产期保健是指各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后（）
天的妇女及胎婴儿提供全程系列的医疗保健服务。

A、45

B、42

C、30

D、60

参考答案：B

54. 吸烟产生的烟雾含有尼古丁、焦油、氰化物和一氧化碳等有毒物质，会影响受精卵和胚胎质量，造成胎儿发育不良。因此，计划怀孕的夫妇（）。

- A、双方应在怀孕前 3 个月停止吸烟
- B、双方应在怀孕后 3 个月内停止吸烟
- C、女方应停止吸烟，男方可以继续吸烟
- D、双方应在怀孕后 1 个月内停止吸烟

参考答案：A

55. 孕妇 29 岁，基础血压 110/70mmHg，现妊娠 28 周，近日经常有头晕、恶心。查体：血压 160/100mmHg，水肿（+++），尿常规：尿蛋白（+++），见透明和颗粒管型。血生化：血尿酸与尿素氮增高。眼底检查：小动脉痉挛，视网膜水肿，有渗出物。患者既往在 17 岁时患肾炎。目前正确的诊断是（）

- A、妊娠合并慢性高血压
- B、HELLP 综合征
- C、妊娠合并慢性肾炎
- D、妊娠期高血压病合并慢性肾炎
- E、重度子痫前期

参考答案：D

56. 正常妊娠 6~8 周，其血液 hCG 每日增长速度应（）。

- A、 $\geq 66\%$
- B、 $\geq 22\%$
- C、 $\geq 100\%$
- D、 $\geq 55\%$

参考答案：A

57. 单绒毛膜双胎特有的并发症是（）。

- A、双胎输血综合征
- B、羊水过多
- C、早产
- D、胎儿畸形

参考答案：A

58. 填写第 2-5 次产前随访服务记录表时，若管理对象失访，应（）。

- A、在失访日期处填写，按照年（4 位）、月（2 位）、日（2 位）顺序填写
- B、在失访日期处写明失访原因
- C、在失访日期处填写，并写明失访原因
- D、在随访日期处写明失访原因

参考答案：D

59. 推算预产期方法正确的是（）。

- A、按末次月经第 1 日算起，月份减 3 或加 9，日数加 10
- B、按末次月经最后 1 日算起，月份减 3 或加 9，日数加 7

- C、按末次月经第 1 日算起，月份减 3 或加 9，日数加 7
- D、按末次月经第 1 日算起，月份减 3 或加 9，日数加 5
- E、按末次月经最后 1 日算起，月份减 3 或加 9，日数加 5

参考答案：C

60. 糖尿病孕妇的子代发生以下情况增多不包括（）

- A、巨大儿
- B、羊水过多
- C、过期妊娠
- D、胎儿畸形

参考答案：C

61. 产后 42 天健康检查对产妇应进行性保健、避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养（）个月、婴幼儿营养等方面的指导。

- A、3
- B、9
- C、6
- D、12

参考答案：C

62. 胎儿窘迫最常见的自觉症状是（）。

- A、羊水胎粪污染
- B、NST 无反应
- C、胎心率增快
- D、胎动频繁后渐减少

参考答案：D

63. 对于沙眼衣原体感染，下列哪项说法不恰当？（）

- A、泌尿生殖道沙眼衣原体感染属于性传播疾病
- B、沙眼衣原体不仅是沙眼的病原体，也是引起女性生殖道感染的常见病原体
- C、孕妇生殖道衣原体感染不会发生垂直传播
- D、衣原体感染新生儿最常侵犯眼结膜

参考答案：C

64. 孕妇以（）卧位为佳。

- A、仰卧
- B、俯卧
- C、右侧卧位
- D、左侧卧位

参考答案：D

65. 可以开展第 2-5 次产前随访的机构为（）。

- A、乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）
- B、乡镇卫生院、社区卫生服务中心
- C、有助产技术服务资质的乡镇卫生院、社区卫生服务中心
- D、有助产技术服务资质的机构

参考答案：D

66. 妊娠期需监测孕妇体重变化，关于孕期体重变化错误的是（）。

- A、妊娠早期共增长 1~2kg
- B、孕期理想增长 10~12kg
- C、妊娠中期及晚期，每周增长 0.3~0.5kg
- D、肥胖孕妇增长 9~10kg

参考答案：D

67. 巨细胞病毒感染中不正确的是()。

- A、多为隐性感染，无明显症状和体征
- B、巨细胞病毒可因妊娠而被激活
- C、新生儿感染经积极治疗，预后较好，多无后遗症
- D、妊娠晚期感染者无需特殊处理，可经阴道分娩

参考答案：C

68. 孕前保健服务是为准备怀孕的夫妇在孕前至少 () 提供教育、咨询、信息和技术服务

- A、4 个月
- B、6 个月
- C、7 个月
- D、5 个月

参考答案：B

69. 关于妊娠合并淋菌感染，下列哪项说法是不恰当的？()

- A、治疗首选喹诺酮类药物
- B、妊娠早期可致感染性流产
- C、易发生胎儿宫内感染

D、对可疑感染者取分泌物培养可确诊

参考答案：A

70. 下列哪项不是正确含接的要点？（）

A、舌头呈勺状环绕乳晕

B、嘴张得很大

C、面颊鼓起呈圆形

D、下唇向内翻

参考答案：D

71. 孕前保健的目的是（）。

A、了解婚配是否影响胎儿健康

B、遗传性疾病的产前检查

C、筛查妊娠危险因素

D、选择适宜的受孕时机

参考答案：D

72. 下列选项中，哪一项不是孕产妇高危因素？（）

A、年龄 ≥ 35 岁

B、体重 ≥ 65 kg

C、有流产史

D、家庭困难

参考答案：B

73. 第1次产前检查中，下列哪项属于国家基本公共卫生服务免费测查项目（）。

- A、阴道分泌物
- B、乙型肝炎表面抗原
- C、HIV 抗体检测
- D、乙型肝炎表面抗体

参考答案：B

74. 下列选项中，哪一项不属于产伤？（）

- A、产后感染
- B、难产所致的胎儿骨折
- C、难产所致的神经损伤
- D、产妇的软产道损伤

参考答案：A

75. 早孕建册人数是指（）。

- A、在辖区内怀孕 12 周之前建册，并进行第一次产前检查的产妇人数
- B、在辖区内怀孕 13 周之前建册，并进行第一次产前检查的产妇人数
- C、在辖区内怀孕 12 周之前建册，并进行第一次产前检查的孕妇人数
- D、在辖区内怀孕 13 周之前建册，并进行第一次保健指导的产妇人数

参考答案：B

76. 在整个妊娠期间至少提供（）次产前检查，发现异常者应当酌情增加检查次数。根据不同妊娠时期确定各期保健重点。

- A、8
- B、10
- C、6
- D、5

参考答案：D

77. 妊娠期接受辐射阈值可能杀死胚胎（胎儿）或无损伤存活（all or none）是发生在受精后（）

- A、3~8周
- B、9~15周
- C、0~2周
- D、16~25周

参考答案：C

78. 乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）在收到分娩医院转来的产妇分娩信息后，应于产妇出院后（）内到产妇家中进行产后访视。

- A、3~5天
- B、2~3天
- C、7天
- D、3~7天

参考答案：C

79. 关于生殖道感染，下列正确的是（）

- A、HIV 感染孕妇不存在围产期传播，产后可以哺乳
- B、妊娠合并尖锐湿疣是剖宫产的指征
- C、巨细胞病毒 IgG 阳性，IgM 阴性为原发感染
- D、生殖道沙眼衣原体感染，主要通过宫内感染胎儿
- E、孕妇生殖器疱疹治疗原则是减轻症状，缩短病程，减少 HSV 排放，控制传染性

参考答案：E

80. 胎儿窘迫是指胎儿在宫内发生()。

- A、缺氧
- B、缺血
- C、羊水污染
- D、营养缺乏

参考答案：A

81. 妊娠合并尖锐湿疣，下列哪项不恰当？()

- A、大多数感染发生在下生殖道
- B、可发生母儿垂直传播
- C、以全身用药治疗为主
- D、孕期尖锐湿疣数目多，病灶大，多形态

参考答案：C

82. 子宫复旧一般需要多长时间 ()。

- A、1 周
- B、2 周

C、6周

D、8周

E、4周

参考答案：C

83. 孕产妇健康管理中，（）表格填写时需开展一般心理状况评估？

A、第2-5次产前随访服务记录表

B、产后访视记录表和产后42天健康检查记录表

C、第1次产前检查服务记录表

D、产后访视记录表

参考答案：B

84. 诊断宫内早孕最可靠的辅助检查方法是（）。

A、B型超声检查

B、尿妊娠试验

C、基础体温测定

D、阴道脱落细胞学检查

参考答案：A

85. 临床听诊胎心率的变化是诊断胎儿窘迫的最简单实用的方法，正常胎心率为（）

A、120-180次/分

B、120-160次/分

C、100-160次/分

D、110-160 次/分

参考答案：D

86. 从孕前 3 个月开始，每日应口服叶酸（）。

A、0.2mg

B、0.4mg

C、0.6mg

D、1.0mg

参考答案：B

87. 高龄孕妇是指（）

A、预产年龄 \geq 40 岁

B、预产年龄 \geq 35 岁

C、就诊年龄 \geq 35 岁

D、受孕年龄 \geq 35 岁

参考答案：B

88. 按照基本公共卫生服务规范，下述孕产妇健康管理服务要求中不合理的是哪一项？（）

A、加强与村（居）委会、妇联、计生等相关部门的联系，掌握辖区内孕产妇人口信息

B、对孕产妇仅进行孕期的追踪与管理工作

C、从事孕产妇健康管理服务工作的人员应取得相应的执业资格，并接受过孕产妇保健专业技术培训

D、开展孕产妇健康管理的乡镇卫生院和社区卫生服务中心应当具备服务所需的基本设备和条件

参考答案：B

89. 没有助产技术服务资质的医疗卫生机构，（）。

A、督促孕产妇前往有资质的机构进行孕晚期随访，并注明督促日期，填写相关记录

B、督促孕产妇前往有资质的机构进行孕中、晚期随访，并注明督促日期，填写相关记录

C、督促孕产妇前往有资质的机构进行孕晚期随访，并注明督促日期，无需填写相关记录

D、督促孕产妇前往有资质的机构进行孕中、晚期随访，并注明督促日期，无需填写相关记录

参考答案：D

90. 骨盆测量在正常范围的是（）。

A、坐骨结节间径 7cm

B、骨盆倾斜度 70°

C、耻骨弓角度 90°

D、坐骨切迹可容 2 横指

参考答案：C

91. 对于妊娠合并梅毒下列哪项叙述是不恰当的？（）

A、可能与死胎、早产及胎盘病变有关

B、早期表现为皮肤损害，晚期能侵犯心血管等重要脏器

C、早期梅毒可通过胎盘传给胎儿

D、梅毒病原体不会在胎儿内脏和组织中繁殖

参考答案：D

92. 怀孕和分娩是人类繁衍的生理过程，应当做到有计划、有准备。准备生育的夫妇，应当到医疗保健机构接受（）保健服务。

A、婚前

B、孕前

C、产时

D、产前

参考答案：B

93. 关于孕前指导以下哪项是错误的？（）

A、经济困难，居住拥挤不属于妊娠心理社会的影响因素

B、如有长期接触对胎儿有毒有害物质的历史暂不适合妊娠

C、受孕应在夫妇双方身心健康良好的情况下进行

D、如果夫妇婚后不准备避孕应向双方进行孕前指导

参考答案：A

94. 末次月经的第一天为公历 2017 年 5 月 22 日，推算预产期应为（）。

A、2018 年 3 月 22 日

B、2018 年 3 月 1 日

C、2018 年 2 月 29 日

D、2018 年 2 月 22 日

参考答案：B

95. 对本级不能处理的高危孕产妇，应当转至（）医疗保健机构作进一步检查、确诊。

- A、省级
- B、上级
- C、地市级
- D、同级

参考答案：B

96. 孕妇体重至妊娠 13 周时平均每周增加 350 克，一周内体重增加大于多少克，应重视处理（）

- A、500 克
- B、700 克
- C、400 克
- D、600 克

参考答案：A

97. 产后 1 周，子宫缩小至约（）妊娠大小。

- A、12 周
- B、16 周
- C、4 周
- D、8 周

参考答案：A

98. 孕晚期基本检查项目包括（）复查。

- A、血粘度

B、胆汁酸

C、尿蛋白

D、胎心监护

参考答案：C

99. 为防止产伤，下面哪一项是对的？（）

A、及时识别胎盘剥离征象，正确协助胎盘娩出

B、产后认真检查软产道，发现损伤及时修补

C、注意无菌技术

D、应用产程图严密观察产程，及时发现异常产程，尽早处理

参考答案：B

100. 当胎动数 12 小时（），说明胎儿宫内缺氧。

A、<30

B、<20

C、<10

D、<15

参考答案：C

101. 骨盆测量小于正常值的是（）。

A、坐骨结节间径 7.5cm

B、髂棘间径 25cm

C、骶耻外径 20cm

D、髂嵴间径 28cm

参考答案：A

102. 孕妇巨细胞病毒不能通过哪条途径感染胎儿？（）

- A、垂直传播
- B、产道感染
- C、乳汁感染
- D、呼吸道感染

参考答案：D

103. 为正常产妇开展产后 42 天健康检查的机构为（）。

- A、有助产技术服务资质的乡镇卫生院、社区卫生服务中心
- B、乡镇卫生院、社区卫生服务中心
- C、有助产技术服务资质的机构
- D、乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）

参考答案：B

104. （）级以上医疗保健机构应当开设高危门诊，指派具有较丰富临床经验的医生承担会诊、转诊，并作好记录。

- A、乡
- B、省
- C、县（市、区）
- D、地市

参考答案：C

105. 早孕建册率=辖区内孕 13 周前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/（）×100%。

- A、该地该时间内活产数

- B、该地该时间内出生数
- C、该地该时间内产妇产数
- D、该地该时间内人口数

参考答案：A

106. 产前诊断胎儿畸形最常用手段是（）。

- A、胎儿头皮血 pH 检查
- B、羊膜镜检查
- C、B 超检查
- D、羊膜腔穿刺羊水检查
- E、胎儿心电图

参考答案：C

107. 孕妇感染巨细胞病毒正确的是（）。

- A、可以哺乳，因乳汁中无病毒
- B、早期妊娠发现并确诊应及时治疗，继续妊娠
- C、中晚期妊娠发现确诊应予引产
- D、母婴垂直传播是重要传播途径

参考答案：D

108. 孕中期钙的适宜摄入量每天多少？（）

- A、1800 毫克
- B、1500 毫克
- C、1400 毫克
- D、1000 毫克

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/688043026100006102>