

2022年-2023年执业药师之西药学综合知识与技能 基础试题库和答案要点

单选题（共40题）

1、再感染

- A. 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药6周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- B. 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 10^5 cfu/ml
- C. 宜选用毒性小的抗菌药物
- D. 治疗后症状消失，尿菌阴转后在6周内再出现菌尿，菌种与上次相同
- E. 短疗程疗法

【答案】 A

2、患者,男,46岁,拟行肠道手术,术前1天使用导泻药的方法是()

- A. 50%葡萄糖注射液湿敷
- B. 50%硫酸镁溶液口服
- C. 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- D. 5%氯化钙注射液静脉滴注
- E. 50%硫酸镁溶液湿敷

【答案】 B

3、（2016年真题）患者，女，5岁，体重25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9°C ，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A. 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

- B. 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药
- C. 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药
- D. 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药
- E. 小儿氨酚黄那敏颗粒与对乙酰氨基酚混悬滴剂含有相同成分，应避免重复用药

【答案】 B

4、给予非甾体解热镇痛药的依据是

- A. 有助于合成红细胞
- B. 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- C. 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- D. 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- E. 磷不能被透析清除而蓄积，长期高磷血症出现心力衰竭、心律失常并发症

【答案】 C

5、（2019年真题）患者，男，60岁，坏死性胰腺炎剖腹探查术术后2年，恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

- A. 复方阿嗝米特肠溶片
- B. 奥美拉唑肠溶胶囊
- C. 蒙脱石散
- D. 干酵母片
- E. 诺氟沙星胶囊

【答案】 A

6、以下论述哪项是错误的（ ）

- A. 普萘洛尔可抑制肾素的分泌
- B. 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压
- C. 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全
- D. 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，以提高疗效、减少不良反应
- E. 尼群地平可与 β 受体阻断药合用，以提高降压作用

【答案】 B

7、新生儿的相对总体液量比成人高，体液占体重

- A. 70% ~ 80%
- B. 75% ~ 80%
- C. 75% ~ 85%
- D. 72% ~ 80%
- E. 75% ~ 90%

【答案】 B

8、下列药品宜于冷处贮存，但不应冷冻的是

- A. 替硝唑注射剂
- B. 双歧三联活菌制剂
- C. 托烷司琼注射剂
- D. 复方氨基酸注射剂
- E. 肝素钠注射剂

【答案】 B

9、（2016年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（ ）。

- A. 地西洋
- B. 雷美尔通
- C. 米氮平
- D. 佐匹克隆
- E. 唑吡坦

【答案】 C

10、影响氟胞嘧啶药效的PK / PD参数是

- A. $AUC_{0\sim 24} / MIC$
- B. $\%T > MI$
- C. C_{max} / MIC
- D. C_{max}
- E. $AUC_{0\sim 24} / C_{max}$

【答案】 B

11、（2019年真题）用后不宜马上进食的剂型是

- A. 软膏剂
- B. 含漱剂
- C. 直肠栓剂
- D. 滴眼剂

E. 透皮贴剂

【答案】 B

12、开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

A. 医嘱清楚准确

B. 医嘱完整不漏项

C. 实现个体化治疗

D. 修订医嘱及时沟通

E. 掌握选择正确药物的知识与信息

【答案】 C

13、属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是

A. 齐多夫定

B. 依非韦伦

C. 利托那韦

D. 利巴韦林

E. 雷特格韦

【答案】 B

14、滴虫性阴道炎宜选用

A. 咪康唑

B. 甲硝唑

C. 庆大霉素

D. 聚甲酚磺醛

E. 曲古霉素

【答案】 B

15、处方审核是处方调配的重要环节，药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方，不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

A. 无适应证用药

B. 单张门诊处方超过 5 种药品

C. 联合用药不适宜

D. 无正当理由开具高价药

E. 无特殊情况门诊处方超过 7 日用量

【答案】 C

16、所有的 UA/NSTEMI 患者均应尽早使用阿司匹林，首次服用剂量为（ ）

A. 75mg

B. 100mg

C. 150mg

D. 300mg

E. 600mg

【答案】 D

17、患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是()

A. 停药，给予糖皮质激素

- B. 给予糖皮质激素冲击治疗
- C. 停药，水化，给予美司钠治疗
- D. 停药，给予亚叶酸钙治疗
- E. 停药，给予洛哌丁胺

【答案】 C

18、不良反应是口干、尿潴留的是（ ）

- A. 索利那新
- B. 哌唑嗪
- C. 特拉唑嗪
- D. 度他雄胺
- E. 哌仑西平

【答案】 A

19、不能用热水送服的药物是

- A. 微生态制剂
- B. 胃黏膜保护剂
- C. 磺胺类药物
- D. 镇静催眠药
- E. 抗高血压药

【答案】 A

20、处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A. 重复用药
- B. 无适应证用药
- C. 联合应用 3 种药物
- D. 无正当理由开具高价药
- E. 无特殊情况门诊处方超过 7 日用量

【答案】 A

21、二甲双胍片的适宜服药时间是

- A. 清晨
- B. 餐前
- C. 餐中
- D. 餐后
- E. 睡前

【答案】 C

22、因耐药率高而很少单独使用的肺炎治疗药物是

- A. 克拉霉素
- B. 青霉素
- C. 亚胺培南
- D. 左氧氟沙星
- E. 琥珀酸钠氢化可的松

【答案】 A

23、下列药品中，与血浆蛋白结合率高、分布容积随年龄增长而降低、容易造成老年人血药浓度升高而致中毒的是

- A. 巴比妥
- B. 地西洋
- C. 碳酸钙
- D. 维生素 C
- E. 水杨酸钠

【答案】 B

24、患者，男，25岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12 \times 10^9 / L$ ，X线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A. 头孢羟氨苄
- B. 头孢克洛
- C. 红霉素
- D. 头孢噻肟
- E. 头孢吡肟

【答案】 A

25、骨性关节炎伴轻-中度疼痛患者通常首选的药物是

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 布洛芬
- C. 透明质酸钠
- D. 氨基葡萄糖
- E. 曲马多

【答案】 A

26、患者，男性，35岁，因间断上腹痛5年、加重1周来诊。患者自5年前开始间断出现上腹胀痛，空腹时明显，进食后可自行缓解，有时夜间痛醒，无放射痛，有暖气和反酸，常因进食不当或生气时诱发，每年冬春季节易发病。1周前因吃凉白薯后病情再犯，腹痛较前加重。发病以来无恶心、呕吐和呕血，饮食尚可，二便正常，无便血和黑便，体重无明显变化。既往体健，无肝肾疾病及胆囊炎和胆石症病史，无手术、外伤和药物过敏史，无烟酒嗜好。

- A. 服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用PPI，需补充维生素B12
- B. 溃疡活动期应停用胃黏膜损害药物
- C. 患者长期服用消化性溃疡治疗药物抗酸剂和铋剂，如因骨折住院后仍需继续服用
- D. 克拉霉素对Hp治疗有效，但对于患有心律失常的患者应权衡利弊、慎重使用
- E. 胃溃疡发病率高于十二指肠溃疡的发病率

【答案】 C

27、“用药错误”I级（9级）的标准

- A. 差错导致患者死亡
- B. 差错导致患者永久性伤害
- C. 客观环境或条件可能引发差错
- D. 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用
- E. 差错导致患者生命垂危，需要应用维持生命的措施

【答案】 A

28、（2019年真题）患者，男，21岁，因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用教育的说法，错误的是

- A. 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原

- B. 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素，首选地塞米松
- C. 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似，应注意鉴别
- D. 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂
- E. 季节性过敏性鼻炎患者应提前 2~3 周用药，季节过后继续用药 2 周

【答案】 B

29、喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶中的

- A. 茶碱
- B. 鞣酸
- C. 咖啡因
- D. 蛋白质
- E. 黏多糖

【答案】 B

30、氯贝特的不良反应中哪一项是错误的

- A. 皮肤潮红
- B. 皮疹、脱发
- C. 视力模糊
- D. 血象异常
- E. 腹胀、腹泻、恶心、乏力

【答案】 A

31、可告知患者采取如穿戴宽松的鞋袜和手套，避免反复揉搓手脚，避免长时间阳光直射等措施预防药物不良反应的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688074036057006051>