

2024 湖北省宜都市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题内部题库含答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是()

- A: INR
- B: RBC
- C: ALT
- D: APTT

答案：D

2. 患者，男，60 岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降 6 个月，BMI 值 29.0。空腹血糖 10.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 16.7mmol/L，血压 115/80mmHg。

- A: 胰岛素
- B: 双胍类降糖药
- C: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- D: 磺酰脲类降糖药

答案：B

3. 二级信息源的优点叙述，最正确的是

- A: 可提供丰富的信息
- B: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识
- C: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响
- D: 对一个具体问题提供的信息全面、详实

答案：A

4. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 右眼

A: O

B: NS

C: DOL

D: LD

答案：A

5. 患者，男，57 岁，查体：心率 54 次/分，既往患有痛风。近期体检发现高血压，未服药时血压维持在 150 / 95mmHg 左右，建议服药控压，适宜该患者的降压药是

A: 美托洛尔

B: 哌唑嗪

C: 氯沙坦

D: 氢氯噻嗪

答案：C

6. 可用于了解肾小球滤过功能的是

A: 尿素氮

B: 淀粉酶

C: 肌酐

D: 胆固醇

答案：A

7. 患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75KG，临床诊断 2 型糖尿病，实验室检查，空腹血糖 5.7mmol/L(参考值范围 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 15.1mmol/L(正常值<7.6mmol/L)，糖化红蛋白 7.1%(正常值 4.8%~6.0%)，经饮食控制、规律锻炼、血糖控制认为达到理想水平。

- A: 胰岛素
- B: 胰岛素+二甲双胍
- C: 格列齐特
- D: 二甲双胍

答案：D

8. 容易氧化的药物是

- A: 阿朴吗啡、水杨酸钠
- B: 牛痘菌苗
- C: 胃蛋白酶
- D: 青霉素类、头孢菌素类

答案：A

9. 降低痰液黏度，使痰液易于排出的药品是

- A: 可待因
- B: 苯丙哌林
- C: 羧甲司坦
- D: 右美沙芬

答案：C

10. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者，不宜选用的药物是

- A: 坦索罗辛
- B: 多沙唑嗪
- C: 奥昔布宁

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 非那雄胺

答案: C

11. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

- A: 西格列汀
- B: 阿卡波糖
- C: 格列吡嗪
- D: 二甲双胍

答案：C

12. 维生素 D3 用于

- A: 习惯性流产的辅助治疗
- B: 防治坏血病
- C: 防治佝偻病
- D: 防治夜盲症

答案：C

13. 白细胞分类中，单核细胞参考范围为

- A: 3%~8%
- B: 20%~40%
- C: 50%~70%
- D: 1%~5%

答案：A

14. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务的重要人群是

- A: 住院患者
- B: 门诊患者
- C: 过敏体质者

D: 社区患者

答案: C

15. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

A: 钙剂可促进铁剂吸收

B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

C: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进吸收

D: 正常人维持体内铁平衡需要每天从食物中摄取铁 2~2.5mg

答案: B

16. 以下药物中，适宜处置蛇类咬伤的是

A: 糜蛋白酶

B: 凝血酶

C: 胰蛋白酶

D: 胃蛋白酶

答案: C

17. 低张力性便秘

A: 乳果糖

B: 比沙可啶

C: 开塞露

D: 羧甲基纤维素钠

答案: C

18. 降低夜间的眼压作用强，尤其用于其他降眼压药不能耐受的患者的药物是

- A: 毛果芸香碱
- B: 噻吗洛尔
- C: 拉坦前列素
- D: 溴莫尼定

答案：C

19. 溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

- A: 饮茶
- B: 咖啡
- C: 吸烟
- D: 高盐饮食

答案：B

20. 口服给药方便、安全、经济，以下患者中，最适宜口服给药的是

- A: 胃肠反应大的患者
- B: 吞咽困难的老年人
- C: 病情危重的患者
- D: 慢性病或轻症患者

答案：D

21. 起效相对较慢，需 2~4 周，持续治疗可增加抗焦虑疗效的药物是

- A: 加兰他敏
- B: 地西泮
- C: 丁螺环酮
- D: 苯海索

答案：C

22. 第二类精神药品处方印刷用纸为

- A: 淡绿色
- B: 淡红色
- C: 淡黄色
- D: 白色

答案：D

23. MHT 具体治疗方案,有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女宜选用

- A: 雌孕激素连续联合用药
- B: 单纯孕激素补充治疗
- C: 雌孕激素间隔用药
- D: 单纯雌激素补充治疗

答案：A

24. (2016 年真题) 患者, 女, 35 岁, 临床诊断为高甘油三酯血症, 临床上给予非诺贝特进行治疗, 该药正确的用量为 ()。

- A: 0.2g, qd
- B: 0.5g, qd
- C: 0.1g, tid
- D: 0.5g, tid

答案：C

25. 阿司匹林可能引起

- A: 尿血红蛋白
- B: 尿酮体
- C: 尿肌酐
- D: 尿沉渣结晶

答案：A

26. 非杓型高血压患者的合理给药时间是

- A: 一日三餐后给药
- B: 清晨给药
- C: 早、晚给药
- D: 睡前给药

答案：D

27. 可导致男性乳房发育的降压药是

- A: 利血平
- B: 氯沙坦
- C: 螺内酯
- D: 硝苯地平

答案：C

28. 可致驾驶员嗜睡、神志低沉的是

- A: 阿司匹林
- B: 氯苯那敏
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案：B

29. 阿卡波糖片的适宜服药时间是

- A: 清晨
- B: 餐后
- C: 餐中
- D: 餐前

答案：C

30. 下列哪种药物是血液透析和腹膜透析均可清除的药物

- A: 氯霉素
- B: 苯巴比妥、阿司匹林
- C: 茶碱、普鲁卡因胺
- D: 卡托普利

答案：B

31. (2016 年真题) 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是（）。

- A: 0.4g，每日 3 次
- B: 0.4g，每日 5 次
- C: 0.4g，每日 4 次
- D: 0.4g，每日 2 次

答案：B

32. 可引起粪便红细胞增多的是

- A: 阻塞性黄疸
- B: 溶血性黄疸
- C: 细菌性痢疾
- D: 急性胰腺炎

答案：C

33. 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后，出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是（）

- A: 酚妥拉明和呋塞米发生反应
- B: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解

C: 酚妥拉明和多巴胺发生反应

D: 多巴胺和呋塞米发生反应

答案：D

34. 在患者药物治疗的每一个不同阶段（入院、转科或出院时），药师通过与患者沟通或复核，了解其在医疗交接前后的整体用药情况是否一致，与医疗团队一起对不适当的用药方案进行调整，并做详细全面的记录，从而预防医疗过程中的药物不良事件，保证患者用药安全的过程。这一深入开展的药学服务属于

A: 处方审核

B: 药物重整

C: 药学干预

D: 药物评价

答案：B

35. 脑梗死的分期，恢复期

A: 2~3 个月

B: 15 天

C: 1~6 个月

D: 1 个月内

答案：C

36. 下列关于解热药的使用叙述错误的是

A: 阿司匹林无致畸作用，但由于可导致出血，故不宜在妊娠的最后 2 周使用

B: 退热属对症治疗，可能会掩盖病情

C: 多数宜在餐后服用

D: 应严格掌握用量，避免滥用，老年人应减量

答案：A

37. 患者，女，16 岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为 37.4℃，确诊为尿路感染。

A: 磺胺甲噁唑一甲氧苄啶

B: 诺氟沙星

C: 头孢噻肟

D: 阿莫西林

答案：B

38. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 乙胺丁醇

D: 链霉素

答案：C

39. 为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L, 需要次氯酸钠溶液（有效氯浓度为 6.0%）和纯化水的量分别是（）

A: 830mL 和 9170mL

B: 150mL 和 9850mL

C: 83mL 和 9917mL

D: 120mL 和 9880mL

答案：C

40. 轻度支气管哮喘的临床表现不包括

A: 可有焦虑

B: 步行或上楼时气短

C: 呼吸频率轻度增加，可闻及散在哮鸣音

D: 心率增快 >120 次 / 分

答案：D

41. 妊娠 5 个月后用何种药物会使婴儿牙釉质发育不全，牙齿黄染的抗菌药是

A: 青霉素

B: 四环素类

C: 氟喹诺酮类

D: 大环内酯类

答案：B

42. 与胆酸螯合剂合用，应至少提前 2h 服用的药物是

A: 螺内酯

B: 伊曲康唑

C: 他汀类与烟酸类联用

D: 依折麦布

答案：D

43. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

A: 葡萄球菌

B: 大肠埃希菌

C: 变形杆菌

D: 粪肠球菌

答案：B

44. 患者，女，55 岁，诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是

- A: 7.5mgqw
- B: 7.5mgqd
- C: 7.5mgqod
- D: 7.5mg tid

答案：A

45. 治疗发热成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

- A: 4.5g
- B: 2.5g
- C: 2.0g
- D: 3.0g

答案：C

46. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可以选用的止吐药是

- A: 维生素 B6
- B: 奥美拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 昂丹司琼

答案：D

47. 非糜烂性胃食管反流病的抑酸治疗疗程是

- A: 4 周
- B: 6 周
- C: 3 周
- D: 2 周

答案：A

48. (2017 年真题) 与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是 ()

- A: 维 A 酸片
- B: 非洛地平片
- C: 左旋多巴片
- D: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

答案：B

49. 关于抗抑郁药用药注意事项及患者教育的说法，错误的是

- A: 多种抗抑郁药合并使用，可增加 5-HT 综合征的发生风险
- B: 尽可能采用最小有效剂量
- C: 氟西汀停药 5 周之后才能换用 MAOIs
- D: 联合用药效果好，应为首选

答案：D

50. 白细胞分类中，中性粒细胞参考范围为

- A: 3%~8%
- B: 50%~70%
- C: 1%~5%
- D: 20%~40%

答案：B

51. 非甾体抗炎药的不良反应，可致肝损害，产生黄疸、肝炎

- A: 美洛昔康
- B: 保泰松
- C: 布洛芬
- D: 塞来昔布

答案：B

52. 医师无权调配处方，体现处方的

- A: 经济性
- B: 技术性
- C: 有效性
- D: 法律性

答案：D

53. 脂肪或酪蛋白消化不良（儿童）可呈现

- A: 鲜血便
- B: 乳凝块便
- C: 白陶土便
- D: 柏油黑便

答案：B

54. 患者，女，31 岁，产后 3 个月，哺乳期。因“尿路感染”需给予抗生素治疗，首选的药物是

- A: 阿米卡星
- B: 左氧氟沙星
- C: 头孢曲松
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：C

55. 饮酒过多也可能致命；导致儿童丧生的纯乙醇的量是

- A: 25ml
- B: 20ml
- C: 10ml

D: 15ml

答案：A

56. 患者,男,60 岁,因上臂出现湿疹到药店购药,药师应推荐的药品是()

A: 利巴韦林软膏

B: 特比萘芬乳膏

C: 10%樟脑软膏

D: 氢化可的松软膏

答案：D

57. (2016 年真题) 医师书写处方时经常使用外文缩写, 药师在指导用药时需要准确掌握和解释

A: 立即

B: 右眼

C: 左眼

D: 适量

答案：B

58. (2019 年真题) 患者, 男, 78 岁, 实施右侧髋关节置换术, 术后第 10 日, 患侧下肢出现肿胀、疼痛, 诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是

A: 血凝酶

B: 氯吡格雷

C: 阿司匹林

D: 依诺肝素

答案：D

59. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；可评价为

- A: 可能无关
- B: 待评价
- C: 很可能
- D: 可能

答案：A

60. 医师用药咨询的内容是

- A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- B: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 抗菌药物的合理使用

答案：D

61. （2016 年真题）贫血患者常出现（ ）。

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 血小板计数增多
- D: 中性粒细胞增多

答案：A

62. 使用抗过敏药治疗荨麻疹的患者，拟进行变应原皮试的时间是在

- A: 停用所用药物之后
- B: 停用抗过敏药之后
- C: 停用抗过敏药 36~48 小时后
- D: 停用抗过敏药 48~72 小时后

答案：D

63. 早餐前半小时服用的药物是（）

- A: 雷贝拉唑
- B: 瑞巴派特
- C: 吉法酯
- D: 枸橼酸铋钾

答案：A

64. （2018 年真题）患者，男，16 岁，因急性细菌性扁桃体炎使用青霉素钠治疗，用药前进行青霉素皮试。关于青霉素皮试液浓度和给药方法的说法正确的是（）

- A: 浓度 5000U/ml，肌肉注射 0.1ml
- B: 浓度 500U/ml，肌肉注射 0.1ml
- C: 浓度 5000U/ml，皮内注射 0.1ml
- D: 浓度 500U/ml，皮内注射 0.1ml

答案：D

65. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛。3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 苯溴马隆
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 丙磺舒

答案：C

66. 对 A 组 β 溶血性链球菌有抗菌活性，但由于抗菌谱广，且过度使用可能延迟结核病的诊断，增加结核分枝杆菌对该类药物的耐药性，不建议用于常规治疗的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 克林霉素
- C: 阿莫西林
- D: 莫西沙星

答案：D

67. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次 / 分，律齐，无杂音。

- A: 普萘洛尔
- B: 哌唑嗪
- C: 青霉素
- D: 沙丁胺醇

答案：D

68. 下列属于二级文献的是

- A: 《中国药学年鉴》
- B: 《中国药学杂志》
- C: 《中国药学文摘》
- D: 《化学名词》

答案：C

69. 发热的判断标准是指人体昼夜体温波动超过 1°C ，腋下温度超过

- A: 37.3°C
- B: 36.7°C

C: 37.6℃

D: 37.0℃

答案：D

70. 首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

A: 氯苯那敏胶囊

B: 西替利嗪片

C: 醋酸氟轻松软膏

D: 异丙嗪片

答案：B

71. 可能诱发心脑血管病，引起肝癌、肾癌的是查看材料

A: 精神刺激剂

B: 蛋白同化激素

C: 肽类激素

D: 药品类易制毒化学品

答案：B

72. 因作用弱，常与其他利尿药合用的是

A: 氢氯噻嗪

B: 甘露醇

C: 阿米洛利

D: 呋塞米

答案：C

73. 严重铅中毒患者出现的最难救治的临床症状是

A: 贫血

B: 铅毒性脑病

C: 中毒性肝炎

D: 中毒性肾炎

答案：B

74. 肠外营养液中 1g 脂肪能提供的热量是

A: 4kcal

B: 7kcal

C: 3kcal

D: 9kcal

答案：D

75. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 首选口服补液，必要时静脉补液

B: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充

C: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用

D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用

答案：D

76. 根据循证医学研究，与利尿药和 β 受体拮抗剂相比，硝苯地平可有效降低血压，但可能增加何种危险

A: 肝功能不全

B: 心肌梗死和死亡

C: 心动过缓

D: 肾衰竭

答案：B

77. 属于选择性雌激素调节因子类药物的是

A: 乳酸钙

B: 阿仑膦酸钠

C: 阿法骨化醇

D: 雷洛昔芬

答案：D

78. 运动员禁用药物中， β 受体阻断剂产生的危害是

A: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

B: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

C: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

D: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

答案：C

79. 在治疗沙眼的药物中，对沙眼衣原体有强大的抑制作用的是

A: 酞丁安滴眼剂

B: 金霉素眼膏

C: 硫酸锌滴眼剂

D: 红霉素眼膏

答案：A

80. 洋地黄中毒的特征性表现为

- A: 快速房性心律失常伴传导阻滞
- B: 恶心
- C: 视力模糊
- D: 黄视、绿视

答案：A

81. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg。药师为其推荐碳酸钙(0. 5g / 片)，该患者适宜的用法用量是

- A: 2 片 tid
- B: 1 片 tid
- C: 4 片 qd
- D: 6 片 qd

答案：B

82. II 期临床试验需要多中心试验，即进行试验的医院的数目必须是

- A: 在 1 个及 1 个以上
- B: 在 3 个及 3 个以上
- C: 在 4 个及 4 个以上
- D: 在 2 个及 2 个以上

答案：B

83. 上消化道出血(>50ml)可呈现

- A: 鲜血便
- B: 柏油黑便
- C: 白陶土便
- D: 乳凝块便

答案：B

84. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间是

- A: 3~5 日
- B: 3~7 日
- C: 10 日
- D: 1~3 日

答案：B

85. 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，肌肉痉挛，四肢感觉异常，导致这种症状的药物是

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：A

86. 以下对单纯疱疹的描述错误的是（）

- A: 人与动物为 HSV 的主要自然宿主
- B: HSV 主要存在于感染者的疱疹液、唾液及粪便中
- C: HSV 是双股 DNA 病毒
- D: 分为 HSV- I 型和 HSV- II 型两个血清型

答案：A

87. 碱化尿液，服药期间需监测尿 pH 以调整剂量，防止发生尿酸性肾结石的药物是

- A: 拉布立酶
- B: 枸橼酸氢钾钠

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 苯溴马隆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/688075021042007022>