

中药学 《专业实践能力》试题及答案

一、A 型单选题

1、处方用名为鸡头米，应付规格是 B

- A、生芡实
- B、麸炒芡实
- C、生花椒
- D、炒花椒
- E、炒芥子

2、牛蒡子的应付规格是 A

- A、炒牛蒡子
- B、鼠黏子
- C、大力子
- D、牛蒡子
- E、牛子

3、香薷在炮制时应 B

- A、先煎
- B、后下
- C、包煎
- D、另煎
- E、冲服

4、以下关于处方书写规则说法有误的是 E

- A、每张处方限于一名患者的用药
- B、开具处方后的空白处画一斜线以示处方完毕
- C、开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行
- D、每张处方不得超过 5 种药品
- E、药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写，可使用“遵医嘱”

5、下列可以冲服的是 D

- A、西红花
- B、菊花
- C、藿香
- D、胆矾
- E、徐长卿

6、下列属于药物类药引的是 A

- A、大枣
- B、醋
- C、蛋黄
- D、蜂蜜
- E、茶叶

7、处方前记不包括的内容是 C

- A、开具日期
- B、患者姓名
- C、药品金额
- D、临床诊断
- E、处方编号

8、关于佐药的意义，下列叙述错误的是 E

- A、佐助药能配合君、臣药以加强治疗作用
- B、佐制药用以消除或减弱君、臣药的毒性
- C、佐制药是能制约其峻烈之性的药物
- D、佐助药是能直接治疗各次要病症的药物
- E、反佐药配用与君、臣药性味相同

9、下列不属于中药饮片处方的是 B

- A、煎煮方法
- B、外部包装
- C、名称
- D、用法用量
- E、数量

10、下列道地中药叙述错误的是 A

- A、安徽的杭菊
- B、内蒙古的甘草
- C、河南的菊花
- D、四川的黄连
- E、云南的三七

11、医师开汤剂处方时在某味药的上角或下角处所加的简要要求是 B

- A、药引
- B、处方脚注
- C、处方格式
- D、处方用量
- E、电子处方

12、下列需要先煎的是 D

- A、气味芳香类
- B、含黏液质较多的
- C、胶类
- D、贝壳类
- E、蜜膏类

13、下列药物不需要后下的是 E

- A、青蒿
- B、徐长卿
- C、苦杏仁
- D、大黄
- E、半夏

14、下列不需要包煎的是 A

- A、沉香
- B、车前子
- C、辛夷
- D、蒲黄
- E、儿茶

15、下列不需要泡服的是 E

- A、大青叶
- B、薄荷
- C、蒲公英
- D、麦冬
- E、饴糖

16、关于处方管理制度的书写，错误的是 A

- A、每张处方不得超过 6 种药品
- B、开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行
- C、每张处方限于一名患者的用药
- D、开具处方后的空白处画一斜线以示处方完毕
- E、西药和中成药可以分别开具处方，也可以开具一张处方

17、直接写药物正名，即付漂去咸味的品种是 C

- A、茜草

- B、王不留行
- C、海螵蛸
- D、升麻
- E、地榆

18、仅限于医疗机构内使用的是 B

- A、哌醋甲酯
- B、盐酸哌替啶
- C、青霉素
- D、氯丙嗪
- E、盐酸二氢埃托啡

19、下列不属于五味子处方用名的是 E

- A、北五味
- B、醋五味子
- C、玄及
- D、辽五味子
- E、制五味子

20、普通处方、应急处方、儿科处方应保存的时间为 A

- A、1 年
- B、2 年
- C、3 年
- D、4 年
- E、7 年

21、不属于处方的是 B

- A、经方
- B、土方

- C、单方
- D、时方
- E、秘方

22、药力居处方之首的是 C

- A、佐药
- B、使药
- C、君药
- D、臣药
- E、药引

23、下列不属于“十八反”的是 D

- A、海藻、大戟、芫花不能与甘草合用
- B、半夏、瓜蒌、贝母、白蔹不可与川乌合用
- C、藜芦不能与人参、细辛合用
- D、人参、细辛可以同白芍合用
- E、草乌不可与贝母合用

24、中药配伍禁忌的概念是指 B

- A、也是抑制作用，可以提高药物疗效或减轻药物毒性反应是我们在医疗实践中应该利用的
- B、也是对抗作用，是指两种药物同用后，可能产生对人体有害的作用，在医疗实践中应该尽量避免的，即配伍禁忌
- C、是指一种药物的毒性或副作用，能被另一种药物减轻或消除
- D、是指一种药物能消除或减轻另一种药物的毒性或副作用
- E、是指配合主药，互相增强作用。其性味功用一般有某种共性

25、相恶的意义是 C

- A、一种药物的毒性或副作用，能被另一种药物减轻或消除

- B、即一种药物能消除或减轻另一种药物的毒性或副作用
- C、两种药物的合用能互相抑制、降低或丧失药效
- D、两种药物合用，能产生毒性反应或者副作用
- E、辅药配合主药，互相增强作用

26、相反的意义是 D

- A、一种药物的毒性或副作用，能被另一种药物减轻或消除
- B、一种药物能消除或减轻另一种药物的毒性或副作用
- C、两种药物的合用能互相抑制、降低或丧失药效
- D、两种药物合用，能产生毒性反应或者副作用
- E、辅药配合主药，互相增强作用

27、相杀的意义是 B

- A、一种药物的毒性或副作用能被另一种药物减轻或消除
- B、即一种药物能消除或减轻另一种药物的毒性或副作用
- C、两种药物的合用能互相抑制、降低或丧失药效
- D、两种药物合用，能产生毒性反应或者副作用
- E、辅药配合主药，互相增强作用

28、相畏的意义 B

- A、一种药物能消除或减轻另一种药物的毒性或副作用
- B、一种药物的毒性或副作用，能被另一种药物减轻或消除
- C、辅药配合主药，互相增强作用
- D、两种药物的合用能互相抑制、降低或丧失药效，属配伍禁忌
- E、两种药物合用，能产生毒性反应或者副作用，属配伍禁忌

29、以下不属于“七情”配伍的临床意义的是 E

- A、为相须、相使的配伍关系，因协同作用而扩大其治疗范围，或增强疗效，临床配方时要充分利用

- B、为相畏、相杀的配伍关系，有利于减轻或消除毒性或副作用，在应用毒性药或剧烈药时，必须考虑选用
- C、相恶的配伍关系，能使药物功效降低或损失，用药时应加以注意
- D、相反的配伍关系，能使一些本来单用无害的药物因相互作用而产生毒性反应或副作用，
属于配伍禁忌，原则上应避免使用
- E、无单独应用的方剂

30、“七情”配伍的概念错误的是 E

- A、中药方剂按“君、臣、佐、使”组方原则，就称为“七情”
- B、“七情”可以增加疗效，扩大治疗范围
- C、“七情”配伍有利于减轻或消除毒副作用
- D、“七情”配伍能使单用无害的药物相互作用而产生毒性反应或副作用
- E、“七情”配伍没有单用，都是配伍使用

31. 记载药品质量规格、标准，由政府颁布施行，具有法律约束力的是 B

- A. 制剂
- B. 药典
- C. 中成药
- D. 肘后备急方
- E. 中药制剂手册

32. 我国最早的方剂与制药技术专著是 A

- A. 《汤液经》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《肘后备急方》
- D. 《太平惠民和剂局方》
- E. 《新修本草》

33. 苯甲酸和苯甲酸钠最适宜防腐条件为 A

- A. pH 4 以下
- B. pH 6 以下
- C. pH 7 以下
- D. pH 8 以下
- E. pH 10 以下

34. 适用于热敏性药物和已包装好的药品灭菌 E

- A. 干热空气法
- B. 热压灭菌法
- C. 紫外线灭菌法
- D. 微波灭菌法
- E. 辐射灭菌法

35. 药物有轻质与重质之分，是指 C

- A. 真密度不同
- B. 粒密度不同
- C. 堆密度不同
- D. 空密度不同
- E. 吸湿率不同

36. 有关硫酸阿托品散剂的叙述，错误的是 D

- A. 硫酸阿托品可制成 1：100 倍散剂使用
- B. 制备时可选用胭脂红等食用色素作着色剂
- C. 配制时应采用等量递加法混合
- D. 配制时应采用先制成低共融物，再与其他固体粉末混匀
- E. 分剂量应采用重量法

37. 不属于颗粒剂质量检查项目的是 D

- A. 溶化性
- B. 粒度
- C. 水分
- D. 崩解度
- E. 微生物限度

38. 关于药物在滴丸基质中分散状态的叙述, 错误的是 B

- A. 形成固体溶液
- B. 形成胶团
- C. 形成微细结晶、亚稳定性结晶或无定型粉末
- D. 形成固态凝胶
- E. 形成固态乳剂

39. 将处方部分药材细粉与其余药料制得的稠膏经加工制成的中药片剂称为 E

- A. 提纯片
- B. 全粉末片
- C. 分散片
- D. 全浸膏片
- E. 半浸膏片

40. 关于软膏剂基质的叙述, 正确的是 B

- A. 卡波姆系高级脂肪酸甘油酯及其混合物, 属于水溶性基质
- B. 羊毛脂属于类脂类基质, 吸水性大, 渗透性较好
- C. 凡士林性质稳定, 能与大多数药物配伍, 尤其适用于急性炎性渗出液较多的创面
- D. O/W 型乳剂基质软膏中药物的释放和穿透较快, 适用于各类药物
- E. 聚乙二醇常作为中药油膏的基质

41. 不能破坏或去除热源的方法是 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688111114045006131>