专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年河北省蔚县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题完整题库有答案解析

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.(用药与尿液检查异常)氨苄西林可能引起

A：尿血红蛋白

B：尿肌酐

C：尿酮体

D：尿沉渣结晶

答案：D

2.判断尿路感染是复发还是再感染，多以在停药后几周再发为依据

A：3周

B：4周

C：5周

D：6周

答案：D

3.急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

A：溶栓后24h

B：溶栓前12h

C：溶栓同时

D：溶栓后12h

答案：A

4.药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑ADR时，需要进行因果关系评价

A: 很可能

B: 可能

C: 可能无关

D: 肯定

答案：A

5.卡马西平使环孢菌素疗效降低属于()。

A: 与血浆蛋白结合

B: 作用于同一受体的拮抗作用

C: 酶诱导作用

D: 排泄

答案：C

6.患者男78岁,因心房颤动服用华法林治疗2年余。后因真菌感染使用氟康唑,用药后INR升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是（）

A: 氟康唑可增加华法林的吸收,导致华法林血药浓度升高

B: 氟康唑可抑制CYP2C9,导致华法林血药浓度升高

C: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力,导致血中游离的华法林浓度升高

D: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄,导致华法林血药浓度升高

答案：B

7.患者,男,60岁,因水泡型足癣到药店购药药师应推荐的药品是()

A: 氢化可的松软膏

B: 利巴韦林软膏

C：特比萘芬乳膏

D：10%樟脑软膏

答案：C

8.医师无权调配处方

A：法律性

B：技术性

C：有效性

D：经济性

答案：A

9.不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

A：餐前

B：睡前

C：餐后

D：两餐间

答案：C

10.患者，男，70岁，2周前因缺血性脑卒中人院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

A：氯吡格雷

B：利伐沙班

C：阿司匹林

D：肝素

答案：C

11.儿童退热的用药选择和单次用量,正确的是()

A: 对乙酰氨基酚25~50mg/kg

B: 对乙酰氨基酚10~15mg/kg

C: 阿司匹林30~60mg/kg

D: 布洛芬0.4~0.6g（12岁以上儿童）

答案：B

12.服用磺胺甲噁唑时

A: 宜多饮水

B: 禁吸烟

C: 忌用热水送服

D: 宜少饮水

答案：A

13.适宜于餐前给药的药物是

A: 法莫替丁

B: 复方铝酸铋

C: 缬沙坦

D: 二甲双胍

答案：B

14.药师发药时提示患者“用药期间禁止饮酒或含酒精饮料”，针对的药物是

A: 氟西汀

B: 氯苯那敏

C: 铋制剂

D: 卡托普利

答案：A

15.口服普萘洛尔用于解救的是（）

A：硝西泮中毒

B：氯丙嗪中毒

C：瘦肉精中毒

D：苯丙胺中毒

答案：C

16.与两性霉素B合用需要严密监测血钾

A：酮康唑

B：强心苷

C：碳酸氢钠

D：链霉素

答案：B

17.抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

A：醛类成分

B：烟碱

C：焦油

D：咖啡因

答案：B

18.患者，男，58岁,有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊,开具药品如下:

A：如大便次数规律（如每日1次），聚乙二醇4000散可按需使用

B：阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药

C：美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用

D: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

答案：C

19.以下药物中毒事例中不宜用硫酸镁导泻的是

A: 降糖药中毒

B: 镇静药中毒

C: 解热镇痛药中毒

D: 抗结核药中毒

答案：B

20.患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用4小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病的可能。该病例用药与不良反应的因果关系评价结果是

A: 可能

B: 可能无关

C: 肯定

D: 很可能

答案：D

21.支气管扩张的临床表现是

A: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

B: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

C: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

D: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达2～3个月

答案：B

22.服药饮酒可增加发生胃溃疡出血危险的是

A: 吲哚美辛

B: 甲氨蝶呤

C: 普萘洛尔

D: 格列本脲

答案：A

23.临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

A: 庆大霉素

B: 克林霉素

C: 依替米星

D: 呋喃唑酮

答案：D

24.（2021年真题）避免与辛伐他汀合用的药物是（）

A: 克拉霉素

B: 万古霉素

C: 美罗培南

D: 头孢哌酮

答案：A

25.患者女性，40岁，既往有风湿性心脏病史，近2年来出现劳力性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

A: 硝普钠

B: 卡托普利

C: 西地兰

D: 阿替洛尔

答案：B

26.苯二氮（艹卓）类中毒血压下降时可给予

A: 阿托品

B: 有机硫类

C: 间羟胺

D: 地西泮

答案：C

27.（2019年真题）患者，女，25岁，临床诊断为癫痫，给予丙戊酸钠200mgtid治疗。关于患者用药教育的说法，错误的是

A: 必要时监测血药浓度

B: 发作次数增多时应及时复诊

C: 不要随意增减剂量

D: 应于每日三餐前服用药物

答案：D

28.静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

A: 头孢哌酮

B: 美罗培南

C: 万古霉素

D: 克拉霉素

答案：C

29.舒筋活络酒不宜联用的是

A: 苯巴比妥

B: 氢氧化铝

C: 阿托品

D: 可待因

答案：A

30.治疗严重先兆子痫的首选药物为

A: 美托洛尔

B: 硫酸镁

C: 氢氯噻嗪

D: 依那普利

答案：A

31.可帮助人短时间内急速降低体重

A: 利尿剂

B: 麻醉药品

C: 蛋白同化制剂

D: 肽激素类

答案：A

32.1级高血压标准是

A: 收缩压140～159mmHg和(或)舒张压90～99mmHg

B: 收缩压160～179mmHg和(或)舒张压100～109mmHg

C：收缩压120～139mmHg和(或)舒张压80～89mmHg

D：收缩压≥180mmHg和(或)舒张压≥110mmHg

答案：A

33.下列药物中，可呈现肝药酶抑制作用的是

A：异烟肼

B：利福平

C：苯巴比妥

D：地塞米松

答案：A

34.淋巴细胞正常值参考范围是

A：0.20～0.40

B：0～0.01

C：0.03～0.08

D：0.01～0.05

答案：A

35.下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

A：孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防止胎儿畸形

B：受精后的半个月内几乎见不到药物的致畸作用

C：孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料

D：受精后3周～3个月接触药物最易发生先天畸形

答案：A

36.可显著升高HDL-ch的是

A：他汀类与烟酸联用

B：螺内酯

C：依曲康唑

D：依折麦布

答案：A

37.抗高血压药物属于血管紧张素II受体阻断剂的是（）

A：缬沙坦

B：依那普利

C：氢氯噻嗪

D：氨氯地平

答案：A

38.患者，女，55岁，患骨质疏松症伴食管裂孔疝，该患者避免使用的治疗药是

A：雷洛昔芬

B：鲑鱼降钙素

C：特立帕肽

D：阿仑膦酸钠

答案：D

39.对两种或多种药物治疗方案比较成本，为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息，采用货币为单位。该药物经济学评价方法是

A：最小成本分析

B：成本-效益分析

C：成本-效果分析

D：成本-效用分析

答案：A

40.患者男,65岁,身高170cm,体重60kg,经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率45ml/min),诊断为2型糖尿病、肾功能不全,该患者应首选的药物是

A: 格列吡嗪

B: 格列齐特

C: 格列本脲

D: 格列喹酮

答案：D

41.用于治疗前列腺增生症的高选择性a1A受体阻断剂为

A: 坦索罗辛

B: 托特罗定

C: 索利那新

D: 特拉唑嗪

答案：A

42.由用药顺序确定最可疑致病药物一有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物一根据停药后症状的变化、确诊，即可

A: 追溯用药史；询问用药过敏史和家族史

B: 排除药物以外的因素；必要的实验室检查

C: 流行病学的调查

D: 确定致病药物

答案：D

43.避免与辛伐他汀合用的药物是（）

A: 克拉霉素

B: 美罗培南

C: 头孢哌酮

D: 万古霉素

答案：A

44.高血压患者的降压目标老年高血压（）

A: <140／90mmHg

B: <130／80mmHg

C: <150／90mmHg

D: <120／80mmHg

答案：C

45.需密闭，控制温度，保存中不能受潮的药品

A: 低精蛋白胰岛素注射剂

B: 脂肪乳

C: 胰酶片

D: 利福平片

答案：C

46.可改善体液局部循环，促进药物对病灶的渗透和扩散的蛋白水解酶是

A: 颠茄浸膏片

B: 阿司匹林

C: 菠萝蛋白酶

D: 伪麻黄碱

答案：C

47.非甾体抗炎药的不良反应,可致肝损害，产生黄疸、肝炎

A: 保泰松

B: 布洛芬

C: 美洛昔康

D: 塞来昔布

答案：A

48.作用于有丝分裂M期，干扰微管合成的药物为

A: 卡培他滨

B: 丝裂霉素

C: 紫杉醇

D: 替尼泊苷

答案：C

49.发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

A: 38.1℃～39.0℃

B: 39.1℃～41.0℃

C: 37.4℃～38.0℃

D: 37.0℃～38.3℃

答案：A

50.归属公共网络资源的是

A: www.ashp.org

B: www.googl

C: www.cmt.com.cn

D: www.merck.com

答案：B

51.香豆素类杀鼠药中毒的特效解毒剂是（）

A: 乙酰胺

B: 纳洛酮

C: 青霉胺

D: 维生素K1

答案：D

52.患活动性消化性溃疡，禁用的调脂药是

A: 烟酸类

B: 氯贝丁酯

C: 辛伐他汀

D: 依折麦布

答案：A

53.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛：血常规见WBC15X109／L，中性粒细胞百分比85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 慢性肾盂肾炎

B: 急性肾小球肾炎

C: 急性肾盂肾炎

D: 急性膀胱炎

答案：D

54.羟甲戊二酰辅酶A还原酶抑制剂(他汀类)所导致的药源性损害是

A: 肝脏

B: 胃肠道

C: 肾脏

D: 肺

答案：A

55.6个月～2岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

A: (200～300)×10^9/L

B: (100～300)×10^9/L

C: (11.0～12.0)×109/L

D: (4.0～10.0)×10^9/L

答案：C

56.可作为急性胰腺炎的症状指标是

A: 磷酸激酶降低

B: 磷酸激酶升高

C: 淀粉酶升高

D: 淀粉酶降低

答案：C

57.患者，男，35岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于1日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

A: 碳酸氢钠

B: 双八面体蒙脱石

C: 胰酶片

D: 小檗碱

答案：C

58.患者男,70岁高血压病史14年,服用依那普利20mg/日,平时血压控制不佳今晨大便时突然出现头疼、头晕,随即出现右侧肢体活动不利。血压为190/100mHg，头颅CT检查结果为左侧脑出血,出血量约10ml,拟采用内科治疗,该患者首先应采取的治疗措施是（）

A: 静脉滴注硝酸甘油注射液

B: 静脉滴注甘露醇注射液

C: 口服氨氯地平片

D: 肌内注射利血平注射液

答案：B

59.利血平+氢氯噻嗪

A: 造成听神经和肾功能不可逆性损害

B: 抑制乙醛脱氢酶

C: 产生有利的药物相互作用

D: 抑制氧化代谢反应

答案：C

60.强腐蚀剂中毒

A: 禁止洗胃

B: 不能催吐

C: 不能用强利尿剂

D: 不能导泻

答案：A

61.首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

A: 醋酸氟轻松软膏

B: 异丙嗪片

C: 西替利嗪片

D: 氯苯那敏胶囊

答案：C

62.羧甲基纤维素钠治疗痉挛性便秘，老年人的一日量不宜超过

A: 3g

B: 1g

C: 2g

D: 2.5g

答案：C

63.某患者需要注射维生素B

A: 3/4支

B: 1/2支

C: 1支

D: 3/2支

答案：B

64.禁用或慎用氟喹诺酮类、四环素类、氯霉素、氨基糖苷类，是指

A: 严格掌握适应证

B: 明确诊断

C: 密切监护

D: 严格掌握用药剂量

答案：A

65.可引起药源性肾脏疾病的药物是

A: 含有马兜铃酸的中药

B: 三环类抗抑郁药

C: 异烟肼

D: 吡罗昔康

答案：A

66.患者，男，28岁，近期感觉低热、干咳并带有少量痰液，偶有咯血。经检查确诊为肺结核。治疗前身体检查肝、肾功能正常，无任何眼部疾病。患者在服药治疗期间，发现自己视物逐渐变得模糊，对交通信号灯辨别能力下降，目视前方物体时视野范围比平时减少。导致这一问题的药物应该是

A：乙胺丁醇

B：异烟肼

C：对氨基水杨酸

D：利福平

答案：A

67.透析患者宜在两餐中间服用的药物是

A：磷结合剂

B：维生素D

C：促红细胞生成素

D：铁剂

答案：D

68.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见WBC15×10

A：急性肾盂肾炎

B：急性膀胱炎

C：慢性肾盂肾炎

D：急性肾小球肾炎

答案：A

69.长期服用可导致或加重胃溃疡的药物是

A：质子泵抑制剂

B: NSAID

C: 抗酸剂

D: 米索前列醇

答案：B

70.药师与患者进行沟通时的技巧不包括

A: 尽量使用专业性术语

B: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多

C: 认真聆听，使用通俗易懂的语言

D: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度

答案：A

71.口服避孕药可能导致

A: 血清血红蛋白升高

B: 血清总胆固醇升高

C: 血白细胞减少

D: 血清碱性磷酸酶升高

答案：B

72.开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏反应、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属于用药错误预防策略中的

A: 管理规范到位

B: 科学发展

C: 环境与流程的优化与持续改进

D: 人员培训

答案：C

73.易经乳汁分泌的药物特性是

A: 分子量大

B: 脂溶性高

C: 蛋白结合率高

D: 弱酸性

答案：B

74.铅严重中毒患者出现的最难救治的临床症状是（）

A: 贫血

B: 中毒性肾炎

C: 中毒性肝炎

D: 铅毒性脑病

答案：D

75.患者，男，72岁。体重75kg，1小时前出现右上肢体活动不利，半小时后自行缓解。查体:血压210/90mmHg;检查结果示:糖化血红蛋白9．3%,血肌酐143．2μmo/L。既往有高血压、糖尿病、心病病史。诊断为短暂性脑缺血发作。

A: 阿司匹林联合氯吡格雷

B: 阿司匹林

C: 阿替普酶

D: 氯吡格雷

答案：A

76.提供药师药学服务的重要方式和途径的是

A: 参与临床药物治疗

B: 静脉药物配置

C: 处方调配

D: 治疗药物监测

答案：D

77.稳定型心绞痛的临床表现不包括

A：针刺或刀扎样锐性痛

B：多持续3～5分钟

C：压迫、发闷

D：胸痛

答案：A

78.照料、监督记忆力差的老年患者用药

A：简化治疗方案

B：使用分时药盒和用药记录

C：针对患者生理及心理特点选药

D：使患者了解药物的重要性

答案：B

79.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A：支气管哮喘

B：大叶性肺炎

C：急性心肌炎

D：急性左心衰竭

答案：D

80.瘦肉精（克仑特罗）中毒时，可采用的解毒药是

A：乙酰半胱氨酸

B：氟马西尼

C：乙酰胺

D：普萘洛尔

答案：D

81.药源性疾病一旦确诊，首先应采取的措施是

A：排除致病药物

B：停用致病药物

C：对症治疗

D：拮抗致病药物

答案：B

82.妊娠期尿路感染

A：治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药6周后再次幽现真性细菌尿，菌株与上次不同

B：治疗后症状消失，尿菌阴转后在6周内再出现菌尿，菌种与上次相同

C：患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数>10scfu/ml

D：宜选用毒性小的抗菌药物

答案：D

83.以下关于抑郁症的介绍错误的是

A：抑郁症的好发年龄在20～50岁

B：该病具有高发病、高复发、高致残的特点

C：及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

D：抑郁症的病因明确

答案：D

84.属于 β 受体激动剂的是

A：异丙托溴铵

B：美托洛尔

C：福莫特罗

D：乙酰胆碱

答案：C

85.可主要引起淋巴细胞增多的疾病为

A：过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

B：胃溃疡

C：肾移植术后发生排斥反应

D：糖尿病

答案：C

86.下列药物在服用时宜多喝水的是

A：利胆药

B：硝酸甘油

C：去氨升压素

D：止咳糖浆

答案：A

87.药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

A：索引的完备程度

B：检索路径及费用

C：引用参考文献的质量

D: 出版或更新的频率

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/688117017044007022