

2024 年甘肃省庄浪县《执业药师之西药学专业二》资格考试题库大全附参考答案（A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下为广谱抗病毒药的是

- A: 利巴韦林
- B: 阿糖腺苷
- C: 碘苷
- D: 更昔洛韦

答案：A

2. 氨茶碱的作用特点是

- A: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效
- B: $10 \mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度， $15-20 \mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应
- C: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿
- D: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗

答案：B

3. 可用于配合防治肝性脑病的泻药为

- A: 乳果糖
- B: 甘油
- C: 硫酸镁
- D: 酚酞

答案：A

4. (2016 年真题) 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A: 氟他胺
- B: 他莫昔芬
- C: 托瑞米芬
- D: 乙烯雌酚

答案：A

5. 痛风缓解期(关节炎症控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是()。

- A: 布洛芬
- B: 泼尼松龙
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：D

6. 调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

- A: 碳酸氢钠
- B: 乳酸钠
- C: 氯化钠
- D: 氯化铵

答案：A

7. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- B: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水

C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

D: 服药过程中适当补充维生素 B12

答案：B

8. 以下使用雌激素类药物的方法错误的是

A: 有子宫的女性在周期的最后 5~7 日加用孕激素

B: 男性患者采用周期性治疗。即用药 3 周后停药 1 周

C: 应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应

D: 女性子宫切除后患者采用周期性治疗，即用药 3 周后停药 1 周

答案：A

9. 能减弱双香豆素类抗凝血作用的药物是

A: 广谱抗生素

B: 阿司匹林

C: 苯巴比妥

D: 甲苯磺丁脲

答案：C

10. 患者男性，26 岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

。

A: 四环素

B: 链霉素

C: 氯霉素

D: 青霉素

答案：A

11. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 蒙脱石
- B: 洛哌丁胺
- C: 双歧杆菌三联活菌
- D: 口服补液盐

答案：B

12. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应()

- A: 白细胞减少
- B: 中枢神经系统毒性
- C: 眼部水肿
- D: 肝脏损害

答案：B

13. 糖尿病合并心血管疾病者可选用()

- A: 胰岛素
- B: 格列喹酮
- C: 格列吡嗪
- D: 格列齐特

答案：C

14. 下述属于 β 受体阻断剂禁忌证的是

- A: 虹膜睫状体炎患者禁用
- B: 不适用于先天性青光眼患者
- C: 心动过缓、房室传导阻滞患者禁用
- D: 甲状腺功能亢进患者禁用

答案：C

15. 对军团菌有效的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 两性霉素 B
- C: 甲硝唑
- D: 链霉素

答案：A

16. 可使人体对维生素 B

- A: 异烟肼
- B: 雌激素
- C: 丙磺舒
- D: 糖皮质激素

答案：C

17. 老年人对苯二氮（𠂇卓）类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为

- A: “宿醉”现象
- B: 震颤麻痹综合征
- C: 戒断综合征
- D: 老年期痴呆

答案：A

18. 口服可用于肠道感染的药物是

- A: 链霉素
- B: 妥布霉素
- C: 庆大霉素

D: 奈替米星

答案: C

19. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌证()

A: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者

B: 心力衰竭患者

C: 有子宫内膜癌症状和体征者

D: 肝、肾功能不全者

答案: B

20. 氯霉素的下述不良反应中，哪项是与剂量和疗程无关的严重反应

A: 可逆的各类血细胞减少

B: 二重感染

C: 不可逆的再生障碍性贫血

D: 灰婴综合征

答案: C

21. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

A: 异维 A 酸

B: 维 A 酸

C: 阿达帕林

D: 过氧苯甲酰

答案: A

22. 出现流感样综合征，寒战、发热的药物是()

A: 链霉素

B: 对氨基水杨酸

C: 利福平

D: 异烟肼

答案: C

23. (2018 年真题) 用于治疗疥疮的药物有 ()

A: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

B: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

C: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

D: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

答案: C

24. 水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是 ()

A: 洛伐他汀

B: 普伐他汀

C: 氟伐他汀

D: 辛伐他汀

答案: B

25. 奥美拉唑治疗消化性溃疡病的机制是 ()

A: 抗幽门螺杆菌

B: 抑制胃壁细胞的 H

C: 阻断 CTZ 的 D

D: 阻断 H

答案: B

26. 治疗慢性失血 (如内痔出血) 所致的贫血应选用

- A: 谷维素
- B: 叶酸
- C: 维生素 B
- D: 硫酸亚铁

答案：D

27. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是()。

- A: 噻吗洛尔
- B: 毛果芸香碱
- C: 乙酰唑胺
- D: 甘露醇

答案：B

28. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

- A: 整合素受体阻断剂
- B: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- C: 环氧酶抑制剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

29. 不耐酸，口服剂型多制成酯化物，为肝药酶抑制剂的药物是

- A: 红霉素
- B: 克拉霉素
- C: 氨曲南
- D: 克林霉素

答案：A

30. 治疗子宫内膜异位症的药物是

- A: 氯地孕酮
- B: 他达拉非
- C: 达那唑
- D: 左炔诺孕酮

答案：C

31. 具有抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 碳酸氢钠
- B: 莫沙必利
- C: 西沙必利
- D: 奥美拉唑

答案：D

32. 用于抢救肝素所致严重出血的药物是

- A: 对羧基苄胺
- B: 维生素 K
- C: 亚叶酸钙
- D: 硫酸鱼精蛋白

答案：D

33. 用于成人非瓣性房颤患者的卒中和全身栓塞，治疗深静脉血栓形成，解救药可用艾达司珠单抗的是

- A: 依达肝素
- B: 华法林
- C: 达比加群酯
- D: 肝素

答案：C

34. 维生素 K 为

- A: 抗贫血药
- B: 抗血小板药
- C: 抗出血药
- D: 抗凝血药

答案：C

35. 大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

- A: 小檗碱
- B: 利奈唑胺
- C: 夫西地酸
- D: 磷霉素

答案：C

36. 与卡比马唑合用应谨慎的是

- A: 甲状腺素
- B: 糖皮质激素
- C: 放射性碘
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：C

37. 乙胺丁醇用于

- A: 8 岁以上儿童及成人
- B: 6 岁以上儿童及成人
- C: 10 岁以上儿童及成人
- D: 13 岁以上儿童及成人

答案：D

38. 抑制胰岛素释放和组织对葡萄糖的利用，升高血糖的是()

- A: 氨苯蝶啶
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：B

39. (2017 年真题) 可导致新生儿药物性黄疸的是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 林可霉素
- C: 阿莫西林
- D: 兴孢他啶

答案：A

40. 用 1%麻黄碱液滴鼻的主要目的是()

- A: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流
- B: 收缩血管，减轻炎症反应
- C: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌
- D: 收缩血管，降低其通透性

答案：A

41. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时,接听病房咨询电话,得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者,出现高热、肺纹加重,患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 头孢曲松
- B: 替考拉宁
- C: 头孢哌酮
- D: 阿米卡星

答案：B

42. (2021 年真题) 作用机制为抑制合成嘧啶的二氢乳酸脱氢酶，半衰期较长，建议间隔 24 小时给药一次的慢作用抗风湿药物是 ()

- A: 羟氯喹
- B: 来氟米特
- C: 甲氨蝶呤
- D: 柳氮磺吡啶

答案：B

43. 可导致视神经炎，治疗期间应监测眼部视力的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福喷丁

答案：B

44. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

- A: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成
- B: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成
- C: 干扰 DNA 的合成
- D: 干扰细菌细胞壁合成

答案：D

45. (2021 年真题) 可用于治疗蛔虫病、蛲虫病、钩虫病和鞭虫病的广谱驱虫药物是 ()

- A: 甲硝唑

B: 甲苯咪唑

C: 乙胺嗪

D: 氯硝柳胺

答案: B

46. 属于电解质补充药,可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是()

A: 多烯磷脂酰胆

B: 双环醇

C: 异甘草酸镁

D: 门冬氨酸钾镁

答案: D

47. 存在低度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 多西他赛

B: 卡莫司汀

C: 表柔比星

D: 泼尼松

答案: A

48. 头孢拉定()

A: 脑脊液中浓度较高,酶稳定性高,适用于严重脑膜感染

B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

C: 肾毒性大

D: 口服,肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

答案: C

49. 患者男性，26 岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

- A: 二重感染
- B: 肝脏损害
- C: 过敏反应
- D: 胃肠道反应

答案：A

50. 下述药物中，不属于促动力药的是

- A: 氢氧化铝
- B: 甲氧氯普胺
- C: 莫沙必利
- D: 多潘立酮

答案：A

51. 噻嗪类利尿药略增加 HCO_3^- 的排泄，是因为其可以抑制

- A: 磷酸二酯酶
- B: 碳酸酐酶
- C: Na^+-Cl^- 共转运子
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

答案：B

52. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 新霉素
- B: 庆大霉素
- C: 妥布霉素
- D: 异烟肼

答案：B

53. 促进房水流出和减少房水生成的是

- A: α_2 受体激动剂
- B: 前列腺素衍生物
- C: 拟胆碱药
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：A

54. 主要降低血中胆固醇且具有首过效应的是

- A: 普萘洛尔
- B: 氯贝丁酯
- C: 苯扎贝特
- D: 洛伐他汀

答案：D

55. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

- A: 血氯
- B: 血钙
- C: 血钠
- D: 血钾

答案：D

56. (2017 年真题) 奎宁或氯喹日剂量超过 1g 或持续长时间应用，可见耳鸣、头疼、视力与听力减退等，停药后即可恢复，临床成为 ()

- A: 双硫仑样反应
- B: 神经毒性反应

C: 郝氏反应

D: 金鸡纳反应

答案: D

57. 属于凝血因子 Xa 直接抑制剂的是

A: 利伐沙班

B: 依诺肝素

C: 肝素

D: 华法林

答案: A

58. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A: 氨苯蝶啶

B: 呋塞米

C: 乙酰唑胺

D: 呋达帕胺

答案: B

59. 氨基糖苷类作用机制

A: 干扰细菌核酸代谢

B: 抑制细菌细胞壁合成

C: 抑制细菌蛋白质合成

D: 抑制细菌糖代谢

答案: C

60. 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是()。

- A: 唑吡坦
- B: 佐匹克隆
- C: 苯巴比妥
- D: 地西洋

答案：C

61. 用于先兆性流产和习惯性流产

- A: 雷洛昔分
- B: 黄体酮
- C: 地塞米松
- D: 米非司酮

答案：B

62. 奥司他韦治疗流行性感冒时，首次用药的时间是

- A: 出现流感症状 48 小时内
- B: 出现流感症状 72 小时内
- C: 出现流感症状 100 小时内
- D: 出现流感症状 96 小时内

答案：A

63. 对丙咪嗪过敏的患者禁用

- A: 氨己烯酸
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 卡马西平

答案：D

64. 关于哌替啶下列说法错误的是

- A: 本品务必在单胺氧化酶抑制剂停用 14 日以上方可给药
- B: 本品与芬太尼可交叉过敏
- C: 产妇分娩镇痛时及哺乳期间用量酌减
- D: 未明确诊断的疼痛，可以使用本品

答案：D

65. (2018 年真题) 肾结石患者禁用的药物是 ()

- A: 非布索坦
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：B

66. 维生素 A 缺乏时引起

- A: 角膜软化症
- B: 脚气病
- C: 成人佝偻病
- D: 坏血病

答案：A

67. 早产儿、新生儿禁用 ()

- A: 氯霉素
- B: 夫西地酸
- C: 四环素可的松
- D: 利福平

答案：A

68. 考来替泊的降脂作用机制主要是

- A: 增加脂蛋白酶活性
- B: 阻滞胆汁酸在肠道的重吸收
- C: 抑制脂肪分解
- D: 抑制细胞对 LDL 的修饰

答案：B

69. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是()

- A: 长春瑞滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 吉西他滨
- D: 巯嘌呤

答案：C

70. 叶酸主要用于治疗

- A: 妊娠期巨幼红细胞性贫血
- B: 缺铁性贫血
- C: 溶血性贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案：A

71. 双环醇片作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- B: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- C: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

D: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

答案：D

72.（2017 年真题）导致视神经炎的抗结核药的是（）

A: 利福喷丁

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案：D

73. 用于青春期前隐睾症的诊断和治疗的是

A: 米非司酮

B: 绒促性素

C: 噻啉啉

D: 硝苯地平

答案：B

74. 耐酸耐酶的青霉素是

A: 双氯西林

B: 青霉素 V

C: 氨苄西林

D: 羧苄西林

答案：A

75. 患者，男性，45 岁。有支气管哮喘病史 20 余年。因阵发性室上性心动过速入院治疗，出院后又多次发作，应选用预防反复发作的治疗药物是

A: 美西律

- B: 维拉帕米
- C: 利多卡因
- D: 普萘洛尔

答案: B

76. 连续应用易产生耐受性的是

- A: 普萘洛尔
- B: 地尔硫
- C: 硝酸甘油
- D: 硝苯地平

答案: C

77. 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 为了加强疗效，可以一日多次给药
- B: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用
- C: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用
- D: 不宜用于皮肤皱褶部位

答案: A

78. 以下维生素在注射前需要进行皮肤敏感试验的是

- A: 维生素 B6
- B: 维生素
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 B1

答案: D

79. 咪唑类药物的抗真菌作用机制是()

- A: 影响真菌细胞膜通透性
- B: 影响二氢叶酸合成
- C: 抑制以 DNA 为模板的 RNA 多聚酶，阻碍 mRNA 合成
- D: 竞争性抑制鸟嘌呤进入 DNA 分子中，阻断核酸合成

答案：A

80. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D

- A: 多潘立酮
- B: 莫沙必利
- C: 昂丹司琼
- D: 甲氧氯普胺

答案：A

81. (2017 年真题) 重症肌无力、癫痫禁用的 ()

- A: 米诺环素
- B: 左氧氟沙星
- C: 哌拉西林
- D: 甲硝唑

答案：B

82. 特比萘芬临床上作为 () 的首选药

- A: 曲霉病
- B: 孢子丝菌病
- C: 着色芽生菌病
- D: 皮肤癣菌病

答案：D

83. 金刚烷胺和美金刚合用

- A: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- B: 增加肾毒性
- C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- D: 增加锥体外系不良反应的风险

答案：C

84. 用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘，也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 茶碱
- D: 沙丁胺醇

答案：A

85. 对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

- A: 乳膏剂
- B: 粉剂
- C: 洗剂
- D: 油剂

答案：A

86. (2020 年真题) 抗血小板药西洛他唑属于

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 整合素受体阻断剂
- C: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- D: 维生素 K 拮抗剂

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/695011034121012033>