

## 2023-24 年山东省曹县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库及参考答案（黄金题型）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，×线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

- A: 定期随诊，监测血常规和肝肾功能
- B: 应全程督导服药，提高用药的依从性
- C: 由于增加不良反应，不提倡联合用药
- D: 肺结核属于传染病，患者咳嗽、打喷嚏和高声讲话时不能直向旁人

答案：C

2. 属于治疗沙眼的处方药的是

- A: 磺胺醋酰钠滴眼剂
- B: 硫酸锌滴眼剂
- C: 硫酸铜棒
- D: 红霉素眼膏

答案：C

3. 可作为根除幽门螺杆菌感染的一线治疗方案是：

- A: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgqd+阿莫西林 0.5gtid
- B: 埃索美拉唑 20mgqd+克拉霉素 1.0gqd+枸橼酸铋钾 0.6gbid
- C: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgbid+阿莫西林 1.0gbid+枸橼酸铋钾 0.6gbid

D: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mg tid+枸橼酸铋钾 0.6gbid

**答案：C**

4. (2015 年真题) 非甾体抗炎药引起的典型药源性疾病是 ( )。

A: 血液系统疾病

B: 神经系统疾病

C: 胃肠类疾病

D: 肝病

**答案：C**

5. 头孢曲松

A: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫

B: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

C: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药

D: 与呋塞米合用可加重肾功能损害

**答案：C**

6. 儿科用药中，对新生儿或婴儿最常用的给药途径是

A: 肌肉注射

B: 静脉注射

C: 口服给药

D: 静脉滴注

**答案：D**

7. (2015 年真题) 格列齐特片的适宜服药时间是 ( )。

A: 清晨

B: 餐前

C: 餐中

D: 餐后

**答案: B**

8. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据的是

A: 尿沉渣白细胞

B: 尿沉渣磷酸盐

C: 尿沉渣管型

D: 尿沉渣结晶

**答案: C**

9. 患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 羧甲司坦

B: 右美沙芬

C: 可待因

D: 喷托维林

**答案: C**

10. 患者，男性，35 岁，因间断上腹痛 5 年、加重 1 周来诊。患者自 5 年前开始间断出现上腹胀痛，空腹时明显，进食后可自行缓解，有时夜间痛醒，无放射痛，有暖气和反酸，常因进食不当或生气时诱发，每年冬春季节易发病。1 周前因吃凉白薯后病情再犯，腹痛较前加重。发病以来无恶心、呕吐和呕血，饮食尚可，二便正常，无便血和黑便，体重无明显变化。既往体健，无肝肾疾病及胆囊炎和胆石症病史，无手术、外伤和药物过敏史，无烟酒嗜好。

A: 克拉霉素对 Hp 治疗有效，但对于患有心律失常的患者应权衡利弊、慎重使用

B: 服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充维生素 B12

C: 患者长期服用消化性溃疡治疗药物抗酸剂和铋剂，如因骨折住院后仍需继续服用

D: 溃疡活动期应停用胃黏膜损害药物

**答案: C**

11. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 4 周

B: 优先选择法莫替丁 20mgbid，疗程 8 周

C: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 6 周

D: 优先选择法莫替丁 20mgqn，疗程 8 周

**答案: A**

12. 美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于（）。

A: 排泄

B: 酶诱导作用

C: 作用于同一受体的拮抗作用

D: 与血浆蛋白结合

**答案: C**

13. 下列医学检查项目中，可用于诊断急性心肌梗死的是

A: 尿淀粉酶

B: 血淀粉酶

C: 肌酸激酶增高

D: 淀粉酶增高

**答案: C**

14. 治疗皮肤疾病适宜选择

A: 栓剂

B: 软膏剂

C: 注射剂

D: 片剂

**答案: B**

15. 患者，女，45 岁，常有上腹部饱胀、恶心、食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物是

A: 干酵母片

B: 蒙脱石散

C: 复方阿嗝米特肠溶片

D: 奥美拉唑肠溶胶囊

**答案: A**

16. 具有留钾作用的利尿药是

A: 乙酰唑胺

B: 阿米洛利

C: 坦洛新

D: 非那雄胺

**答案：B**

17. 下列药物信息源中，归属一级文献资料的是

A: 中国药学年鉴

B: 新编药理学

C: 中国药学文摘

D: 中国药学杂志

**答案：D**

18. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为（）

A: 溶栓 12h 后

B: 溶栓 24h 后

C: 溶栓的同时

D: 溶栓 12h 前

**答案：B**

19. 下列关于烫伤救治措施的说送正确的是()

A: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染

B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染

C: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

D: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪

**答案：C**

20. 长期应用可引起维生素 K 缺乏的药物是

A: 头孢菌素类药物

B: 顺 f 铂

C: 三环类抗抑郁药

D: 格列喹酮

**答案：A**

21. 一级信息源资料的最突出的特点是

A: 提供的信息丰富、详实

B: 查阅时需要利用所提供参考文献去验证

C: 内容广泛、使用方便

D: 提供的信息最新

**答案：D**

22. 患者，男，60 岁，从晨起后收缩压和舒张压迅速升高，在上午 9～10 时达到高峰，而晚上开始降低，于睡眠时降至低谷。那么该患者应用降压药时，关于用药时间的说法，正确的是

A: 一般每日仅服一次长效抗高血压药如氨氯地平且以晚上 7 时左右为最佳服用时间

B: 一般每日需要服用长效抗高血压药如氨氯地平 2 次，早、晚各一次最好

C: 一般每日仅服一次长效抗高血压药如氨氯地平且以清晨 7 时左右为最佳服用时间

D: 一般每日晚上睡前服抗高血压药，服用培哌普利、氨氯地平、左旋氨氯地平等

**答案：C**

23. 心力衰竭的常用药方案是

A: 醛固酮受体阻断剂+ $\alpha$  受体阻断剂+B 受体阻断剂

B: 醛固酮受体阻断剂+ $\beta$  受体阻断剂+强心苷类

C: 醛固酮受体阻断剂+ $\alpha$  受体阻断剂+钙通道阻滞剂

D: 醛固酮受体阻断剂+ $\beta$  受体阻断剂+ACEI

**答案：D**

24. 病例系列研究试验结果属于循证医学证据级别的

A: 3 级证据

B: 4 级证据

C: 2 级证据

D: 1 级证据

**答案：B**

25. 对有过敏倾向和特异体质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

A: 了解患者及家族的过敏史

B: 注意药物的迟发反应

C: 注意定期监测器官功能

D: 注意特殊人群用药

**答案：A**

26. 能抑制性腺，造成男性不育和女性闭经的抗风湿药物是

A: 白芍总苷

B: 肿瘤坏死因子(TNF- $\alpha$ )拮抗剂

C: 雷公藤多苷

D: 青藤碱

**答案：C**

27. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价。试验对象主要为健康受试者，样本数一般只有

A: 20~30 例

B: 20~24 例

C: 10~18 例

D: 12~13 例

**答案：A**

28. 某女孩，6 岁，2 个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落。但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

A: 肝功能

B: 肾功能

C: 血糖

D: 血尿酸

**答案：A**

29. 属于苯二氮革类药物的是

A: 丁螺环酮

B: 阿米替林

C: 舍曲林

D: 艾司唑仑

**答案：D**

30. 肠外营养 1g 脂肪能提供的热量是

A: 7kcal

B: 4kcal

C: 3kcal

D: 9kcal

**答案：D**

31. 下列药物中，可影响性功能的药物为

- A: 雷尼替丁
- B: 泮托拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 西咪替丁

**答案：D**

32. 患者女,55 岁,因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体:体温 38℃中上及左上腹有压痛。化验结果:白细胞计数  $18.7 \times 10^9/L$ ,血清淀粉酶 1993U/L,血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是 ( )

- A: 急性胃炎
- B: 急性阑尾炎
- C: 急性胆囊炎
- D: 急性胰腺炎

**答案：D**

33. 在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是

- A: 注射剂配制溶媒、浓度
- B: 合理用药信息
- C: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效
- D: 用药后预计起效时间、维持时间及疗效

**答案：B**

34. 口服避孕药中雌激素对机体代谢的影响，正确的为

- A: 甘油三酯降低
- B: 低密度脂蛋白胆固醇升高
- C: 高密度脂蛋白胆固醇降低
- D: 糖耐量异常

**答案：D**

35. (2015 年真题) 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是 ( )。

- A: 骨质疏松症或骨折
- B: 横纹肌溶解或肌痛
- C: 间质性肾炎或肾结石
- D: 骨骼发育不良或骨软化

**答案：C**

36. 须在凉暗处保存的常用药品是

- A: 硫酸阿托品
- B: 多巴胺
- C: 复方甘草合剂
- D: 双歧三联活菌制剂

**答案：C**

37. 以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是

- A: 红霉素眼膏
- B: 酞丁安滴眼剂
- C: 硫酸锌滴眼剂
- D: 2%硝酸银

**答案：D**

38. 患者，女，61 岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

- A: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱
- B: 停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱

C: 减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

D: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚

**答案：C**

39. 急性黄疸型肝炎患者尿常规检查可发现

A: 尿胆红素阳性

B: 尿淀粉酶增高

C: 尿葡萄糖阳性

D: 尿血红蛋白阳性

**答案：A**

40. 视疲劳所呈现的显著的临床特征是

A: 眼睑沉重、痉挛

B: 泪液减少

C: 复视

D: 视物时症状加重

**答案：D**

41. 患者，男，53 岁，季节性过敏性鼻炎病史 5 年，3 天前，受凉后出现流涕、鼻塞、咳嗽，咳痰，低热，头痛，无胸闷、气短等其他不适，已在医院发热门诊完成了鼻拭子检查，排除了甲型流感和 Z 型流感，诊断为普通感冒。

A: 鼻用减充血剂

B: 解热镇痛药

C: 含伪麻黄碱的复方抗感冒药

D: 神经氨酸酶抑制剂

**答案：D**

42. 患者，男，28 岁，近期感觉低热、干咳并带有少量痰液，偶有咯血。经检查确诊为肺结核。治疗前身体检查肝、肾功能正常，无任何眼部疾病。患者在服药治疗期间，发现自己视物逐渐变得模糊，对交通信号灯辨别能力下降，目视前方物体时视野范围比平时减少。导致这一问题的药物应该是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 异烟肼

**答案：B**

43. “冷处”所指温度范围是

- A: 2℃～10℃
- B: 10℃～30℃
- C: 2℃～4℃
- D: -5℃～10℃

**答案：A**

44. 药名词干为“-penem”的药品是

- A: #NAME?
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

**答案：D**

45. 治疗心力衰竭时，可抑制心肌重构和心肌纤维化的治疗药物不包括

- A: 醛固酮受体阻断剂
- B: 血管紧张素 II 受体阻断剂

C: 血管紧张素转换酶抑制剂

D: 强心苷类药物

**答案：D**

46. 提示"每次用药前检查药品外观有无变化，发现异常立即停用"，是针对

A: 药品有效期

B: 特殊剂型用法

C: 药品贮存

D: 特殊装置药品

**答案：C**

47. 可能导致血小板 (PLT) 计数减少的药物是

A: 阿司匹林

B: 苯妥英钠

C: 胰岛素

D: 氯氮平

**答案：A**

48. 可治疗原发性痛经的药物是

A: 前列腺素类似物

B: 钙通道阻滞剂

C: 非甾体抗炎药

D: 肾上腺糖皮质激素

**答案：C**

49. 《中华人民共和国药典》、国家食品药品监督管理局颁布标准收录的处方属于

- A: 医师处方?
- B: 法定处方?
- C: 急诊处方?
- D: 普通处方?

**答案: B**

50. (2019 年真题) 关于口腔溃疡药物治疗的说法, 错误的是

- A: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷, 一日 3 次, 稍加按摩
- B: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合
- C: 氯己定含漱液, 每次 15-20ml, 一日 2~3 次, 含漱
- D: 西地碘含片, 一次 6mg, 一日 4 次, 含服

**答案: D**

51. 以下药物中毒事例中不宜用硫酸镁导泻的是

- A: 抗结核药中毒
- B: 降糖药中毒
- C: 镇静药中毒
- D: 解热镇痛药中毒

**答案: C**

52. 妊娠期妇女用药应该格外谨慎, 在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同, 一般情况下, 用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 21 天之内
- B: 18 天之内
- C: 3 个月之后
- D: 28 天之内

**答案: B**

53. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片
- B: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- C: 停用二甲双胍肠溶片
- D: 停用阿托伐他汀钙片

**答案：D**

54. 枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

- A: 皮炎
- B: 腹痛
- C: 性功能减退
- D: 神经毒性

**答案：D**

55. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏证、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属

- A: 科学发展
- B: 环境与流程的优化与持续改进
- C: 知识培训
- D: 管理规范到位

**答案：B**

56. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息} 中国药学会的网址是

- A: www. cp
- B: org. cn

C: www. cm

D: org. cn

**答案：D**

57. 下列药物中，可引起黑便的药物为（）

A: 枸橼酸铋钾

B: 铝碳酸镁

C: 复方氢氧化铝

D: 硫糖铝片

**答案：A**

58. 良性前列腺增生症老年患者应用  $\alpha 1$  肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是()

A: 乳腺增生

B: 干咳

C: 尿潴留

D: 体位性低血压

**答案：D**

59. （2018 年真题）患者，男，65 岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况，药师提出的合理化药物治疗建议，不包括（）

A: 患者在复律成功后，尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

B: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性，在逐渐降低胺碘酮剂量的时候，注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

C: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6, 减慢美托洛尔的代谢, 应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

D: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用, 建议换成氨氯地平或 CCB 降压药

**答案: D**

60. 用药与反应发生时间关系密切, 有文献资料佐证; 但引发 ADR 的药品不止一种, 或原患疾病病情进展因素不能除外; ADR 因果关系可评价为

A: 待评价

B: 可能

C: 可能无关

D: 很可能

**答案: B**

61. 血管紧张素 II 受体阻断剂

A: 依那普利

B: 氨氯地平

C: 缬沙坦

D: 氢氯噻嗪

**答案: C**

62. 关于血清尿素氮和血肌酐的叙述正确的是

A: 通过测定尿素氮可了解肾小球的滤过功能

B: 血肌酐的浓度会受到饮食、高分子代谢等肾外因素的影响

C: 血清尿素氮主要经肾小管分泌而随尿液排出体外

D: 当肾实质受损害时, 可使血液中血清尿素氮的水平降低

**答案: A**

63. 《国家非处方药目录》收载的缓泻药不包括

- A: 比沙可啶
- B: 聚乙二醇粉剂
- C: 替加色罗
- D: 硫酸镁

**答案：C**

64. 口服铁剂宜选用

- A: 1 价铁
- B: 2 价铁
- C: 3 价铁
- D: 4 价铁

**答案：B**

65. 用于口服后吸收迅速而完全，解热镇痛作用明显的非处方药是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 谷维素
- C: 阿司匹林
- D: 布洛芬

**答案：C**

66. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 馒头
- B: 无糖饼干

C: 葡萄糖

D: 蔗糖

**答案：C**

67. 转复并维持窦性心律

A: 多非利特

B: 血凝酶

C: 华法林

D: 硝苯地平

**答案：A**

68. 依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选()。

A: 苯丙哌林

B: 吗啡

C: 可待因

D: 右美沙芬

**答案：D**

69. 服用伐地那非后，如果舌下含服硝酸异山梨酯，建议服药间隔时间应为

A: 48 小时

B: 1 周

C: 24 小时

D: 4 小时

**答案：C**

70. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

- A: 血压升高
- B: 出现蛋白尿
- C: 嗜睡
- D: 痛风急性发作

**答案：D**

71. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A: 大肠埃希菌
- B: 葡萄球菌
- C: 粪肠球菌
- D: 变形杆菌

**答案：A**

72. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径，半衰期 12h 的药物通常选择()

- A: 静脉滴注给药
- B: 每日给药 1 次
- C: 2~3 个半衰期给药 1 次
- D: 每个半衰期给药 1 次

**答案：D**

73. 血红蛋白检查结果低于正常值即提示贫血。下列检测值可提示“极重度贫血”的是

- A: 60~90g/L
- B: >90g / L

C: 30~60g/L

D: <30g / L

**答案：D**

74. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9$  / L，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

B: 首选针对革兰阳性菌的药物

C: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林

D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

**答案：B**

75. 患者，女 67 岁出现认知功能障碍 5 年，诊断为阿尔茨海默病，予以美金刚治疗。下列药物中，可增加美金刚血药浓度的是（）

A: 碳酸氢钠

B: CYP3A4 制剂

C: CYP2D6 抑制剂

D: 氯化铵

**答案：A**

76. 血液制品应放在（）。

A: 常温库

B: 专用仓库

C: 低温库

D: 凉暗库

**答案：C**

77. (血常规检查异常的病症)恶性肿瘤

- A: 白细胞增多
- B: 血小板增多
- C: 红细胞沉降率减慢
- D: 淋巴细胞增多

**答案：A**

78. 血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

- A: 2
- B: >1.5
- C: <0.8
- D: 0.8~1.5

**答案：D**

79. 患者，女，22岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏90次/分，呼吸24次/分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC $11 \times 10^9$ /L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后2天，体温恢复正常，咳痰减少。

- A: 医院获得性肺炎
- B: 社区获得性肺炎
- C: 支气管炎
- D: 慢性阻塞性肺病

**答案：B**

80. “将药物治疗的成本与所产生的效益归化为以货币为单位的数字，用以评估药物治疗方案的经济性”是指查看材料

- A: 成本一效益分析方法
- B: 最大效果分析方法
- C: 成本一效用分析方法
- D: 最小成本分析方法

**答案：A**

81. 以下"规范应用白三烯受体拮抗剂治疗慢性阻塞性肺疾病"的叙述中，不正确的是

- A: 在治疗 COPD 时不宜单独应用
- B: 不宜首选治疗急性哮喘
- C: 不宜用于急性发作
- D: 不适用于轻、中度哮喘和稳定期的控制

**答案：D**

82. 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是()

- A: 头孢克洛
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 阿莫西林
- D: 诺氟沙星

**答案：B**

83. 出血性脑血管病降低颅内压的首选药物为

- A: 甘油果糖
- B: 尼莫地平
- C: 呋塞米
- D: 泼尼松

**答案：A**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/696003100111011030>