

## 2024 年广东省斗门区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试完整版含答案【夺分金卷】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 二巯丙醇用于解救的是（）

- A: 有机磷中毒
- B: 汞中毒
- C: 三唑仑中毒
- D: 氰化物中毒

答案：B

2. 可加重帕金森的是

- A: 地西泮
- B: 氯苯那敏
- C: 异丙嗪
- D: H

答案：C

3. 不宜采用放射性  $^{131}\text{I}$  治疗的甲亢患者是

- A: 老年甲亢患者
- B: 成人 Graves 甲亢伴甲状腺 II 度以上肿大患者
- C: 甲亢合并白细胞和（或）血小板减少或全血细胞减少患者
- D: 妊娠期、哺乳期女性甲亢患者

答案：D

4. (2018 年真题) 患者,男,69 岁,因高血压长期服用抗高血压药,近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是 ( )

- A: 多沙唑嗪
- B: 卡托普利
- C: 非洛地平
- D: 普萘洛尔

**答案: C**

5. 糖浆剂给药时的注意事项是

- A: 宜用温开水送服, 以免药品黏附在咽喉和食管壁上引起刺激, 产生恶心等不适
- B: 不宜直接给患者服用, 应溶解在水中服用, 以免呛入气管
- C: 服用时在口咽部黏膜表面形成一层保护膜, 不宜立刻饮水, 以免冲淡药物, 降低疗效
- D: 宜含服于舌下, 以达到迅速缓解病情的作用

**答案: C**

6. 清洁手术的预防用药时间不超过

- A: 48 小时
- B: 6 小时
- C: 12 小时
- D: 24 小时

**答案: D**

7. 属于抗酸药的是

- A: 三硅酸镁
- B: 替普瑞酮
- C: 哌仑西平

D: 奥美拉唑

**答案：A**

8. 规范处方行为与操作流程，归属于用药错误预防策略中的

A: 环境与流程的优化与持续改进

B: 管理规范到位

C: 科学发展

D: 人员培训

**答案：B**

9. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗寻常痤疮时，正确的用法是（）

A: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏

B: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用

C: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

D: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

**答案：C**

10. 艾滋病的传播途径不包括

A: 经血传播

B: 经血制品传播

C: 性途径传播

D: 消化道传播

**答案：D**

11. 非甾体类抗炎药引起的典型药源性疾病是

A: 血液系统疾病

B: 胃肠道反应

C: 神经系统疾病

D: 肌病

**答案: B**

12. 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“写字过小征”表现，确诊为帕金森病患者同时患有消化道溃疡，不宜选用的治疗药物是

A: 卡马西平

B: 多奈哌齐

C: 左旋多巴

D: 氟西汀

**答案: C**

13. 杨某，女，19 岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温 39℃，听诊肺部有湿啰音。WBC $12 \times 10^9 / L$ 。该患者对青霉素过敏。

A: 支气管炎

B: 肺结核

C: 社区获得性肺炎

D: 哮喘

**答案: C**

14. 可引起泌尿生殖系统异常，指趾畸形的是

A: 甲巯咪唑

B: 氮芥类

C: 沙立度胺

D: 雌孕激素

**答案: B**

15. 提示"每次用药前检查药品外观有无变化，发现异常立即停用"，是针对

- A: 药品有效期
- B: 特殊装置药品
- C: 药品贮存
- D: 特殊剂型用法

**答案：C**

16. (2021 年真题) 哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是 ( )

- A: 胰岛素
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 依那普利
- D: 复方炔诺酮

**答案：B**

17. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体：体温 38℃，中上及左上腹有压痛。化验结果：白细胞计数  $18.7 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶 1993U/L，血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是

- A: 急性胰腺炎
- B: 急性阑尾炎
- C: 急性胆囊炎
- D: 急性胃炎

**答案：A**

18. 属于 MA-B 抑制剂的是

- A: 司来吉兰

- B: 普拉克索
- C: 恩托卡朋
- D: 苯海索

**答案：A**

19. 可引起局部组织萎缩

- A: 地塞米松粘贴片
- B: 氯己定
- C: 硼酸甘油
- D: 甲硝唑含漱制剂

**答案：A**

20. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

- A: 孟鲁司特
- B: 异丙托溴铵
- C: 沙美特罗
- D: 沙丁胺醇

**答案：A**

21. (2015 年真题) 饮茶可减少其吸收的药物是 ( )。

- A: 去氮加压素
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 硫酸亚铁
- D: 阿莫西林

**答案：C**

22. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）

- A: 阿司匹林
- B: 利伐沙班
- C: 巴曲酶
- D: 肝素

**答案：A**

23. 血红蛋白(HGB)正常参考区间是

- A:  $(15.0 \sim 20.0) \times$
- B:  $170 \sim 200\text{g/L}$
- C:  $180 \sim 220\text{g/L}$
- D:  $(4.0 \sim 10.0) \times 10$

**答案：B**

24. 患者，男，30 岁，肺部感染，发热数日，处方苯唑西林钠注射剂，用药前进行皮试的皮试液浓度和给药方法，正确的是

- A: 浓度  $500\text{mg/ml}$ ，皮内注射  $0.1\text{ml}$
- B: 浓度  $250\text{U/ml}$ ，皮内注射  $0.1\text{ml}$
- C: 浓度  $500\text{U/ml}$ ，皮内注射  $0.1\text{ml}$
- D: 浓度  $250\text{mg/ml}$ ，皮内注射  $0.1\text{ml}$

**答案：C**

25. (2017 年真题) 治疗滴虫性阴道炎首选的药物是（）

- A: 莫匹罗星软膏
- B: 伏立康唑片
- C: 甲硝唑栓

D: 吲哚美辛栓

**答案: C**

26. 患者，男，50 岁，身高 167cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖 7.8mmol / L（正常值：3.9～6.1mmol / L），餐后血糖 14.8mmol / L；血尿酸 580 μmol/L（正常值：男性 180～440 μmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 3.7mmol / L（正常值：2.1～3.1mmol / L），肌酐清除率 100ml / min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 应用阿司匹林

B: 控制体重

C: 低嘌呤饮食

D: 适量运动

**答案: A**

27. （2018 年真题）干眼症可选用（）

A: 氧氟沙星滴眼液

B: 色甘酸钠滴眼液

C: 七叶洋地黄双苷滴眼液

D: 玻璃酸钠滴眼液

**答案: D**

28. 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸，减少尿酸的生成

A: 阿司匹林

B: 别嘌醇

C: 丙磺舒

D: 秋水仙碱

**答案：B**

29. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，Bp108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 急性左心衰竭

B: 慢性支气管炎急性发作

C: 肺动脉栓塞

D: 支气管哮喘

**答案：A**

30. 心衰治疗中能够快速控制体液潴留的药物是（）

A: 阿托品

B: 肾上腺素

C: 利尿剂

D:  $\beta$  受体阻断剂

**答案：C**

31. 对于尿液的描述正确的是

A: 尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收

B: 正常人的尿量变化幅度不大

C: 正常人的新鲜尿液呈弱碱性

D: 正常人每日排出尿液 1~2L，其中 50% 为水分

**答案：A**

32. 下列药物中，属于弱阿片类药物的为

A: 美沙酮

B: 曲马多

C: 哌替啶

D: 吗啡

**答案: B**

33. 患者，男，66 岁，帕金森病史 3 年，服用复方左旋多巴控制病情，药师对患者及其家属进行的用药指导错误的是

A: 应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开 2~3h

B: 为达到治疗效果，应小剂量滴定增量

C: 不能自行停药或随意改变剂量

D: 早、中餐应高蛋白饮食，减少碳水化合物的摄入

**答案: D**

34. 患者，女，55 岁，因"反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

A: 长期用药后可能会出现维生素 K 缺乏

B: 适宜餐前 30 分钟服用

C: 应正片吞服

D: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应

**答案: A**

35. 在药物信息服务中，三级信息资料最突出的优势是

A: 内容广泛、使用方便

B: 能看到研究细节如实验设计方法、数据统计分析等

C: 内容全面、细致

D: 提供的信息丰富、详实

**答案: A**

36. 治疗窗窄以及代谢存在较大的个体差异的药物是

A: 顺铂

B: 苯妥英钠

C: 地高辛

D: 茶碱

**答案: D**

37. 驾驶员工作时不宜服用的药品是

A: 阿莫西林?

B: 阿司匹林?

C: 氯苯那敏?

D: 维生素 C?

**答案: C**

38. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为  $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 痛风

B: 风湿性关节炎

C: 类风湿关节炎

D: 假性痛风

**答案: A**

39. 慢性肾盂肾炎时，尿中可见()。

A: 红细胞管型

B: 血红蛋白尿

C: 乳糜尿

D: 白细胞管型

**答案：D**

40. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

A: 竞争性拮抗作用

B: 协同作用

C: 敏感化作用

D: 减少不良反应

**答案：C**

41. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 慢性肾盂肾炎

B: 急性膀胱炎

C: 急性肾盂肾炎

D: 急性肾小球肾炎

**答案：C**

42. 患者，女，52 岁，患骨质疏松症伴静脉血栓，该患者避免使用的治疗药是

A: 阿仑膦酸钠

B: 鲑鱼降钙素

C: 特立帕肽

D: 雷洛昔芬

**答案：D**

43. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

- A: 稳态一点法
- B: 一点法和重复一点法
- C: CTP 评分
- D: PK/PD 参数法

**答案：C**

44. 环磷酰胺可引起

- A: 末梢神经炎
- B: 溶血性尿毒症
- C: 心脏毒性
- D: 出血性膀胱炎

**答案：D**

45. 促进机体的利用的是

- A: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- B: 磷霉素联用其他抗菌药物
- C: 亚胺培南-西司他汀复方制剂
- D: 维生素 C 与铁剂同服

**答案：D**

46. 每次配方尽可能 1 次完成，是针对药品调配环节防范措施中的

- A: 保证足够的人力配备
- B: 环境整齐、安静
- C: 及时沟通
- D: 规范操作、坚持核对

**答案：D**

47. 属于 HIV 整合酶抑制剂的是

- A: 阿巴卡韦
- B: 雷特格韦
- C: 奈韦拉平
- D: 洛匹那韦

**答案：B**

48. 低比重尿主要见于

- A: 尿崩症
- B: 急性肾小球肾炎
- C: 急性肾衰竭少尿期
- D: 糖尿病

**答案：A**

49. 对蛔虫，蛲虫，鞭虫，钩虫，鞭虫，绦虫感染都有效的药物是

- A: 甲苯咪唑
- B: 噻嘧啶
- C: 哌嗪
- D: 吡喹酮

**答案：A**

50. 给予铁剂的依据是

- A: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- B: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- C: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- D: 有助于合成红细胞

**答案：D**

51. 影响肝药酶活性，药物疗效降低

A: 地西泮

B: 呋塞米

C: 氨茶碱

D: 胰岛素

**答案：A**

52. 可吸附砷、沉淀汞的洗胃液是

A: 3%~5%鞣酸溶液

B: 1%氯化钠溶液

C: 药用炭混悬液

D: 鸡蛋白

**答案：D**

53. 随着社会的发展，生活的节奏越来越快，科技给我们带来便利的同时，也给我们的生活和工作增添了不少压力，焦虑、抑郁、失眠等病症的发生率随之上升。

A: 度洛西汀

B: 劳拉西泮

C: 帕罗西汀

D: 曲唑酮

**答案：D**

54. 钙制剂属于

A: 骨吸收抑制剂

B: 促进骨矿化剂

C: 激素替代剂

D: 骨形成刺激剂

**答案：B**

55. 溃疡性结肠炎患者应限制摄入的食品是

A: 流质饮食

B: 乳制品

C: 低渣食品

D: 维生素类食品

**答案：B**

56. 可在尿中结晶，送服药物时要喝约 250ml 水，服药后也要多喝水，保持高尿流量的药物是

A: 特拉唑嗪

B: 左氧氟沙星

C: 头孢哌酮

D: 卡马西平

**答案：B**

57. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞  $8.0 \times 10^9/L$

A: 低血糖

B: 肌痛

C: 乳酸酸中毒

D: 心力衰竭

**答案：C**

58. 妊娠期禁用的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 雌二醇
- C: 链霉素
- D: 青霉素钠

**答案：B**

59. 长期服用可引起男性性功能障碍的药物是

- A: 甲硝唑
- B: 奥美拉唑
- C: 非布司他
- D: 西咪替丁

**答案：D**

60. 有利于创面及溃疡的愈合，葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（有溶血性贫血倾向）患者禁用的药品是

- A: 红霉素眼膏
- B: 酞丁安滴眼液
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 磺胺醋酰钠滴眼液

**答案：C**

61. 具有沉淀作用，不宜在胃内滞留，可用浓茶代替的洗胃液是

- A: 1：5000 高锰酸钾
- B: 活性炭混悬液
- C: 3%鞣酸溶液
- D: 淀粉溶液

**答案：C**

62. 育龄期癫痫患者可酌情选用

- A: 丙戊酸钠
- B: 托吡酯
- C: 乙琥胺
- D: 卡马西平

**答案：D**

63. 癫痫持续状态的首选治疗方法为

- A: 地西泮静脉注射
- B: 苯妥英钠静脉注射
- C: 乙琥胺口服
- D: 苯巴比妥肌肉注射

**答案：A**

64. 患者，男，66岁，身高170cm，体重85kg，以“头晕、胸闷、乏力1周”为主诉入院治疗。空腹血糖11.2mmol/L，餐后血糖16.5mmol/L。诊断结果：2型糖尿病。既往有磺胺类药物过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍0.5g bid、消渴丸10丸（规格30g/120丸）bid、罗格列酮4mg qd 治疗。

- A: 磺胺类药物过敏史患者不宜服用消渴丸
- B: 二甲双胍给药频次不合理
- C: 罗格列酮给药剂量不合理
- D: 消渴丸给药频次不合理

**答案：A**

65. 双膦酸盐属于

- A: 骨形成刺激剂

- B: 促进骨矿化剂
- C: 激素替代剂
- D: 骨吸收抑制剂

**答案：D**

66. 严重心脏病患者不能

- A: 催吐
- B: 强利尿
- C: 洗胃
- D: 实施血液净化

**答案：A**

67. 用于抗结核杆菌的药物是

- A: 妥布霉素
- B: 新霉素
- C: 庆大霉素
- D: 异烟肼

**答案：D**

68. 氨基糖苷类抗生素肾毒性大小的次序为. ()。

- A: 新霉素>阿米卡星>妥布霉素>链霉素
- B: 新霉素>阿米卡星>链霉素>妥布霉素
- C: 阿米卡星>新霉素>妥布霉素>链霉素
- D: 庆大霉素>新霉素>妥布霉素>链霉素

**答案：A**

69. 某女孩，6 岁，2 个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

- A: 简单部分性发作
- B: 肌阵挛发作
- C: 复杂部分性发作
- D: 失神发作

**答案：D**

70. 治疗药源性疾病的方法如下，最先采用的是

- A: 停用致病药物
- B: 拮抗致病药物
- C: 调整治疗方案
- D: 对症治疗

**答案：A**

71. （2018 年真题）患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊，化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100  $\mu$ gqd 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

- A: 早餐后半小时，顿服
- B: 早餐前半小时，顿服
- C: 晚餐后顿服
- D: 睡前顿服

**答案：B**

72. 属于容积性泻药的是

- A: 开塞露

B: 番泻叶

C: 乳果糖

D: 硫酸镁

**答案：D**

73. 解热且具有抑制血小板凝集作用、可能增加出血危险的是

A: 布洛芬

B: 贝诺酯

C: 吲哚美辛

D: 阿司匹林

**答案：D**

74. 老年人应用下列药物可引起何种不良反应, 抗过敏药如苯海拉明可致

A: 脱水、低钾血症

B: 嗜睡及头晕

C: 室性期前收缩、房室传导阻滞及低钾血症

D: 青光眼, 甚至致盲

**答案：B**

75. 应嘱咐患者避免冷饮冷食, 避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

A: 卡铂

B: 奥沙利铂

C: 顺铂

D: 卡培他滨

**答案：B**

76. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。  
日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞  $8.0 \times 10$

- A: 非诺贝特
- B: 格列齐特
- C: 二甲双胍
- D: 辛伐他汀

**答案：C**

77. (2016 年真题) 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 ( )。

- A: 青霉胺
- B: 纳洛酮
- C: 氟马西尼
- D: 乙酰胺

**答案：A**

78. (2017 年真题) 下列药物使用方式, 正确的是 ( )

- A: 氧氟沙星滴眼液打开使用后, 继续使用 3 个月
- B: 酵母片在餐后整片用水送服
- C: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服
- D: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用

**答案：D**

79. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

- A: 西格列汀
- B: 格列吡嗪
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

**答案：B**

80. 患者男 50 岁临床诊断为焦虑症，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者用药教育的说法错误的是()

- A: 不得随意自行调整氟西汀剂量
- B: 不能突然停止服用氟西汀
- C: 服用氟西汀期间不能饮酒
- D: 氟西汀应于睡前服用

**答案：D**

81. 药师发药时提示患者“不要驾车、操作机器或高空作业等”，针对的药物是

- A: 氟西汀
- B: 卡托普利
- C: 铋制剂
- D: 氯苯那敏

**答案：D**

82. 提示有明确的风险，有必要采取措施以降低风险的信号属于

- A: 部分确认信号
- B: 确认的信号
- C: 驳倒的信号
- D: 尚不确定的信号

**答案：B**

83. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

- A: 阿司匹林

- B: 伪麻黄碱
- C: 菠萝蛋白酶
- D: 颠茄浸膏片

**答案：B**

84. 脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

- A: 阿司匹林
- B: 甘露醇
- C: 阿替普酶
- D: 普通肝素

**答案：C**

85. (2015 年真题) 静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是 ( )。

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 复方氯化钠注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 0.9 氯化钠注射液

**答案：D**

86. (2021 年真题) 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m<sup>2</sup>，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 注意关节保暖
- B: 遵医嘱，不得自行增加剂量
- C: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用
- D: 应适当减轻体重

**答案：C**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/696212044101011030>