

## 2024 河北省广阳区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库附参考答案（精练）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2016 年真题）患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是（）。

- A: 心力衰竭
- B: 痛风
- C: 双侧肾动脉狭窄
- D: 冠心病

**答案：A**

2. (致畸药物的种类与危害)可能导致胎儿泌尿生殖系统异常、指趾畸形的是

- A: 孕激素
- B: 沙利度胺
- C: 氮芥类
- D: 雄激素

**答案：C**

3. 药师在处方调剂操作中，下列处方应重新开具才能调剂的是

- A: 给门诊患者开具 7d 用量的地西洋片
- B: 给流感患者开具速感宁胶囊、维生素 C 片使用一张处方用纸，分行书写
- C: 给慢性支气管炎患者开具沙丁胺醇气雾剂、中药饮片，使用同一张处方用纸

D: 给儿童细菌性腹泻患者开具小檗碱片使用淡绿色处方用纸

**答案: C**

4. 高血压首选的利尿剂是

A: 氨苯蝶啶

B: 乙酰唑胺

C: 氢氯噻嗪

D: 呋塞米

**答案: C**

5. 多数抗过敏药物慎用于 ( )

A: 慢性鼻炎患者

B: 胃溃疡患者

C: 前列腺增生老年患者

D: 高脂血症患者

**答案: C**

6. 急性冠状动脉综合征患者使用他汀类药物降低 LDL-C 的目标值为

A: <50mg / dl

B: <70mg / dl

C: <60mg / dl

D: <40mg / dl

**答案: B**

7. 患者，男，48岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

A: 钙通道阻滞药

B: ACEI

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

C:  $\beta$  受体阻断药

D: AR

**答案: B**

8. 对伴有血管性水肿的荨麻疹可选用的药物是

A: 氯雷他定

B: 泮托拉唑

C: 赛庚啶

D: 氯苯那敏

**答案: C**

9. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

A: 阿卡波糖

B: 西格列汀

C: 格列吡嗪

D: 二甲双胍

**答案: C**

10. 静脉注射给药的外文缩写是

A: im

B: iv

C: ivgtt

D: i.h

**答案: B**

11. 脂质体药物属于

A: B 级高危药品

B: C 级高危药品

C: D 级高危药品

D: E 级高危药品

**答案：B**

12. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

**答案：A**

13. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者，不宜选用的药物是

A: 奥昔布宁

B: 多沙唑嗪

C: 坦索罗辛

D: 非那雄胺

**答案：A**

14. 起效较慢，服用至少 3 个月才可以缓解前列腺增生症状的 5 $\alpha$  还原酶抑制剂是

- A: 阿夫唑嗪
- B: 氟伏沙明
- C: 特拉唑嗪
- D: 非那雄胺

**答案：D**

15. 李某，58 岁，高血压病史 10 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 普萘洛尔？
- B: 肾上腺素？
- C: 阿托品？
- D: 维拉帕米？

**答案：C**

16. 可引起泌尿生殖系统异常，指趾畸形的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 雌孕激素
- C: 沙立度胺
- D: 氮芥类

**答案：D**

17. 描述是否充分、详细、准确是评价

- A: 摘要
- B: 前言
- C: 讨论
- D: 结果

**答案：D**

18. 患儿，女，4岁半。身高110cm，体重15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病20h左右出现腹泻，约2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白?
- B: 药用炭?
- C: 小檗碱?
- D: 洛哌丁胺?

**答案：D**

19. 禁用于严重痛风患者的调脂药物为

- A: 考来烯胺
- B: 烟酸类
- C: 非诺贝特
- D: 阿托伐他汀

**答案：B**

20. 加速已经进入肠道的毒物排泄的方法不包括

- A: 导泻
- B: 洗肠
- C: 洗胃
- D: 利尿

**答案：C**

21. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是：

- A: 头孢呋辛
- B: 左氧氟沙星
- C: 阿莫西林
- D: 阿奇霉素

**答案：D**

22. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 嗜睡
- B: 血压升高
- C: 痛风急性发作
- D: 出现尿蛋白

**答案：C**

23. 患者，男性，55岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示 Hb72g/L。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

- A: 大便颜色变黑为消化道出血所致
- B: 尽量使用铁锅烹饪
- C: 注意足够的蛋白质摄入
- D: 服药时不能饮用茶和咖啡

**答案：A**

24. 缺血性脑卒中的二级预防用药中不包括（）

- A: 缬沙坦
- B: 阿托伐他汀
- C: 阿司匹林
- D: 依达拉奉

**答案：D**

25. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 下肢深静脉血栓形成
- B: 病理性骨折
- C: 肺动脉栓塞
- D: 下肢动脉栓塞

**答案：A**

26. 糖尿病酮症酸中毒患者应选用

- A: 格列本脲
- B: 胰岛素
- C: 大剂量碘剂
- D: 二甲双胍

**答案：B**

27. 季节性过敏性鼻炎的主要诱因是

- A: 热
- B: 冷
- C: 花粉
- D: 光线

**答案：C**

28. 躯干部出现鞭打状色素沉着的是

- A: 白消安
- B: 柔红霉素
- C: 氟尿嘧啶
- D: 博来霉素

**答案：D**

29. 对于 ACEI 类药描述错误的是

- A: 明显降低全身血管阻力
- B: 抑制交感神经活性作用
- C: 唯一的抑制心肌及血管重构药物
- D: 抑制血管紧张素转化酶 (ACE) 活性

**答案：B**

30. 让患者感觉信任和不受干扰的是

- A: 位置标志明确
- B: 环境舒适
- C: 配备必备设备
- D: 适当隐秘

**答案：B**

31. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: 酮替酚
- B: 特布他林气雾剂
- C: 二丙酸倍氯米松气雾剂
- D: 异丙托溴铵气雾剂

**答案：C**

32. 属于第三代头孢菌素类抗菌药物的是

- A: 头孢吡肟
- B: 头孢曲松
- C: 头孢洛林酯
- D: 头孢拉定

**答案：B**

33. 从事药学服务的药师应具备沟通能力。此项要求的重要性不是

- A: 可提高公众对药师的认知度
- B: 可杜绝投诉事件
- C: 可使患者获得有关用药指导
- D: 是药师实施药学服务的基础

**答案：B**

34. 依据生物钟规律，适宜清晨服药的是

- A: 抗过敏药
- B: 调节血脂药
- C: 抗忧郁药
- D: 平喘药

**答案：C**

35. 肝功能检查，总胆红素数值超过正常值数倍可诊断为

- A: 心肌梗死
- B: 黄疸
- C: 贫血
- D: 痛风

**答案：B**

36. 在手术麻醉时给予患者阿托品抑制腺体分泌、减少呛咳以致误吸的发生，但易引起腹胀、尿潴留，此种不良反应属于

- A: 特异质反应
- B: 撤药反应
- C: 副作用
- D: 继发反应

**答案：C**

37. 急性结膜炎患者禁用的药品是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 醋酸可的松滴眼剂
- C: 利福平滴眼剂
- D: 硫酸锌滴眼剂

**答案：D**

38. 患者，男，21岁因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用药教育的说法，错误的是()

- A: 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原
- B: 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似，应注意鉴别
- C: 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素，首选地塞米松
- D: 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂

**答案：C**

39. 静脉滴注过程中药液必须避光的药物是

- A: 青霉素
- B: 培氟沙星
- C: 万古霉素

D: 两性霉素 B

**答案: B**

40. 以下有关  $\gamma$ -GT 检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断恶性贫血

B: 诊断痛风

C: 诊断急慢性白血病

D: 诊断心肌梗死

**答案: D**

41. 新药临床评价分为

A: 三期

B: 一期

C: 二期

D: 四期

**答案: D**

42. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，不需要使用额外的避孕措施

B: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

C: 在常规时间 20:00 服用 4 月 25 日的药片，不用补服 4 月 24 日的药片

D: 不再继续服用此周期药物，经过一个 7 天的停药期，再开始继续服用下一周期的药物

**答案: A**

43. 对于男性成人而言，下列红细胞沉降率检查值属于正常的是

- A: 20mm/h
- B: 18mm/h
- C: 16mm/h
- D: 14mm/h

**答案：D**

44. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

- A: 敏感化作用
- B: 减少不良反应
- C: 竞争性拮抗作用
- D: 非竞争性拮抗作用

**答案：A**

45. 在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为（）

- A: 胃黏膜血流减少
- B: H. pylori 感染
- C: 胃黏膜屏障的完整性
- D: 胃酸

**答案：D**

46. 长期服用可加重消化道溃疡风险，不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

- A: 匹伐他汀
- B: 铝碳酸镁

C: 美金刚

D: 多奈哌齐

**答案: D**

47. 患者，男，60岁，身高170cm，体重85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率100次/分、血压160/100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

A: 150 / 100mmHg

B: 140 / 80mmHg

C: 140 / 90mmHg

D: 130 / 80mmHg

**答案: D**

48. 可能导致局部缺血性结肠炎（药源性胃肠道疾病）的药物是

A: 呋塞米

B: 利血平

C: 阿洛司琼

D: 依他尼酸

**答案: C**

49. 抗高血压药物的禁忌证双侧肾动脉狭窄（）

A: 维拉帕米

B: 美托洛尔

C: 依那普利

D: 氢氯噻嗪

**答案: C**

50. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度重度贫血为

- A: 120~160g / L
- B: 90~120g / L
- C: 30~60g / L
- D: 60~90g / L

**答案：C**

51. 下列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

- A: 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪
- B: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- C: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- D: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面，以防创面感染

**答案：B**

52. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 速尿
- B: 吗啡
- C: 氨茶碱
- D: 氨溴索

**答案：B**

53. 脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

- A: 甘露醇
- B: 阿司匹林
- C: 普通肝素

D: 阿替普酶

**答案: D**

54. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力

A: 促进临床合理用药

B: 减少 ADR 的危害

C: 为临床药物评价提供依据

D: 促进新药的研制开发

**答案: A**

55. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 瑞格列奈片应于餐前服用

B: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

C: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

D: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

**答案: B**

56. 以下用药，属于“禁忌证用药”的是

A: 黄体酮用于输尿管结石

B: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中

C: 治疗感冒、咳嗽给予抗菌药

D: 无治疗指征盲目补钙

**答案: B**

57. 妊娠期妇女不宜选用药物是

A: 华法林

B: 氯化钾

C: 维生素 A

D: 青霉素

**答案：A**

58. 容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是()

A: 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长

B: 分子量大、弱碱性

C: 脂溶性高，分子量小

D: 蛋白结合率高，具有手性、分布容积大

**答案：C**

59. 适用于 1-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动患者的是

A: 苯海索

B: 恩托卡朋

C: 左旋多巴

D: 司来吉兰

**答案：B**

60. 结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎等传染病可呈现

A: 单核细胞增多

B: 淋巴细胞增多

C: 中性粒细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

**答案：B**

61. 表现为"牛肉样舌"的疾病为

A: 淋巴瘤

- B: 缺铁性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 巨幼细胞性贫血

**答案：D**

62. 下列药物中，即使肝功能不全的病人也可使用原剂量的是

- A: 洋地黄毒苷
- B: 苯妥英钠
- C: 青霉素
- D: 氯霉素

**答案：C**

63. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 红霉素
- B: 氯霉素
- C: 链霉素
- D: 青霉素

**答案：C**

64. 患者，男，73 岁，因腰痛无法起床 1 天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经 X 线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

- A: 长期服用抗癫痫药

- B: 老年性骨质疏松症
- C: 维生素 D 中毒
- D: 长期服用糖皮质激素

**答案：B**

65. 增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

- A: 拉氧头孢
- B: 头孢哌酮
- C: 利巴韦林
- D: 加替沙星

**答案：D**

66. 应提示患者服用后舌苔、大便可呈灰褐色的是

- A: 氟西汀
- B: 米索前列醇
- C: 胰岛素注射剂
- D: 枸橼酸铋钾

**答案：D**

67. 三环类抗抑郁药中毒解救和治疗时，不宜使用的是

- A: 吐根糖浆
- B: 毒扁豆碱
- C: 高锰酸钾溶液
- D: 普鲁卡因胺

**答案：B**

68. (2019 年真题) 患者，男，60 岁，坏死性胰腺炎剖腹探查术术后 2 年，恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

- A: 复方阿嗟米特肠溶片
- B: 蒙脱石散
- C: 奥美拉唑肠溶胶囊
- D: 干酵母片

**答案：A**

69. 患者，男，36 岁。临床诊断“大三阳”，其临床意义是

- A: HBsAg、HBeAg 和 HBcAb 同为阳性
- B: HBsAg、HBeAb 和 HBcAb 同为阳性
- C: HBsAg 阳性
- D: HBeAg 阳性

**答案：A**

70. 高血压患者的降压目标一般患者高血压（）

- A: <120 / 80mmHg
- B: <150 / 90mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <140 / 90mmHg

**答案：D**

71. （2015 年真题）过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是（）。

- A: 骨骼发育不良或骨软化
- B: 间质性肾炎或肾结石
- C: 骨质疏松症或骨折
- D: 横纹肌溶解或肌痛

**答案：B**

72. 具有缩瞳和降低眼压的拟 M 胆碱药是

- A: 溴莫尼定
- B: 噻吗洛尔
- C: 毛果芸香碱
- D: 拉坦前列素

**答案：C**

73. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

- A: 唑吡坦
- B: 文拉法辛
- C: 氯苯那敏
- D: 地西泮

**答案：C**

74. 适宜餐前给药的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 法莫替丁
- C: 二甲双胍
- D: 复方铝酸铋

**答案：D**

75. 非药物治疗慢性阻塞性肺病的主要措施是

- A: 户外锻炼
- B: 减少体重

C: 戒烟

D: 咳嗽

**答案: C**

76. 以下可提示“高度黄疸，完全梗阻性黄疸”的总胆红素检查结果是

A:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

B:  $>342 \mu\text{mol/L}$

C:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

D:  $<85.5 \mu\text{mol/L}$

**答案: B**

77. 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是()

A: 头孢氨苄

B: 坎地沙坦

C: 碳酸氢钠

D: 氯苯那敏

**答案: A**

78. 可致体重增加的抗癫痫药为()

A: 苯巴比妥

B: 左乙拉西坦

C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

**答案: C**

79. 在药学信息服务中，三级信息源资料的最突出的优势是

A: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等

B: 内容全面、细致

C: 内容广泛、使用方便

D: 提供的信息丰富、详实

**答案: C**

80. 解热且具有抑制血小板凝集作用、可能增加出血危险的是

A: 贝诺酯

B: 布洛芬

C: 阿司匹林

D: 吲哚美辛

**答案: C**

81. 可作为急性胰腺炎的症状指标是

A: 磷酸激酶降低

B: 淀粉酶升高

C: 磷酸激酶升高

D: 淀粉酶降低

**答案: B**

82. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

A: 异丙托溴铵

B: 噻托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 沙美特罗

**答案: B**

83. 通过重整患者的医嘱或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性，属于

A: 处方审核

- B: 药物治疗管理
- C: 药学干预
- D: 药物利用研究和评价

**答案：B**

84. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是 ( )。

- A: 7.5mgqod
- B: 7.5mg tid
- C: 75mgqd
- D: 7.5mgqw

**答案：D**

85. 在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞(DC)的正常比例范围是

- A: 0.03~0.08
- B: 0.01~0.05
- C: 0.20~0.40
- D: 0.50~0.70

**答案：D**

86. 妊娠 5 个月后用何种抗菌药物会使婴儿牙釉质发育不全、牙齿黄染

- A: 氟喹诺酮类
- B: 四环素类
- C: 青霉素
- D: 大环内酯类

**答案：B**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/696214145054011030>