专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024江苏省高淳区《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题大全（实用）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.复方左炔诺孕酮片、去氧孕烯炔雌醇片、复方孕二烯酮片均含有的成分是

A：炔雌醇

B：甲羟孕酮和炔雌醇

C：维生素B6

D：去氧孕烯

答案：A

2.主要作用于有丝分裂M期，干扰微管蛋白合成的药物是

A：氟尿嘧啶

B：高三尖杉酯碱

C：顺铂

D：多柔比星

答案：B

3.下述关于留钾利尿药作用特点的描述，正确的是()

A：利尿作用强，药效持久

B：具有抑制心肌纤维化的功能

C：对肝硬化者无效

D：其利尿作用与体内的醛固酮浓度无关

答案：B

4.通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上PBP3的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

A: 头孢噻肟

B: 头孢美唑

C: 头孢他啶

D: 氨曲南

答案：D

5.可导致"类流感样"反应的药物是()

A: 依替膦酸二钠

B: 阿仑膦酸钠

C: 氯屈膦酸二钠

D: 帕米膦酸二钠

答案：B

6.毛果芸香碱对眼的作用是

A: 缩瞳、升眼压，调节痉挛

B: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

C: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

D: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

答案：C

7.有耳毒性的药物是

A: 呋塞米

B: 乙酰唑胺

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

答案：A

8.口服不可嚼碎，否则易引起严重口腔溃疡的助消化药物是

A：乳酸菌素

B：氢氧化铝

C：胰酶

D：西咪替丁

答案：C

9.（2016年真题）会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性（感觉障碍、痉挛）的行为是

A：接触塑料制品

B：冷水浴

C：饮用热饮

D：日光浴

答案：B

10.长期大量服用维生素E会出现

A：疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

B：严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

C：视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

D：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：C

11.帕罗西汀用于治疗抑郁症、社交恐怖障碍，成人的起始剂量为每日

A：50mg

B：60mg

C：20mg

D：100mg

答案：C

12.肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵()

A：可增加血氨浓度，诱发肝性昏迷

B：可降低血氨浓度，诱发肝性昏迷

C：可升高门脉压力，诱发出血

D：可降低门脉压力，诱发出血

答案：A

13.常引起体位性低血压的是

A：普适泰

B：非那雄胺

C：十一酸睾酮

D：哌唑嗪

答案：D

14.（2019年真题）用于治疗水肿性疾病，当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时，可追加剂量，每日最大剂量可达600mg，但一般应控制在100mg以内的利尿剂是（）

A：布美他尼

B：呋塞米

C：依他尼酸

D：托拉塞米

答案：B

15.患者，女,55岁,2型糖尿病史5年;心律失常病史2年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法,错误的是

A: 可致甲状腺功能亢进,同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

B: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖）,但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

C: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿

D: 可致肺毒性,早期一般表现为咳嗽,但病情发展时可出现发热和呼吸困难,表现为急性肺炎

答案：B

16.可用于单纯疱疹性角膜炎的药物是

A: 阿托品

B: 奥布卡因

C: 碘苷

D: 20%甘露醇

答案：C

17.下述不属于抗血小板类药物的是

A: 血栓素A2（TXA2）抑制剂

B: 非特异性纤溶酶原激活剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: 二磷酸腺苷P2Y12受体激动剂

答案：B

18.与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

A: 非格司亭

B: 铂类

C: 异烟肼

D: 替尼泊苷

答案：C

19.对耐药金黄色葡萄球菌感染有效的 β-内酰胺类抗生素是()

A: 苯唑西林

B: 四环素

C: 甲硝唑

D: 喹诺酮类

答案：A

20.属于5a还原酶抑制剂的是

A: 度他雄胺

B: 他达拉非

C: 坦洛新

D: 西地那非

答案：A

21.下列属于超短效胰岛素的是()

A: 精蛋白锌胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 门冬胰岛素

D: 甘精胰岛素

答案：C

22.对贝特类(苯氧芳酸类)的叙述正确的是()

A: 可升高T

B: 可降低HDL-ch

C: 能明显降低血浆TG、VLDL-ch

D: LDL-chC主要用于原发性高胆固醇血症

答案：C

23.抗阿米巴原虫药的药物是()。

A: 氯喹

B: 甲硝唑

C: 奎宁

D: 伯氨喹

答案：B

24.丙烯胺类抗真菌的代表药为()

A: 伊曲康唑

B: 特比萘芬

C: 伏立康唑

D: 卡泊芬净

答案：B

25.患者，男，57岁，身高175cm，体重87kg，诊断为2型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

A: 服药过程中适当补充维生素B12

B: 可能出现的不良反应有腹痛、腹泻、腹胀

C: 两药合用正常情况下不会引发低血糖

D: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

答案：C

26.氟他胺适用于治疗()。

A: 晚期睾丸肿瘤

B：急性淋巴细胞白血病

C：晚期前列腺癌

D：绒毛膜上皮癌

答案：C

27.下述不属于质子泵抑制剂的是

A：泮托拉唑

B：雷贝拉唑

C：法莫替丁

D：奥美拉唑

答案：C

28.属于嘌呤核苷合成酶抑制剂的是

A：甲氨蝶呤

B：长春瑞滨

C：巯嘌呤

D：吉西他滨

答案：C

29.下列药物属于第四代头孢菌素的是

A：头孢氨苄

B：头孢呋辛

C：头孢噻肟

D：头孢吡肟

答案：D

30.属于芳基乙酸类的是

A：阿司匹林

B: 对乙酰氨基酚

C: 塞来昔布

D: 吲哚美辛

答案：D

31.可增强糖尿病患者口服磺酰脲类药降糖作用，引起严重低血糖的药物是

A: 甘草酸二铵

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 甲氧氯普胺

D: 雷尼替丁

答案：D

32.存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 奥沙利铂

B: 吉西他滨

C: 泼尼松

D: 顺铂

答案：D

33.临床常用的以原型药从尿液中排出的中效强心苷类药是

A: 去乙酰毛花苷（西地兰D）

B: 地高辛

C: 洋地黄毒苷

D: 毛花苷丙（西地兰C）

答案：B

34.窄谱抗菌药是

A: 磺胺嘧啶

B: 头孢菌素

C: 异烟肼

D: 氯霉素

答案：C

35.长期大量服用维生素B6会出现

A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：B

36.（2015年真题）静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是（）。

A: 夫西地酸

B: 磷霉素

C: 万古霉素

D: 莫西沙星

答案：C

37.下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

A: 噻吗洛尔

B: 左氧氟沙星

C: 丙美卡因

D: 毛果芸香碱

答案：D

38.属于GLP-1受体激动剂的是()。

A：二甲双胍

B：艾塞那肽

C：那格列奈

D：阿卡波糖

答案：B

39.两性霉素B与()合用具有协同作用。

A：氟胞嘧啶

B：利福平

C：伊曲康唑

D：酮康唑

答案：A

40.硫脲类的严重不良反应是

A：粒细胞缺乏症

B：关节痛

C：甲状腺肿大

D：药疹、瘙痒

答案：A

41.（2020年真题）下列药动学/药效学（PK/PD）参数中，适用于浓度依赖型抗菌药物的评估指标

A：血浆药时曲线下面积与血浆达峰时间比值（AUC/Tmax）

B：血浆药物峰浓度与最低抑菌浓度比值（Cmax/MIC）

C：血浆药物峰浓度与达峰时间比值（Cmax/Tmax）

D：血浆药物半衰期（t1/2）

答案：B

42.耐青霉素酶青霉素类的是

A：青霉素V

B：哌拉西林

C：氨苄西林

D：苯唑西林

答案：D

43.属于治疗固醇性胆囊结石的是

A：胶体果胶铋

B：熊去氧胆酸

C：山莨菪碱

D：多潘立酮

答案：B

44.乙酰半胱氨酸的祛痰作用机制是

A：恶心性祛痰作用

B：增强呼吸道纤毛运动，促使痰液排出

C：使痰量逐渐减少，产生化痰作用

D：直接分解痰中的黏蛋白，降低痰的黏性，易咳出

答案：D

45.用于流脑，阻碍细菌二氢叶酸合成酶的药物是

A：利巴韦林

B：拉米夫定

C：磺胺嘧啶

D：氟康唑

答案：C

46.仅适用于少数敏感菌，衣原体属，立克次体等不典型病原体所致感染的药物是

A：链霉素

B：甲硝唑

C：四环素

D：阿奇霉素

答案：C

47.与噻嗪类利尿剂合用易发生高钙血症的药物是

A：枸橼酸铋钾

B：碳酸钙

C：莫沙必利

D：奥关拉唑

答案：B

48.成人应用0．1%溶液，儿童应用0．05%溶液，这种药物是

A：酚甘油滴耳液

B：赛洛唑啉滴鼻液

C：麻黄碱滴鼻液

D：羟甲唑啉滴鼻液

答案：B

49.新生儿和早产儿使用可能会出现致命性的“喘息综合征”的药物是

A：硫普罗宁注射剂

B：甘草酸二铵注射剂

C：多烯磷脂酰胆碱注射剂

D: 双环醇

答案：C

50.铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

A: 血红蛋白

B: 巨核细胞计数

C: 网织红细胞计数

D: 血清铁蛋白

答案：B

51.对多巴胺描述正确的是()

A: 可用于充血性心力衰竭等引起的休克综合征

B: 是磷酸二酯酶抑制剂

C: 对其他拟交感胺类药物高度敏感的患者应该使用多巴胺

D: 对洋地黄和利尿药无效的心功能不全，多巴胺也无效

答案：A

52.对脑CT无明显的低密度改变、意识清楚的急性缺血性脑卒中患者，在发病6小时内采用其静脉溶栓较安全、有效的是()

A: 叶酸

B: 重组人促红素

C: 链激酶

D: 尿激酶

答案：D

53.抗利尿作用最明显的阿片类镇痛药物是

A: 苯妥英钠

B: 苯巴比妥

C：吗啡

D：地西泮

答案：C

54.以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

A：乳果糖

B：硫酸镁

C：液状石腊

D：酚酞

答案：A

55.卵巢功能不全可选用()

A：西地那非

B：雌二醇

C：炔诺酮

D：米非司酮

答案：B

56.维生素A的适应症不包括

A：角膜软化

B：夜盲症

C：甲状旁腺功能不全引起的低钙血症

D：干眼病

答案：C

57.止吐方案：每日化疗前，应用5-HT

A：低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

B：中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

C: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

D: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：A

58.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1／18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A: 腰椎间盘突出

B: 骨髓功能抑制

C: 妊娠及哺乳期妇女

D: 严重心脏病

答案：A

59.疥疮及阴虱病可选用()

A: 维A酸

B: 酮康唑

C: 阿达帕林

D: 林旦霜

答案：D

60.静脉滴注给药用于真菌性肺炎的药物是

A: 酮康唑

B: 灰黄霉素

C: 特比萘芬

D: 两性霉素B

答案：D

61.用于高钾血症或普鲁卡因胺引起的心律失常伴有酸血症者的药品是()

A: 硫酸镁

B: 氯化钾

C: 乳酸钠

D: 谷氨酸

答案：C

62.过量引起严重心脏毒性的药物是

A: 卡托普利

B: 哌唑嗪

C: 地高辛

D: 氨氯地平

答案：C

63.治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

A: 柳氮磺吡啶

B: 磺胺米隆

C: 磺胺嘧啶

D: 复方磺胺甲噁唑

答案：C

64.以下给药途径不能使用氟尿嘧啶的是

A: 鞘内注射

B: 静脉注射

C: 动脉插管注药

D: 静脉滴注

答案：A

65.关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法错误的是()

A：甲硝唑有致突变和致畸作用

B：甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深

C：甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物

D：甲硝唑半衰期比奥硝唑短

答案：C

66.（2016年真题）属于血管紧张素II受体阻断剂的药品是

A：依那普利

B：哌唑嗪

C：替米沙坦

D：坦洛新（坦索罗辛）

答案：C

67.用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

A：苯酚溶液

B：高锰酸钾溶液

C：酚甘油滴耳液

D：过氧乙酸溶液

答案：C

68.口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A：磺胺嘧啶

B：柳氮磺吡啶

C：磺胺甲噁唑

D：磺胺米隆

答案：B

69.（2017年真题）属于抗雄性激素的肿瘤药是（）

A: 阿那曲唑

B: 他莫昔芬

C: 炔雌醇

D: 氟他胺

答案：D

70.临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

A: 维生素B12

B: 维生素K

C: 香豆素类

D: 肝素

答案：A

71.抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

A: 每天化疗前，应用5-HT3受体阻断剂

B: 每天化疗前，口服地塞米松12mg

C: 每天化疗前，联合应用5-HT3受体阻断剂和口服地塞米松12mg

D: 每天化疗前，联合应用5-HT3受体阻断剂或口服地塞米松12mg

答案：C

72.用军团菌、支原体肺炎的首先药()

A: 克林霉素

B: 克拉霉素

C: 万古霉素

D: 红霉素

答案：D

73.碳酸氢钠可用于

A: 代谢性酸中毒

B: 代谢性碱中毒

C: 呼吸性碱中毒

D: 呼吸性酸中毒

答案：A

74.（2017年真题）属于选择性5-HT4受体激动剂,促进乙酰胆碱释放的促胃肠动药是（）

A: 甲氧氯普胺

B: 昂丹司琼

C: 莫沙必利

D: 多潘立酮

答案：C

75.细胞内液的主要阳离子是

A: 镁

B: 钠

C: 钾

D: 钙

答案：C

76.（2016年真题）属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

A: 他莫昔芬

B：氟他胺

C：乙烯雌酚

D：托瑞米芬

答案：B

77.利奈唑胺最常见的不良反应是

A：静脉炎

B：血小板减少

C：黄疸

D：腹部不适

答案：B

78.关于红霉素使用的叙述，错误的是

A：老年人使用发生尖端扭转型室性心动过速的风险增加

B：主要由肝脏代谢，代谢物由肾脏排出

C：重症肌无力病史的患者使用有病情加重的风险

D：在明确需要的情况下可在妊娠期使用

答案：B

79.属于5-HT5受体阻断剂的止吐药是()。

A：甲氧氯普胺

B：托烷司琼

C：维生素B

D：阿瑞吡坦

答案：B

80.被称为餐时血糖调节剂，无需餐前0．5h服用的是

A：利拉鲁肽

B：格列齐特

C：艾塞那肽

D：瑞格列奈

答案：D

81.在真菌细胞内代谢后进入真菌的RNA，抑制DNA和RNA的合成，导致真菌死亡的是

A：万古霉素

B：两性霉素

C：伊曲康唑

D：氟胞嘧啶

答案：D

82.与肝素比较，低分子量肝素的特点不包括()

A：不易致出血

B：半衰期长，皮下注射吸收较好

C：应用期间应常规检测抗凝疗效及调整剂量

D：达肝素钠对延长APTT的作用较弱

答案：C

83.（2020年真题）属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

A：布美他尼

B：呋塞米

C：托拉塞米

D：依他尼酸

答案：A

84.由我国学者发现并用于抗疟的是

A：青蒿素

B：链霉素

C：甲硝唑

D：二氯沙奈

答案：A

85.下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

A：普萘洛尔

B：胺碘酮

C：地尔硫革

D：美西律

答案：A

86.关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述错误的是()

A：静脉滴注可致过敏样反应

B：利妥昔单抗主要用于淋巴瘤的治疗

C：对癌细胞和正常体细胞都有"杀灭"作用

D：贝伐珠单抗作用于血管内皮生长因子

答案：C

87.下列药物属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白ⅡB/ⅢA受体阻断剂的是

A：阿司匹林

B：替罗非班

C：双嘧达莫

D：硫酸亚铁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/696235130054011030