

2024 年安徽省望江县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题完整版附答案（达标题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 某患者，男，65 岁，高血压病史 5 年，先后服用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压波动的情况，到医院就诊。

- A: 有明显的肝肾毒性
- B: 建议单独用于不稳定性心绞痛
- C: 可降低心源性死亡的危险
- D: 为第一代短效钙通道阻滞剂

答案：D

2. 药师最基本的技能是

- A: 沟通技能
- B: 自主学习能力
- C: 调剂技能
- D: 药品管理技能

答案：C

3. 妊娠期妇女不宜选用药物是

- A: 华法林
- B: 维生素 A
- C: 青霉素
- D: 氯化钾

答案：A

4. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天

B: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天

C: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天

D: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天

答案：C

5. 应用两种以上药物以增强与确保疗效

A: 规律

B: 联合

C: 适量

D: 早期

答案：B

6. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径，半衰期 12h 的药物通常选择()

A: 每个半衰期给药 1 次

B: 2~3 个半衰期给药 1 次

C: 每日给药 1 次

D: 静脉滴注给药

答案：A

7. 对沙眼衣原体有强大的抑制作用的药物是

- A: 米诺环素？
- B: 硫酸锌滴眼液？
- C: 酞丁安滴眼液？
- D: 泼尼松龙？

答案：C

8. 可治疗男性性功能障碍的药物是

- A: 沙美特罗
- B: 维生素 E
- C: 西地那非
- D: 度洛西汀

答案：C

9. #NAME？

- A: #NAME？
- B: #NAME？
- C: #NAME？
- D: #NAME？

答案：D

10. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 5～10 分钟
- B: 10～20 分钟
- C: 20～30 分钟
- D: 15～30 分钟

答案：D

11. 能使人长时间忍受肌肉疼痛的是

- A: 利尿剂
- B: 蛋白同化激素
- C: 肽类激素
- D: 麻醉药品

答案：D

12. 与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是()

- A: 维生素 B
- B: 铝碳酸镁
- C: 阿司匹林
- D: 伏立康唑

答案：C

13. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 依他尼酸合用华法林
- B: 用药时同服甲氧氯普胺
- C: 磺胺类药与青霉素合用
- D: 抗酸药合用四环素类药

答案：A

14. 不宜与茶叶合用的药物是

- A: 辛伐他汀
- B: 磺胺类药物

C: 硫酸亚铁

D: 左旋多巴

答案：C

15. 慢性肾盂肾炎时，尿中可见()。

A: 红细胞管型

B: 血红蛋白尿

C: 乳糜尿

D: 白细胞管型

答案：D

16. 前列腺增生症治疗药物度他雄胺的不良反应是

A: 加重闭角型青光眼

B: 体位性低血压

C: 心动过缓

D: 性功能障碍

答案：D

17. 可碱化尿液，用于代谢性酸中毒的是

A: 硫酸镁

B: 乳酸钠

C: 氨基酸

D: 蛋白质

答案：B

18. 妊娠后期长期使用，可导致胎儿严重出血，甚至死胎的药物是

A: 叶酸拮抗剂

B: 雌孕激素、雄激素

C: 沙利度胺

D: 阿司匹林

答案: D

19. 抗类风湿关节炎药物中,至少服用 6 个月才能宣布无效,可导致失明的是

A: 青霉胺

B: 来氟米特

C: 氯喹

D: 柳氮磺吡啶

答案: C

20. 长期服用可导致或加重胃溃疡的药物是

A: NSAID

B: 抗酸剂

C: 质子泵抑制剂

D: 米索前列醇

答案: A

21. 患者,女,35 岁,因患有缺铁性贫血口服硫酸亚铁,该药物主要的不良反应是

A: 肝毒性

B: 心脏相关风险

C: 胃肠道反应

D: 肾毒性

答案: C

22. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 动力性腹泻？
- B: 消化不良性腹泻？
- C: 感染性腹泻？
- D: 分泌性腹泻？

答案：C

23. 能促使体格强壮、肌肉发达、增强爆发力，并缩短体力恢复时间的兴奋剂

- A: 利尿剂
- B: 精神刺激剂
- C: 蛋白同化激素
- D: β -受体阻断剂

答案：B

24. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 神经系统疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 胃肠道反应
- D: 肌病

答案：D

25. 提示"胰酶肠溶胶囊不宜嚼碎服用，以免药粉残留口腔内、发生溃疡"，是针对

- A: 交代用药途径及用药方法
- B: 交代用药注意事项
- C: 交代药物的用量
- D: 交代药品贮存条件与方法

答案：A

26. 中枢性降压药是

- A: 拉贝洛尔
- B: 胍苯哒嗪
- C: 利血平
- D: 可乐定

答案：D

27. 怕热的药品

- A: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装
- B: 可贮存于严密的药箱内
- C: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧
- D: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

答案：D

28. 属于雄激素受体阻断剂的是

- A: 黄酮哌酯
- B: 雌三醇
- C: 氟他胺
- D: 依立雄胺

答案：C

29. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 乙胺丁醇
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：D

30. 氢氯噻嗪所致的主要不良反应是

- A: 尿酸升高
- B: 血钠升高
- C: 支气管痉挛
- D: 外周血肿

答案：A

31. 三环类抗抑郁药中毒出现

- A: 肌肉震颤、抽搐
- B: 明显的锥体外系症状
- C: 谵妄、躁狂、幻觉
- D: 心血管毒性

答案：D

32. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是（）

- A: 东莨菪碱片
- B: 阿米洛利片
- C: 氟桂利嗪胶囊
- D: 左甲状腺素钠片

答案：D

33. 患者男,70 岁高血压病史 14 年,服用依那普利 20mg/日,平时血压控制不佳今晨大便时突然出现头疼、头晕,随即出现右侧肢体活动不利。血压为 190/100mmHg,头颅 CT 检查结果为左侧脑出血,出血量约 10ml,拟采用内科治疗,该患者首先应采取的治疗措施是 ()

- A: 肌肉注射利血平注射液
- B: 静脉滴注甘露醇注射液
- C: 口服氨氯地平片
- D: 静脉滴注硝酸甘油注射液

答案：B

34. 乳酸性酸中毒患者宜选用 ()。

- A: 二甲双胍
- B: 格列喹酮
- C: 胰岛素
- D: 瑞格美脲

答案：C

35. (2017 年真题) 高血压治疗药物选择时,ACEI 类药物禁用于 ()

- A: 痛风患者
- B: 胃溃疡患者
- C: 双侧肾动脉狭窄患者
- D: 心力衰竭患者

答案：C

36. 胶体果胶铋药物不良反应

- A: 性功能障碍

B: 黑便

C: 男性乳房女性化

D: 睡眠障碍

答案：B

37. 处方审核是处方调配的重要环节，药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方，不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

A: 无正当理由超药品说明书用药

B: 处方中使用了“遵医嘱”字样

C: 中药饮片和化学药物在同一处方中开写

D: 处方字迹模糊不易辨识

答案：A

38. 用于产后出血，但在胎盘娩出前禁用的药物是

A: 麦角新碱

B: 甲巯咪唑

C: 水合氯醛

D: 抗组胺药

答案：A

39. 自我药疗时，初治滴虫性阴道炎，每日口服甲硝唑 800mg 连续用药时间为

A: 5 天

B: 3 天

C: 1 天

D: 7 天

答案：D

40. (2021 年真题) 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

A: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

B: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用

C: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用

D: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药

答案：C

41. 可引起再生障碍性贫血

A: 维生素 A

B: 氯霉素

C: 苯妥英钠

D: 抗组胺药

答案：B

42. 两种药物配伍之后效价降低的是()

A: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液

B: 头孢曲松与复方氯化钠注射液

C: 青霉素与 5%葡萄糖注射液

D: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液

答案：C

43. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

A: 阿托品

B: 地高辛

C: 四环素

D: 氯噻嗪

答案: B

44. 助消化药不宜与抗菌药物、吸附剂同时服用；如必须联用，应间隔的时间是

A: 1 小时

B: 0.5 小时

C: 1.5 小时

D: 2~3 小时

答案: D

45. 以下可能导致锥体外系反应(药源性神经系统疾病)的药物是

A: 氯丙嗪

B: 哌甲酯

C: 茶碱

D: 麻黄碱

答案: A

46. 当药品存在安全隐患，需要进行召回时，决定召回药品的名称、规格、生产商、召回范围、召回级别、主要执行者等事宜的相关人员应该是

A: 质量部人员

B: 业务院长

C: 药品质量安全管理小组成员

D: 药剂科负责人

答案: C

47. 服用维生素 B

A: 脂肪

B: 食盐

C: 食醋

D: 酒

答案: D

48. (2019 年真题) 患者，女，27 岁，孕 32 周，因尿急、尿痛就诊，诊断为尿路感染，应选用的药物是

A: 阿莫西林胶囊

B: 莫西沙星片

C: 阿奇霉素片

D: 复方磺胺甲噁唑片

答案: A

49. 对 5 岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是

A: 20%阿司匹林溶液滴鼻

B: 布洛芬混悬液

C: 20%安乃近溶液滴鼻

D: 贝诺酯混悬液

答案: C

50. 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

- A: 30ml/min
- B: 40ml/min
- C: 25.5ml/min
- D: 34ml/min

答案：C

51. 可导致体重增加的抗癫痫药是

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 拉莫三嗪
- D: 苯妥英钠

答案：A

52. 稳定型心绞痛发作应首选的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 单硝酸异山梨酯
- C: 硝酸甘油
- D: 美托洛尔

答案：C

53. 肾衰竭者不能

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 洗胃

B: 催吐

C: 实施血液净化

D: 强利尿

答案：D

54. 能改善眼部干燥症状,缓解视疲劳的药物是()

- A: 山莨菪碱滴眼液
- B: 可的松滴眼液
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 聚乙烯醇滴眼

答案: D

55. 导致心脑血管事件的是

- A: 己烯雌酚
- B: 加替沙星
- C: 罗非昔布
- D: 阿托伐他汀

答案: C

56. 急性冠状动脉综合征患者使用他汀类药物降低 LDL-C 的目标值为

- A: <70mg / dl
- B: <40mg / dl
- C: <50mg / dl
- D: <60mg / dl

答案: A

57. 患者,男,50岁,诊断为高血压、冠心病。医师处方:氨氯地平片 10mgpoqd;美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd;贝那普利片 20mgpoqd;阿司匹林肠溶片 100mgpoqd;辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 氨氯地平片
- B: 美托洛尔缓释片
- C: 阿司匹林肠溶片

D: 贝那普利片

答案: D

58. (2019 年真题) 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

A: 滴眼剂

B: 含漱剂

C: 直肠栓剂

D: 软膏剂

答案: C

59. 哺乳期妇女泌尿道感染应该选用的药物是

A: 氨苄西林

B: 依托红霉素

C: 磺胺嘧啶

D: 米诺环素

答案: A

60. 以下有关 γ -GT 检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断急慢性白血病

B: 诊断痛风

C: 诊断恶性贫血

D: 诊断心肌梗死

答案: D

61. 可确诊为甲状腺功能减退症的医学检查指标是

A: TSH 降低，TT₄、FT₄ 升高

B: TSH 升高，TT₄、FT₄ 降低

C: 三酰甘油、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇增高，高密度脂蛋白胆固醇降低

D: TSH、TT4、FT4 升高

答案：B

62. 进食高蛋白食物可减轻药品不良反应的是

A: 格列本脲

B: 硫酸亚铁

C: 泼尼松

D: 西咪替丁

答案：C

63. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

A: 稳态一点法

B: PK/PD 参数法

C: 一点法和重复一点法

D: CTP 评分

答案：D

64. 脑出血急性期的病死率为

A: 30%~40%

B: 40%~45%

C: 10%~15%

D: 20%~30%

答案：A

65. 常见老年人 ADR 的药物类别,普萘洛尔致心动过缓、心脏停搏、诱发哮喘,加重心衰

- A: 抗胆碱药
- B: 抗生素
- C: β 受体阻断剂
- D: 钙通道阻滞剂

答案：C

66. 无治疗指征盲目补钙，应评判为

- A: 过度治疗用药
- B: 有禁忌证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 无适应证用药

答案：A

67. 某患者，女，14 岁，尿频、尿急、尿痛 3 天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

- A: 呋喃妥因
- B: 环丙沙星
- C: 头孢曲松
- D: 磺胺甲噁唑

答案：B

68. 1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍针对

- A: 半衰期大于 30 小时
- B: 半衰期大于 24 小时
- C: 半衰期 8~24 小时
- D: 半衰期小于 30 分钟

答案：C

69. 属于延长动作电位时程给药（第Ⅲ类）的抗心律失常药是

- A: 拉贝洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 胺碘酮
- D: 美西律

答案：C

70. 及时发现并确定“亮菌甲素事件”显示药物警戒的作用是

- A: 药品上市前风险评估
- B: 发现药品质量问题
- C: 药品上市后风险评估
- D: 发现与规避假、劣药品流入市场

答案：D

71. 代表乙型肝炎病毒核心抗体的是

- A: HBcAb
- B: HBeAb
- C: HBeAg
- D: HBsAb

答案：A

72. 能保护药品免受破坏的联合是

- A: 亚胺培南-西司他汀复方制剂
- B: 维生素 C 与铁剂同服
- C: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- D: 磷霉素联用其他抗菌药物

答案：A

73. 糖尿病合并肾病患者宜选用的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 格列苯脲

答案：A

74. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血
- B: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医
- C: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低
- D: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

答案：D

75. 代表乙型肝炎病毒 e 抗原的是

- A: HBeAg
- B: HBsAb
- C: HBcAb
- D: HBeAb

答案：A

76. 对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

- A: 苯溴马隆
- B: 泼尼松

C: 别嘌醇

D: 秋水仙碱

答案: A

77. 氟哌啶醇的禁用范围是

A: 3 岁以下幼儿

B: 1 岁以下婴儿

C: 新生儿

D: 婴幼儿

答案: D

78. 排便在一日内超过 3 次，或粪便中脂肪成分增多，或带有未消化的食物、黏液、脓血者称为腹泻。腹泻是由多种不同病因所致，在应用止泻药治疗的同时，实施对因治疗不可忽视。

A: 天麻素

B: 黄连素

C: 磷霉素

D: 谷维素

答案: B

79. 接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

A: 乙型肝炎病毒 e 抗原

B: 乙型肝炎病毒表面抗体

C: 乙型肝炎病毒表面抗原

D: 乙型肝炎病毒 e 抗体

答案: B

80. 张先生，30 岁，来药店咨询湿疹治疗药物。经询问后得知：他有多年的湿疹病史，经常购买氢化可的松软膏治疗湿疹。这次湿疹加重，足踝、小腿部、双手都有皮损分布，手部皮肤破裂并有渗出。药师应给予的正确建议是

- A: 建议患者就医
- B: 建议口服氢化泼尼松
- C: 建议使用炉甘石洗剂
- D: 建议改用强效外用糖皮质激素哈西奈德

答案：A

81. 溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

- A: 咖啡
- B: 吸烟
- C: 高盐饮食
- D: 饮茶

答案：A

82. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛的首选处方药是

- A: 舒马曲坦
- B: 苯噻啶
- C: 卡马西平
- D: 地西泮

答案：C

83. 有较强刺激性，服药时不可嚼碎的泻药是

- A: 硫酸镁
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 双歧杆菌

D: 比沙可啶

答案: D

84. 关于三酰甘油的临床意义说法不正确的是

- A: 大量饮酒可使三酰甘油出现假性升高
- B: 血清三酰甘油增高可提示动脉硬化及高脂血症
- C: 应用雌激素、避孕药可出现三酰甘油减少
- D: 长期饥饿或食用高脂肪食品可导致三酰甘油升高

答案: C

85. 儿童病情危重抢救时，多采用

- A: 局部给药
- B: 皮下注射
- C: 静脉给药
- D: 口服给药

答案: C

86. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒致发热、咽痛、流涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是

- A: 复方酚咖伪麻胶囊
- B: 速克感冒片
- C: 维 C 银翘片
- D: 速感宁胶囊

答案: A

87. 某女孩，6 岁，2 个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落。但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/697013134053010024>