

.....(.....)---2025

年真题精选

- 1、治疗牛的泡沫性瘤胃鼓气病，应首选用药方案是（）
- A. 鱼肝石松节油酒精合剂

B. 瘤胃穿刺放气

C. 内服二甲基硅油（消胀片）

D. 口服油类泻剂

E. 硫酸钠
- 2、下列不属于物理检查法的是（）
- A. 问诊

B. 视诊

C. 触诊

D. 叩诊

E. 听诊
- 3、阴囊疝猪去势术的常用保定方法是（）
- A. 仰卧保定

B. 提举保定

C. 保定架保定

D. 倒立保定

E. 无特殊要求

4、下列不属于听诊检查的内容是（）

- A. 动物心音状态的检查
- B. 动物支气管呼吸音的检查
- C. 动物肺泡呼吸音的检查
- D. 动物胃肠蠕动情况的检查
- E. 动物膈肌痉挛音的检查

5、临床症状以剧烈咳嗽为主，则提示最常见的是（）

- A. 气管炎
- B. 胸膜炎
- C. 喉炎
- D. 大叶性肺炎
- E. 支气管肺炎

6、双侧蹄叶炎的动物步态呈现（）

- A. 支跛
- B. 悬跛
- C. 黏着步样
- D. 紧张步样
- E. 正常步样

7、可用于外感风寒表实证的发汗解表、能与麻黄相配伍的药物是（）

- A. 防风
- B. 桂枝
- C. 薄荷
- D. 葛根
- E. 升麻

8、家禽发生渗出性素质是由于缺乏（）

- A. VitE
- B. VitA
- C. VitB
- D. VitC
- E. VitD

9、牛羊吃了大量的谷物类饲料，最易引起的疾病是（）

- A. 便秘
- B. 瘤胃积食
- C. 瘤胃酸中毒
- D. 皱胃阻塞
- E. 皱胃炎

10、六淫之中，暑邪的主要性质是（）

- A. 阴冷、凝滞
- B. 炎热、升散
- C. 重浊、黏滞
- D. 善行、主动
- E. 热极、炎上

11、可确诊食道阻塞的方法是（）

- A. 吞咽障碍
- B. 食道视诊或触诊
- C. 胃管探针
- D. X 光检查有异物阴影
- E. 触摸

12、治疗卵巢永久黄体最常用的激素是（）

- A. FSH
- B. LH
- C. 雌激素
- D. 孕酮
- E. PG

13、治疗家畜关节损伤时常使用的绷带是（）

- A. 蛇行绷带

- B. 交叉绷带
- C. 夹板绷带
- D. 螺旋绷带
- E. 其他绷带

14、临诊判断为马髌关节脱位的病例，其进一步确诊的最佳方法是（）

- A. 内方脱位
- B. 直肠检查
- C. X 线检查
- D. 髌关节脱位
- E. 下方脱位

15、具有泄热通便、润燥软坚、清火消肿之功效作用的药物是（）

- A. 黄柏
- B. 阿胶
- C. 当归
- D. 山药
- E. 芒硝

16、治疗反刍兽粪便干燥的首选泻下药物是（）

- A. 硫酸钠
- B. 人工盐

C. 硫酸镁

D. 面碱

E. 食用油

17、奶牛，妊娠黄体及其功能长期保存而不消失，若要治疗，最常用的激素是（）

A. FSH

B. LH

C. 雌激素

D. 孕酮

E. PG

18、干性啰音通常可提示的疾病是（）

A. 胸膜炎

B. 胸膜肺炎

C. 支气管炎

D. 肺炎

E. 肺坏疽

19、切开腹膜时采用持刀法是（）

A. 执笔式

B. 全握式

- C. 反挑式
- D. 支柱式
- E. 无特殊要求

20、真胃炎的发病机制是（）

- A. 胃酸分泌不足
- B. 胃酸分泌过多
- C. 植物性神经功能紊乱
- D. 中枢神经紊乱
- E. 其他原因

21、动物发生肠炎时一般选用的补液药物是（）

- A. 大量高渗溶液
- B. 大量浓盐水
- C. 等渗糖盐水
- D. 低渗糖盐水
- E. 选 A+C

22、牛临诊表现腹围增大，瘤胃内容物充满而坚硬，食欲和反刍停止，最可能是（）

- A. 前胃迟缓
- B. 瘤胃积食

- C. 瘤胃臌气
- D. 瘤胃积液
- E. 瓣胃阻塞

23、犬，眼目红肿，羞明流泪，视物不清，粪便干燥，尿浓赤黄，口色鲜红，脉数，对于该病证，给予辨证分型是（）

- A. 血虚生风
- B. 肝胆湿热
- C. 热极生风
- D. 肝火上炎
- E. 阴虚生风

24、上皮组织发生的恶性肿瘤称为（）

- A. 肉瘤
- B. 癌
- C. 畸胎瘤
- D. 母细胞瘤
- E. 组织瘤

25、神经干传导麻醉应用的药物是（）

- A. 3%的普鲁卡因
- B. 5%的普鲁卡因

- C. 丁卡因
- D. 盐酸普鲁卡因
- E. 乙醚

26、猪的恶露排出时间持续约（）

- A. 2-3 天
- B. 10-12 天
- C. 5-7 天
- D. 15 天左右
- E. 3 小时

27、在动物发生心肌炎时，不会出现的是

- A. 心音混浊
- B. 钟摆律
- C. 奔马调
- D. 顽固性心律不齐
- E. 金属样心音

28、小公猪去势术采用的保定方法（）

- A. 右侧卧
- B. 倒立保定
- C. 仰卧保定

- D. 左侧卧
- E. 无特殊要求

29、临床上常用的局部麻醉药为（）

- A. 保定宁
- B. 水合氯醛
- C. 氯丙嗪
- D. 普鲁卡因
- E. 乙醚

30、产道是胎儿产出的必经之路，硬产道是指（）。

- A. 骨盆
- B. 子宫
- C. 阴道
- D. 阴道前庭
- E. 脊柱

31、动物的眼结膜潮红是因为（）

- A. 血管充血
- B. 贫血
- C. 黄染
- D. 缺氧

E. 失血

32、四物汤的药物组成为（）

- A. 熟地、当归、白芍、川芎
- B. 大黄、黄精、黄芩、川芎
- C. 麻黄、桂枝、当归、白芍
- D. 熟地、当归、黄芩、炙甘草

33、家畜日射病的病因是（）

- A. 散热障碍
- B. 高热应激
- C. 热平衡失调
- D. 日光持续照射头部
- E. 酸碱失调

34、反刍动物发生瓣胃阻塞时，最佳治疗方法是（）

- A. 口服油类泻剂
- B. 瓣胃注射 10%硫酸钠
- C. 静注 10%氯化钠
- D. 用植物油
- E. 穿刺

35、健康牛的体温范围是（）

- A. 37.5 40.5
- B. 38.0 40.0
- C. 38.5 39.5
- D. 37.5 39.5
- E. 39 40.

36、白内障的主要临床表现是（）

- A. 角膜充血、溃疡
- B. 晶状体或晶状体及其囊浑浊、瞳孔变色、视力消失或减退
- C. 玻璃体浑浊、充血
- D. 睫状体浑浊或脱落
- E. 眼睛肿胀

37、善于清热燥湿，泻火解毒的中药是（）

- A. 半夏
- B. 黄连
- C. 桔梗
- D. 黄柏
- E. 旋覆花

38、下列叙述中不属于视诊检查内容的是（）

- A. 动物皮下脂肪的蓄积程度，肌肉的丰满程度
- B. 动物的精神状态及活动情况
- C. 动物体表皮肤及被毛的状态
- D. 动物粪便及尿液的多少、性状和混有物的情况
- E. 动物体温的高低情况

39、清热解毒兼凉血燥湿止痢的方剂是（）

- A. 曲蘖散
- B. 保和丸
- C. 白头翁汤
- D. 大承气汤
- E. 当归苁蓉汤

40、用乳头灌注法治疗牛乳房炎时必须在（）

- A. 挤奶前进行
- B. 挤奶时进行
- C. 挤完奶后 1 小时进行
- D. 挤奶后 3 小时进行
- E. 挤奶后立即进行

41、具有活血化瘀作用的药物是（）

- A. 丹参

- B. 杜仲
- C. 山药
- D. 黄连
- E. 桑叶

42、活血行气、祛风止痛的药物是（）

- A. 川芎
- B. 丹参
- C. 桃仁
- D. 赤芍
- E. 乳香

43、以膨胀性生长为特点的肿瘤是（）

- A. 恶性肿瘤
- B. 癌
- C. 畸胎瘤
- D. 母细胞瘤
- E. 良性肿瘤

44、马，耳鼻温热，泄泻，泻粪腥臭，尿液短赤，口津干黏，口渴贪饮，口色红黄，舌苔黄腻，脉象滑数。该病中兽医辨证属于（）

- A. 食积大肠

- B. 大肠冷泻
- C. 大肠湿热
- D. 大肠液亏
- E. 热结肠道

45、临床最常检查的猪体表淋巴结是（）

- A. 髂下颌淋巴结、腹股沟淋巴结
- B. 下颌淋巴结、股前淋巴结
- C. 肩前淋巴结、腹股沟淋巴结
- D. 股前淋巴结、肩前淋巴结
- E. 腹股沟淋巴结、腭淋巴结

46、动物发育到具有生成配子和生殖内分泌的功能，必须到哪个阶段以后（）

- A. 初情期
- B. 性成熟
- C. 初配适龄期
- D. 5-8 个月
- E. 12-18 个月

47、手术中肌肉组织缝合采用（）

- A. 连续螺旋缝合

- B. 荷包缝合
- C. 结节缝合
- D. 垂直内翻缝合
- E. 无特殊方式

48、大承气汤的组成是（）

- A. 大黄、枳实、厚朴
- B. 大黄、枳实、厚朴、芒硝
- C. 大黄、芒硝、甘草
- D. 大黄、芒硝、枳实
- E. 大黄、芒硝、枳实、莱菔子

49、不属于猪营养状况评价指标的是（）

- A. 背膘厚度
- B. 骨骼外露状况
- C. 肌肉丰满程度
- D. 被毛状况和光泽
- E. 对刺激的反应性

50、检查眼结膜一般要求在（）进行

- A. 自然光线下
- B. 灯光下

- C. 太阳光下
- D. 以上都是
- E. 以上都不是

51、手术创包扎用绷带是()

- A. 夹板绷带
- B. 固定绷带
- C. 结系绷带
- D. 交叉绷带
- E. 无特殊要求

52、黄体发育成熟，卵巢上有新卵泡开始生长发育，这个阶段是（）

- A. 发情前期
- B. 发情期
- C. 发情后期
- D. 发情间期
- E. 乏情期

53、动物肾功能一般应检查的血液生化指标是（）

- A. 血清胆固醇
- B. 血浆总蛋白
- C. 尿素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697164036041010041>