

2024 年安徽省金安区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题加答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是
- A: 静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应
 - B: 贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子
 - C: 对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用
 - D: 优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害

答案：C

2. 长期服用糖皮质激素不会产生下列哪种副作用()
- A: 高血钾
 - B: 肾上腺皮质萎缩
 - C: 溃疡或出血穿孔
 - D: 满月脸

答案：A

3. 长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充
- A: 维生素 C 和烟酸
 - B: 维生素 E 和叶酸
 - C: 复合维生素 B 和维生素 K
 - D: 维生素 A 和维生素 D

答案：C

4. 属于第四代头孢菌素的药物是()

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢噻吩
- D: 头孢噻肟

答案：B

5. 下列描述正确的是()

- A: 根据病变部位不同选择不同浓度和强度的药物
- B: 手掌损害应选择低效的制剂
- C: 外用药经皮吸收后不会产生不良反应
- D: 有刺激性的药物应从高浓度开始逐渐递减

答案：A

6. 治疗阴道滴虫病的首选药物是()

- A: 多黏菌素
- B: 甲硝唑
- C: 呋喃妥因
- D: 克林霉素

答案：B

7. (2019 年真题) 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是()

- A: 邻苯二甲酸二辛酯
- B: 乙醇
- C: 聚乙烯醇蓖麻油
- D: 聚氯乙烯

答案：C

8. 与两性霉素 B 合用可减少复发率产生协同作用的药物是()

- A: 阿昔洛韦
- B: 氟胞嘧啶
- C: 灰黄霉素
- D: 酮康唑

答案：B

9. 下列关于袪利尿药使用的描述中，不正确的是()

- A: 单独使用可能会使利尿作用降低
- B: 可联用作用部位不同的利尿药
- C: 出现利尿药抵抗时，可使用低效利尿药增大剂量
- D: 可多次应用最小有效剂量

答案：C

10. 氟喹诺酮类

- A: 禁用于早产儿、新生儿
- B: 禁用于胆道阻塞患者
- C: 禁用于 8 岁以下儿童
- D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

答案：D

11. (2016 年真题) 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是

- A: 毛果芸香碱
- B: 乙酰唑胺
- C: 甘露醇
- D: 噻吗洛尔

答案：A

12. (2016 年真题) 12 岁以下儿童禁用的非甾体抗炎药是

- A: 尼美舒利
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

答案: A

13. 属于耐酸耐酶的青霉素类药物是()

- A: 青霉素
- B: 阿莫西林
- C: 甲氧西林
- D: 丙匹西林

答案: C

14. (2020 年真题) 通过抑制 A 型单胺氧化酶, 减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解, 增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能, 发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 度洛西汀
- B: 吗氯贝胺
- C: 舍曲林
- D: 阿米替林

答案: B

15. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查, 筛查的目的是

- A: 表皮生长因子受体
- B: B 淋巴细胞表面的 CD20

C: 人表皮生长因子受体-2

D: 血管内皮生长因子

答案: C

16. 下述与西地那非无药物相互作用的是

A: 红霉素

B: 硝酸酯类

C: 西咪替丁

D: 阿司匹林

答案: D

17. 抗酸作用较强、慢而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多的是

A: 三硅酸镁

B: 氢氧化铝

C: 氢氧化镁

D: 碳酸钙

答案: D

18. 属于破坏 DNA 的铂类化合物的抗肿瘤药物是

A: 依托泊苷

B: 紫杉醇

C: 顺铂

D: 来曲唑

答案: C

19. 磷霉素的主要抗菌作用机制是

A: 抗叶酸代谢

B: 增加细菌胞浆膜的通透性

C: 干扰细菌细胞壁的合成

D: 抑制细菌蛋白质合成

答案: C

20. 糖肽类药的主要作用靶点是

A: 细胞内膜 PBP

B: 核糖体的 50S 亚基

C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

D: 核糖体的 30S 亚基

答案: C

21. 两性霉素 B 属于()

A: 多烯类抗真菌药

B: 丙烯胺类抗真菌药

C: 唑类抗真菌药

D: 棘白菌素类抗真菌药

答案: A

22. 下述属于第三代 α

A: 十一酸睾酮

B: 哌唑嗪

C: 坦洛新

D: 酚苄明

答案: C

23. (2020 年真题) 关于肝素和低分子肝素作用特点的说法, 错误的是

A: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长, 可以一日 1 次或 2 次给药

B: 皮下给药, 低分子肝素的生物利用度接近 100%

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用

D: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快

答案：C

24. 有关纤维蛋白溶解药的叙述，错误的是

A: 能使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶

B: 该药也称为血栓溶解药

C: 主要不良反应为凝血障碍

D: 主要代表药有链激酶、尿激酶

答案：C

25. ACEI 与 () 联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

A: 噻嗪类利尿剂

B: 留钾利尿剂

C: 人促红素

D: β 受体阻断剂

答案：C

26. 胰酶与下述哪种环境中药效最好

A: 微酸性

B: 强碱性

C: 酸性

D: 微碱性

答案：D

27. 属于 M 受体阻断剂的药物是

A: 阿托品

B: 奥布卡因

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 拉坦前列素

D: 布林佐胺

答案: A

28. 属于抗雌激素类的是

A: 己烯雌酚

B: 睾酮

C: 甲地孕酮

D: 他莫昔芬

答案: D

29. (2021 年真题) 用于治疗湿性视网膜黄斑变性的药物是 ()

A: 雷珠单抗注射液

B: 硫酸阿托品眼用凝胶

C: 聚乙二醇滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案: A

30. 尼尔雌醇属于

A: 雄激素

B: 孕激素

C: 雌激素

D: 糖皮质激素

答案: C

31. (2021 年真题) 关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 (SLG-2) 抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法, 错误的是 ()

A: 降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 适用于 1 型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒

C: 重度肾功能不全患者禁用

D: 降糖作用不依赖于胰岛 B 细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性

答案：B

32. (2017 年真题) 在痛风急性期禁用的药物是 ()

A: 布洛芬

B: 别嘌醇

C: 舒林酸

D: 秋水仙碱

答案：B

33. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换

B: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

C: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

D: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

答案：D

34. (2018 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的调节血脂药是 ()

A: 依折麦布

B: 非诺贝特

C: 辛伐他汀

D: 烟酸

答案：A

35. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 二甲双胍
- B: 正规胰岛素
- C: 格列喹酮
- D: 珠蛋白锌胰岛素

答案：C

36. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠宜选用

- A: 氯美扎酮
- B: 夸西泮
- C: 谷维素
- D: 氟西泮

答案：A

37. 发热需采用非甾体抗炎药时，应首选

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 双氯芬酸
- C: 布洛芬
- D: 阿司匹林

答案：A

38. 主要用于预防静脉血栓的口服药物是

- A: 尿激酶
- B: 华法林
- C: 链激酶
- D: 低分子肝素

答案：B

39. 下列哪项不是维生素 K 的适应证

- A: 早产儿及新生儿肝脏合成功能不足引起维生素 K 缺乏
- B: 用于弥散性血管内凝血症高凝期
- C: 水杨酸类药物过量引起的出血
- D: 梗阻性黄疸所致的出血

答案：B

40. 可直接地抑制凝血因子 Xa，并与抗凝血酶 II 结合，形成构象改变，使凝血酶抗 Xa 因子活性增强 270 倍，阻碍凝血酶（凝血因子 IIa）产生的抗凝血药是（）。

- A: 依诺肝素
- B: 阿哌沙班
- C: 磺达肝葵钠
- D: 水蛭素

答案：B

41. 不得与碱性物质或铁器接触的是

- A: 苯甲酸苄酯
- B: 阿达帕林
- C: 克罗米通
- D: 林旦霜

答案：D

42. 硫脲类药物用于

- A: 精神病
- B: 糖尿病
- C: 高血压
- D: 甲亢

答案：D

43. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是()

。

A: 两性霉素 B

B: 伏立康唑

C: 特比萘芬

D: 氟胞嘧啶

答案：C

44. 以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

A: 阿托品

B: 东莨菪碱

C: 后马托品

D: 新福林

答案：D

45. 适用于心功能比较稳定的 II ~ III 级心力衰竭患者的药物是

A: 多巴酚丁胺

B: 维拉帕米

C: 卡维地洛

D: 氯沙坦

答案：C

46. (2018 年真题) 仅用于绝经后妇女, 不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是 ()

A: 阿法骨化醇

B: 雷洛昔芬

C: 阿仑膦酸钠

D: 骨化三醇

答案: B

47. 体内缺乏维生素 E 会导致

A: 佝偻病

B: 不孕症

C: 夜盲症

D: 脚气病

答案: B

48. 可导致坏死性结肠炎的是

A: 利福平

B: 甲氨蝶呤

C: 阿糖胞苷

D: β 受体阻断剂

答案: C

49. 治疗耐药金黄色葡萄球菌所致的感染或 β -内酰胺类过敏患者的 G+ 菌严重感染，首选药物是

A: 替硝唑

B: 红霉素

C: 万古霉素

D: 克林霉素

答案: C

50. 糖皮质激素临床用于治疗 ()

A: 胃溃疡

B: 血小板减少症

C: 肺结核

D: 低血压

答案：B

51. (2019 年真题) 某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。

关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是 ()

A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg

B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

D: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

答案：C

52. 患者，女性，57 岁。高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

A: 普萘洛尔

B: 阿托品

C: 苯妥英钠

D: 维拉帕米

答案：B

53. 糖皮质激素禁用于严重高血压患者是因为

A: 水钠潴留

B: 抑制蛋白质合成

C: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解

D: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌

答案：A

54. 下列何药对心房颤动无治疗作用

A: 奎尼丁

B: 胺碘酮

C: 普萘洛尔

D: 利多卡因

答案：D

55. 以下药物治疗高血压时，给药次数为一日 2 次给药的是

A: 硝苯地平控释片

B: 非洛地平缓释片

C: 氨氯地平片

D: 硝苯地平缓释片

答案：D

56. 以下不属于地西洋的药理作用的是

A: 抗抑郁

B: 抗惊厥

C: 镇静催眠

D: 抗癫痫

答案：A

57. 属于头孢三代的是

A: 拉氧头孢

B: 头孢呋辛

C: 头孢唑林

D: 头孢曲松

答案: D

58. 繁殖期杀菌药是

A: 磺胺嘧啶

B: 异烟肼

C: 氟霉素

D: 头孢菌素

答案: D

59. 西咪替丁的禁忌证是

A: 应激性溃疡

B: 急性胰腺炎

C: 卓-艾综合征

D: 胃食管反流病

答案: B

60. 有性激素样副作用的是()

A: 呋塞米

B: 氨苯蝶啶

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

答案: C

61. 患者，女性，28岁。妊娠5个月。淋雨1天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10

- A: 头孢菌素
- B: 四环素类
- C: 磷霉素
- D: 青霉素

答案：B

62. 瑞舒伐他汀用于原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症的初始剂量是

- A: 10mg
- B: 5mg
- C: 15mg
- D: 20~40mg

答案：B

63. (2018 年真题) 用于治疗疥疮的药物有 ()

- A: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏
- B: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
- C: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- D: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

答案：C

64. 需要迅速抗血小板作用时，不能选用的二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

- A: 替罗非班
- B: 氯吡格雷
- C: 噻氯匹定
- D: 替格雷洛

答案：C

65. 关于氨基己酸的描述，错误的是

- A: 口服吸收缓慢
- B: 在体内维持时间短，不代谢
- C: 不与血浆蛋白结合
- D: 在血中以游离状态存在

答案：A

66. 糖皮质激素的免疫抑制作用是

- A: 提高中枢神经系统的兴奋性
- B: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理
- C: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- D: 提高机体对细菌内毒素的耐受力

答案：B

67. 关于口服硫酸亚铁的注意事项，不正确的是

- A: 老年人可适当增加剂量
- B: 宜在餐后或餐时服用
- C: 治疗剂量不得长期使用
- D: 颗粒剂应热开水冲服

答案：D

68. 羟基脲属于()

- A: DNA 多聚酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: 核苷酸还原酶抑制剂
- D: 胸腺核苷合成酶抑制剂

答案：C

69. 属于 P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

- A: 地高辛
- B: 红霉素
- C: 烟酸
- D: 利福平

答案：A

70. 双香豆素与苯巴比妥合用可

- A: 与其竞争结合血浆蛋白
- B: 竞争性对抗
- C: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- D: 产生协同作用

答案：C

71. 通过将身体的水分吸到肠道或防止大便中的水分被吸收来增加肠道中的水分来发挥致泻作用的是

- A: 酚酞
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 甘油

答案：B

72. 毒性大，不能注射用的抗真菌药是

- A: 克霉唑
- B: 灰黄霉素
- C: 咪康唑
- D: 制霉菌素

答案：D

73. 治疗青光眼宜选用

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 托吡卡胺滴眼剂
- C: 碘苷滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：D

74. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用氨溴索的同时，不宜联合应用的药品是

- A: 右美沙芬
- B: 利巴韦林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 感冒颗粒

答案：A

75. 属于第四代头孢菌素的药物是

- A: 头孢吡肟
- B: 头孢拉定
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢氨苄

答案：A

76. 碳酸氢钠可用于

- A: 呼吸性酸中毒
- B: 呼吸性碱中毒
- C: 代谢性碱中毒

D: 代谢性酸中毒

答案: D

77. 头孢拉定()

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

D: 肾毒性大

答案: D

78. 抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

A: 谷丙胺

B: 枸橼酸铋钾

C: 法莫替丁

D: 奥美拉唑

答案: D

79. 关于地高辛作用特点的说法，正确的是

A: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢，以原型药物从肾脏排泄

B: 地高辛口服生物利用度小于 50%

C: 地高辛通过激动 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶增强心肌收缩力

D: 地高辛静脉注射后作用持续时间为 2-3h

答案: A

80. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年，心律失常病史 2 年，长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是()

A: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎

B: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

C: 可致甲状腺功能减退，较为常见，发病隐匿

D: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

答案：B

81. 属于超长效胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 门冬胰岛素

B: 普通胰岛素

C: 甘精胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：C

82. 治疗厌氧菌引起的严重感染的药物是

A: 万古霉素

B: 克拉霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案：D

83. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

A: 来曲唑

B: 卡莫氟

C: 羟喜树碱

D: 甲氨蝶呤

答案：C

84. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)

- A: 乙琥胺
- B: 左乙拉西坦
- C: 地西洋
- D: 丙戊酸钠

答案：D

85. 头孢哌酮的主要清除途径是

- A: 主要经呼吸道排泄
- B: 主要经肾脏排泄
- C: 经肝、肾双途径清除
- D: 主要经肝脏清除

答案：C

86. 属于第一代头孢菌素口服制剂的是()。

- A: 头孢克洛
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢克肟
- D: 头孢拉定

答案：D

87. (2019 年真题) 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 复方碳酸钙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/698136131045007022>