

1. 呕吐严重且呕吐量大的疾病是 C
 - A. 急性胃炎
 - B. 肠梗阻
 - C. 幽门梗阻
 - D. 急性阑尾炎
 - E. 急性胆囊炎
2. 评估急性胰腺炎病人的病情，哪项最能说明预后不佳 E
 - A. 体温 39℃
 - B. 黄疸
 - C. 合并代谢性中毒
 - D. 全腹压痛、腹肌紧张
 - E. 手足抽搐
3. 不属于胃癌癌前情况的是 E
 - A. 慢性萎缩性胃炎
 - B. 胃息肉
 - C. 残胃炎
 - D. 恶性贫血
 - E. 进展期胃癌
4. 肝性脑病合并碱中毒时应选用 B
 - A. 谷氨酸
 - B. 精氨酸
 - C. 鸟氨酸
 - D. 色氨酸
 - E. 半胱氨酸
5. 肝硬化病人不宜大量放腹水，因可导致 A
 - A. 肝性脑病
 - B. 脱水
 - C. 上消化道出血
 - D. 电解质紊乱
 - E. 蛋白质丧失
6. 有幽门梗阻者行胃镜检查前 2~3 天应给予 A
 - A. 流食
 - B. 半流食
 - C. 低脂半流食
 - D. 少渣普食
 - E. 免奶普食
7. 肝硬化导致门脉高压的表现有 A
 - A. 腹水
 - B. 上腹饱胀
 - C. 蜘蛛痣
 - D. 大隐静脉曲张

E. 颈静脉怒张

8. 肝癌早期的诊断方法是 D

- A. γ -谷氨酰转肽酶同工酶
- B. 超声检查
- C. CT 检查
- D. 甲胎蛋白测定
- E. 肝穿刺活检

9. 腹部触诊有揉面感可见于 E

- A. 肝硬化
- B. 肝性昏迷
- C. 严重脱水
- D. 饥饿
- E. 结核性腹膜炎

10. 肠鸣音每分钟超过多少次可称肠鸣音亢进 E

- A. 2 次
- B. 4 次
- C. 6 次
- D. 8 次
- E. 10 次

11. 腹部移动性浊音，腹水至少达 C

- A. 100ml
- B. 500ml
- C. 1000ml
- D. 1500ml
- E. 2000ml 以上

12. 对肝硬化病人健康教育不正确的选项是 D

- A. 说明防治肝炎的重要性
- B. 防止使用对肝脏有害药物
- C. 合理安排休息，保证充足睡眠
- D. 多用保肝药物
- E. 缓解期应定期复诊

13. 板状腹见于 D

- A. 一般腹膜炎
- B. 炎症累及腹膜
- C. 结核性腹膜炎
- D. 急性弥漫性腹膜炎
- E. 脾破裂

14. 直肠癌病人粪便可呈 A

A. 脓血样

- B. 柏油样
- C. 果酱样
- D. 白陶土样
- E. 米泔水样

15. 对消化性溃疡有确诊价值的是 B

- A. X 线钡餐检查
- B. 胃镜检查
- C. 胃液分析
- D. 粪便隐血
- E. 幽门螺杆菌检查

16. 需绝对禁食的情况是 E

- A. 十二指肠溃疡合并黑便
- B. 肝性脑病前驱期
- C. 胃溃疡大便隐血试验持续阳性
- D. 消化性溃疡合并幽门梗阻
- E. 急性水肿型胰腺炎

17. 上消化道出血病人有口渴、烦躁、尿少、肤色苍白，其出血量在 B

- A. 200~300ml
- B. 300~500ml
- C. 450ml
- D. 500~1000ml
- E. >1000ml

18. 大量腹水病人最宜采取的体位是 B

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 坐位
- D. 侧卧位
- E. 高枕卧位

19. 大量腹水病人最宜采取的体位是 B

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 坐位
- D. 侧卧位
- E. 高枕卧位

20. 对急性消化道失液的病人，医嘱有以下液体，应首先输入的是 A

- A. 5%葡萄糖盐水
- B. 5%葡萄糖液
- C. 10%葡萄糖液
- D. 葡聚糖
- E. 5%碳酸氢钠溶液

21. 持续胃肠减压时间较长时，应加强的护理工程是 B

A. 预防压疮发生

- B. 注意口腔卫生
 - c. 及时更换收集瓶
 - D. 记录吸出物的量和质
 - E. 保持引流通畅
22. 肝癌高危人群的普查方法是 A
- A. 甲胎蛋白和 B 超
 - B. 放射性肝扫描
 - c. 肝穿刺针吸细胞学
 - D. 选择性肝细胞造影
 - E. CT 检查
23. 胃肠减压期间的护理，以下哪项是错误的 E
- A. 病人应禁食及停口服药物
 - B. 随时观察吸引是否有效
 - C. 注意口腔护理
 - D. 及时更换收集瓶
 - E. 假设发现胃管有鲜红血液吸出，继续持续吸引
24. 大肠癌最常见的转移途径为 B
- A. 直接蔓延 B. 淋巴转移
 - c. 动脉转移 D. 静脉转移
 - E. 种植转移
25. 早期胃癌诊断的最有效方法是 E
- A. B 超
 - B. CT
 - C. X 线钡餐造影 D. 胃液分析
 - E. 纤维胃镜
26. 对胃十二指肠溃疡急性大出血的非手术治疗护理，以下哪项措施不妥 C
- A. 定时观察脉搏、血压
 - B. 记录呕血或便血量
 - C. 快速输血，使血压高于正常值
 - D. 卧床休息
 - E. 暂禁食
27. 早期胃癌的诊断标准是 A
- A. 胃癌仅局限于黏膜和黏膜下层，不管有无淋巴结转移
 - B. 胃癌仅局限于黏膜和黏膜下层，且无淋巴结转移
 - c. 胃癌仅局限于黏膜层，且有淋巴结转移
 - D. 胃癌肿块直径 $<5\text{mm}$ ，且无淋巴结转移
 - E. 胃癌肿块直径 $<10\text{mm}$ ，且无淋巴结转移
28. 胃肠减压护理措施中，以下哪项不正确 C
- A. 病人应禁食 B. 保持减压管通畅
 - c. 胃管堵塞禁止冲洗 D. 注意口腔护理
 - E. 记录吸出液的量及性质
- 、
29. 食管全长约 B
- A. 15cm
 - B. 25cm
 - C. 40cm
 - D. 55cm
 - E. 60cm
30. 肝脏的血液供给有 3/4 来自 B
- A. 肝动脉
 - B. 门静脉
 - C. 脾静脉

D. 腹主动脉 E. 肺静脉

31. 胰岛仪细胞主要分泌 C

A. 胰岛素 B. 生长抑素 C. 胰高血糖素
D. 甲状腺素 E. 血清促胃液素

32. 胰岛 B 细胞主要分泌 A

A. 胰岛素 B. 胰高血糖素
C. 生长抑素 D. 降钙素
E. 促胃液素

33. 胰腺外分泌物质不包括 B

A. 胰淀粉酶 B. 胰高血糖素
C. 胰脂肪酶 D. 胰糜蛋白酶
E. 胰蛋白酶

34. 昏迷病人呕吐时将头偏向一侧是为了防止 D

A. 呕吐加剧 B. 昏迷加重 C. 血压下降
D. 窒息 E. 污染衣物

35. 慢性腹泻是指腹泻的病程超过 C

A. 1 周 B. 1 个月 C. 2 个月
D. 3 个月 E. 6 个月

36. 临床上最常见的急性胃炎是 E

A. 急性浅表性胃炎
B. 幽门螺杆菌引起的急性胃炎
C. 急性化脓性胃炎
D. 幽门螺杆菌以外的病原体引起的急性胃炎
E. 急性糜烂出血性胃炎

37. 应激引起急性胃炎的主要表现是 D

A. 上腹饱胀
C. 恶心、呕吐
E. 食欲减退
B. 上腹隐痛
D. 上消化道出血

38. 慢性胃炎的主要致病因素为 D

A. 消炎药物 B. 饮酒 C. 吸烟
D. 幽门螺杆菌 E. 胆汁反流

39. 血清壁细胞抗体阳性的慢性胃炎的主要发病 A
原因是

A. 与自身免疫有关
B. 与慢性理化刺激有关
C. 与饮酒有关
D. 由胃窦胃炎开展而来
E. 与胆汁返流有关

40. 慢性胃炎的主要临床表现是 A

A. 上腹部疼痛及饱胀不适
B. 恶心、泛酸 C. 呕血、黑便
D. 呕吐、腹泻 E. 乏力、消瘦

41. 确诊慢性胃炎主要依靠 E

A. 胃液分析 B. X 线钡餐检查

- C. 血清学检查 D. 幽门螺杆菌检测
E. 胃镜及胃黏膜活组织检查
42. 老年人慢性胃炎急性发作时不宜用 A
A. 氢氧化铝 B. 胃酶合剂 C. 阿托品
D. 乙氧连氮 E. 碳酸钙
43. 慢性胃炎根本饮食原则不包括 D
A. 高热量 B. 高蛋白 C. 高维生素
D. 高纤维素 E. 易消化
44. 慢性胃炎伴恶性贫血治疗时宜应用的维生素是 D
A. 维生素 A B. 维生素 B₁
C. 维生素 B₁₂ D. 维生素 E
E. 维生素 C
45. 慢性胃炎的健康教育中不正确的一项为哪一项 B
A. 注意饮食卫生
B. 防止使用刺激胃黏膜的药物
C. 戒除烟酒
D. 定期应用抗生素杀灭幽门螺杆菌
E. 防治呼吸道感染
46. 引起消化性溃疡发病最主要的黏膜侵袭因素是 D
A. 非甾体类抗炎药 B. 胆盐
C. 幽门螺杆菌感染 D. 胃酸和胃蛋白酶
E. 乙醇
47. 不属于消化性溃疡的黏膜防御修复因素是 E
A. 胃黏液-碳酸氢盐 B. 上皮细胞 C. 前列腺素 D. 表皮生长因子
E. 胆盐
48. 消化性溃疡周期性发作的时间大多在 C
A. 早春与初夏 B. 夏季
C. 秋季 D. 冬季
E. 初冬和冬春
49. 与消化性溃疡疼痛特点不符的表现是 B
A. 慢性、周期性发作
B. 胃溃疡疼痛位于剑突下正中或偏右
C. 胃溃疡疼痛常在进食后 60 分钟发生
D. 十二指肠溃疡有夜间疼痛发作
E. 十二指肠溃疡疼痛发作时进食后即能缓解
50. 消化性溃疡最常见的并发症是 A
A. 出血 B. 穿孔 C. 癌变
D. 休克 E. 幽门梗阻
51. 幽门梗阻最主要的临床表现是 B
A. 上腹痛节律性丧失 B. 呕吐酸酵宿食
C. 胃蠕动波 D. 上腹部空腹振水音
E. 脱水和低钾低氯性碱中毒
52. 提示溃疡病急性穿孔最有价值的体征是 C
A. 突然的剧烈腹痛 B. 上腹部明显压痛

- C. 肝浊音界消失 D. 肠鸣音亢进
E. 出现休克征象
53. 不符合胃溃疡癌变的表现是 B
A. 溃疡顽固不愈 B. 反酸及烧灼感加重
C. 食欲不振 D. 进行性贫血
E. 粪便隐血持续阳性
54. 诊断消化性溃疡首选的检查方法是 D
A. 胃液分析 B. 粪便隐血试验
C. X 线钡餐检查 D. 胃镜及黏膜活检
E. 幽门螺杆菌检测
55. 胃溃疡的 X 线直接征象为 B
A. 充盈缺损 B. 龛影 C. 胃窦变形
D. 痉挛性切迹 E. 局部压痛
56. 消化性溃疡病人饮食宜少量多餐的目的是 D
A. 使胃酸分泌有规律 B. 稀释胃酸
C. 减轻对胃的刺激
D. 减少促胃泌素的分泌
E. 维持正常消化规律
57. 治愈消化性溃疡最重要的措施是 E
A. 良好的饮食习惯 B. 保护胃黏膜
C. 抑制胃酸分泌
D. 消除对胃黏膜的刺激
E. 杀灭幽门螺旋杆菌
58. 属于保护胃黏膜的药物是 C
A. 氢氧化铝
C. 米索前列醇
E. 阿莫西林
B. 雷尼替丁
D. 兰索拉唑
59. 抑制胃酸分泌作用的药物是 D
A. 硫糖铝 B. 枸橼酸铋钾 C. 甲硝唑
D. 奥美拉唑 E. 米索前列醇
60. 消化性溃疡病人用药护理的错误指导是 C
A. 碱性抗酸剂宜在餐后 1 小时服用
B. 硫糖铝宜在餐前 1 小时服用
C. 胃黏膜保护剂宜在餐后服用
D. 枸橼酸铋钾不宜长期服用
E. H₂ 受体拮抗剂宜在餐中或餐后即刻服用
61. 不宜用于治疗胃溃疡的药物是 E
A. 奥美拉唑 B. 西米替丁 C. 甲硝唑
D. 氢氧化铝 E. 阿托品
62. 不适用于溃疡病出血的治疗方法是 B
A. 口服去甲肾上腺素 B. 双气囊三腔管压迫
C. 冰盐水洗胃 D. 西米替丁静脉注射
E. 纤维胃镜下高频电灼
63. 在我国引起肝硬化的最主要病因是 A

- A. 病毒性肝炎 B. 乙醇中毒
- C. 药物中毒 D. 日本血吸虫病
- E. 慢性肠道炎症

64.肝硬化形成的组织病理标志是 D

- A. 细胞变性坏死 B. 弥漫性纤维化
- C. 再生结节形成 D. 假小叶的形成
- E. 肝肝内血管床扭曲

65.硬化肝功能失代偿期最突出的临床表现是 D

- A. 肝功能异常 B. 肝掌 C. 蜘蛛痣
- D. 腹水 E. 脾大

66.肝硬化病人出现蜘蛛痣、肝掌、男性乳房发育的原因是 A

- A. 雌激素灭活作用减弱
- B. 垂体功能紊乱
- C. 凝血因子合成减少
- D. 醛固酮活性增加
- E. 门静脉高压引起外周血管瘀血

67.对门静脉高压症的诊断最有价值的表现是 D

- A. 脾肿大、脾功能亢进
- B. 黄疸、腹水
- C. 痔静脉扩张
- D. 食管、胃底静脉曲张
- E. 腹壁静脉曲张

68.形成肝硬化腹水的最主要的因素是 D

- A. 门静脉压力增高 B. 低清蛋白血症
- C. 肝淋巴液生成过多
- D. 抗利尿激素和继发性醛固酮增多
- E. 有效循环血容量缺乏

69.肝硬化病人全血细胞减少的主要原因是 B

- A. 营养吸收不良 B. 脾功能亢进
- C. 消化道出血 D. 肝制造清蛋白减少
- E. 骨髓造血功能受抑制

70.肝硬化最常见的死亡原因是 B

- A. 上消化道出血 B. 肝性脑病
- C. 肝肾综合征 D. 感染
- E. 电解质和酸碱平衡紊乱

71.肝硬化腹水呈血性时首先考虑并发 C

- A. 原发性腹膜炎 B. 结核性腹膜炎
- C. 原发性肝癌 D. 肝肾综合征
- E. 门静脉血栓形成

72.对肝硬化诊断有确诊价值的检查是 E

- A. 肝功能检查 B. 免疫功能检查
- C. 影像学检查 D. 内镜检查
- E. 肝穿刺活组织检查

73.肝硬化腹水的性质一般为 B

- A. 渗出液 B. 漏出液

- C. 介于漏出液与渗出液之间
D. 血性 E. 乳糜液
74. 引起自发性腹膜炎的病原体多为 A
A. 革兰阴性菌 B. 革兰阳性菌
C. 支原体 D. 真菌 E. 衣原体
75. 肝硬化病人进食时应细嚼慢咽和药物磨成粉末服用的目的是 B
A. 有利于下咽 B. 协助消化吸收
C. 防止氧耗增加诱发肝性脑病
D. 防止引起食管或胃底静脉曲张破裂出血
E. 以免加重腹水
76. 肝硬化腹水错误的治疗措施是 E
A. 限制钠盐摄入 B. 限制水的摄入
C. 补充蛋白质
D. 联合或交替使用利尿剂
E. 定期放腹水
77. 治疗难治性肝硬化腹水的较好方法是 B
A. 强烈利尿 B. 自身腹水浓缩回输
C. 反复大量放腹水 D. 大量补充清蛋白
E. 联合使用护肝药物
78. 腹水浓缩静脉回输的目的不包括 C
A. 提高血浆渗透压 B. 增加有效血容量
C. 纠正酸碱平衡
D. 去除腹水中小分子毒性物质
E. 增加尿量
79. 肝硬化大量腹水病人的体位宜采取 B
A. 平卧位 B. 半卧位
C. 头低脚高位 D. 膝肘位
E. 左侧卧位
80. 有关肝硬化病人的饮食原那么，不正确的一项为哪一项 D
A. 高热量 B. 高蛋白 C. 高维生素
D. 高脂肪 E. 易消化
81. 肝硬化病人每日每千克体重蛋白质的适宜摄入量为 B
A. 0.5~1.0g B. 1.0~1.5g
C. 2.0~2.5g D. 3.0~3.5g
E. 3.5~4.0g
82. 肝硬化腹水病人每日进水量应限制在 B
A. 500ml 左右 B. 1000ml 左右
C. 1500ml 左右 D. 2000ml 左右
E. 2500ml 左右
83. 肝硬化病人饮食护理错误的一项为哪一项 B
A. 高热量高蛋白饮食 B. 选用植物蛋白质
C. 禁烟酒
D. 防止刺激性强的食物
E. 充足的维生素

- 84.肝硬化食管静脉曲张破裂出血不能控制时宜立即采用 C
- A. 输血并肌注维生素 K
 - B. 注射垂体后叶素
 - C. 手术
 - D. 双囊三腔管压迫止血
 - E. 6-氨基乙酸
85. 肝硬化病人上消化道出血导致肝性脑病最主要的原理是 D
- A. 有效血容量减少
 - B. 肝解毒功能受损
 - C. 脑缺血缺氧
 - D. 肠道积血致产氨增多
 - E. 肾血流量减少使代谢产物排泄减少
- 86.我国原发性肝癌最常见的病因是 A
- A. 病毒性肝炎
 - B. 乙醇中毒性肝硬化
 - C. 血吸虫病性肝硬化
 - D. 胆汁性肝硬化
 - E. 黄曲霉毒素污染
- 87.目前诊断肝细胞性肝癌特异性最强的标志物是 C
- A. AKP
 - B. ALP
 - C. AFP
 - D. AFU
 - E. GGT2
88. 原发性肝癌最早转移的部位是 B
- A. 肠
 - B. 肝
 - C. 肺
 - D. 脑
 - E. 肾
- 89.肝癌非手术疗法中的首选方法是 E
- A. 全身化疗
 - B. 放射治疗
 - C. 免疫疗法
 - D. 生物疗法
 - E. 肝动脉化疗栓塞治疗
- 90.肝性脑病最常见的病因是 A
- A. 肝硬化
 - B. 重症病毒性肝炎
 - C. 原发性肝癌
 - D. 中毒性肝炎
 - E. 药物性肝炎
- 91.肝性脑病最早的表现是 B
- A. 昏睡
 - B. 性格和行为的改变
 - C. 定向力障碍
 - D. 反射亢进
 - E. 扑翼样震颤
- 92.肝性脑病最具有特征性的体征是 C
- A. 腱反射亢进
 - B. 肌张力增加
 - C. 扑翼样震颤
 - D. 踝阵挛
 - E. 巴宾斯基征阳性
- 93.能使肠腔内产氨减少的首选药物是 D
- A. 青霉素
 - B. 链霉素
 - C. 呋喃妥因
 - D. 新霉素
 - E. 复方磺胺甲基异恶唑
- 94.肝性脑病病人口服乳酶生的主要目的是 C
- A. 去除细菌毒素
 - B. 防止霉菌繁殖
 - C. 抑制大肠杆菌生长
 - D. 帮助消化
 - E. 降低肠道内 pH 值
- 95.肝性脑病病人口服乳果糖主要是为了 B

- A. 导泻 B. 酸化肠道
- C. 抑制肠菌生长 D. 补充能量
- E. 护肝

96.肝性脑病病人应当 E

- A. 供给足量的蛋白质
- B. 给予足量脂肪以提供热能
- C. 供给足量的糖和钠盐
- D. 每日给水不少于 2500ml
- E. 给予足量的碳水化合物

97.肝性脑病病人为保持大便通畅首选的灌肠液为 C

- A. 温开水 B. 生理盐水 C. 稀醋溶液
- D. 碳酸氢钠溶液 E. 肥皂水

98.肝性脑病昏迷期病人的饮食最适宜用 C

- A. 高热、高碳水化合物、高维生素、低蛋白质
- B. 高热、高糖、低脂、低盐、低蛋白质
- C. 高热、高糖、高维生素、无蛋白质流质食物
- D. 高热、高糖、高蛋白、少纤维食物
- E. 高热、高糖、高维生素、低脂、少量蛋白质食物

99. 肝性脑病病员要禁食蛋白质的主要原因是因为 A

- A. 蛋白质在肠内细菌和消化酶作用下产生氨
- B. 蛋白质在肠内细菌和消化酶作用下产生硫醇
- C. 进食蛋白质可使假性神经递质产生增多
- D. 进食蛋白质可使支链氨基酸产生增多
- E. 进食蛋白质可使芳香族氨基酸产生增多

100.肝性脑病病人神志恢复后恢复蛋白质饮食时的错误护理措施是 E

- A. 继续高热量饮食 B. 以碳水化合物为主
- C. 逐渐增加蛋白质摄入量
- D. 开始为每日 20g
- E. 以选用动物蛋白质为宜

101.肝性脑病禁用的维生素是 E

- A. 维生素 A B. 维生素 E
- C. 维生素 C D. 维生素 B₁₂
- E. 维生素 B₆

102.治疗各种终末期肝病的有效方法是 E

- A. 禁食蛋白质 B. 灌肠与导泻
- C. 口服抗生素 D. 人工肝
- E. 肝移植

103.急性胰腺炎属于 E

- A. 感染性疾病 B. 遗传性疾病
- C. 内分泌疾病 D. 免疫性疾病
- E. 自身消化性疾病

104. 引起急性胰腺炎最常见的病因是 A

- A. 血清淀粉酶
- C. 血清脂肪酶
- E. 血白细胞
- B. 尿淀粉酶
- D. 血钙

105. 确诊急性胰腺炎的血清淀粉酶值至少超过 E

- A. 100U/L B. 200U/L C. 300U/L
- D. 400 U/L E. 500U/L

106. 减少胰腺外分泌的方法不包括 E

- A. 禁食、胃肠减压 B. 应用胰升血糖素
- C. 应用抗胆碱药 D. 应用质子泵抑制剂
- E. 应用抑制胰酶活性药物

107. 具有抑制胰酶活性作用的药物是 D

- A. 生长抑素 B. 降钙素 C. 胰升血糖素
- D. 加贝酯 E. 西咪替丁

108. 缓解急性胰腺炎病人腹痛防止使用的药物是 C

- A. 阿托品 B. 哌替啶 C. 吗啡
- D. 地西泮 E. 山莨菪碱

109. 急性胰腺炎病人急性期需严格禁食、禁饮的时间是 B

- A. 12 小时 B. 1—3 日 C. 4—5 日
- D. 6~7 日 E. 10 日

110. 急性胰腺炎病人禁食期间每日补液量至少应到达 C

- A. 1000ml B. 2000ml C. 3000ml
- D. 4000ml E. 5000ml

111. 急性胰腺炎病人恢复进食脂肪每日不应超过 D

- A. 20g B. 30g C. 40g
- D. 50g E. 60g

112. 上消化道出血最常见的病因是 C

- A. 急性胃黏膜损害 B. 慢性胃炎
- C. 消化性溃疡 D. 胃癌
- E. 食管—胃底静脉曲张破裂

113. 呕出大量鲜红色血液且不易控制的常见病因为 D

- A. 十二指肠溃疡出血 B. 应激性溃疡出血
- C. 胆道出血
- D. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- E. 胃癌出血

114. 上消化道出血的特征表现为 D

- A. 休克肺 B. 周围循环衰竭

- C. 头晕、心悸、出汗 D. 呕血与黑粪
- E. 晕厥

115. 上消化道大出血一般是指数小时内出血量超过 D

- A. 200ml B. 300ml C. 500ml
- D. 1000ml E. 1500ml

116. 有关上消化道出血的不正确说法是 D

- A. 上消化道出血可引起氮质血症但尿素氮一般 $<14\text{mmol/L}$
- B. 上消化道出血可引起发热但体温不超过

38.5°C

- C. 出血早期血象大致正常
- D. 出血后消化性溃疡疼痛常加重
- E. 呕血与黑粪是上消化道出血特征性表现

117. 有关呕血与黑粪的讨论的错误观点是 E

- A. 有黑粪不一定有呕血
- B. 呕血常伴黑粪
- C. 呕血呈咖啡色是血液在胃内经胃酸作用形成亚铁血红素所致
- D. 柏油样便是血红蛋白铁与肠内硫化物作用形成硫化铁所致
- E. 幽门以上出血只表现为呕血而幽门以下出血只表现为黑粪

118. 上消化道出血早期简便有效的诊断方法是 E

- A. 上消化道钡餐检查 B. 纤维胃镜检查
- C. 胃液分析 D. 胃泌素测定
- E. 粪便隐血试验

119. 提示上消化道出血停止的临床表现是 D

- A. 肠鸣音亢进 B. 黑粪次数增加
- C. 脉压变小 D. 肢端转红变暖
- E. 脉搏细速

120. 消化道活动性出血或再次出血的征象不包括 B

- A. 肠鸣音亢进
- B. 网织红细胞计数下降
- C. 黑粪次数增多
- D. 尿素氮持续升高
- E. 红细胞计数下降

121. 急性上消化道大出血休克的首要护理措施是 B

- A. 通知医师 B. 建立静脉通路
- C. 迅速配血 D. 采取止血措施
- E. 密切观察病情变化

122. 上消化道大出血病人取去枕平卧下肢抬高的目的是 D

- A. 有利止血 B. 防止误吸
- C. 保持呼吸道通畅 D. 改善脑供血
- E. 防止呕吐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706020023132010143>