

## 中医眼科学试题及答案

1、中医称视网膜为

- A. 目系
- B. 视衣
- C. 黄仁
- D. 瞳神
- E. 神膏

**【答案】** B

2、没有起止. 经过目内眦的经脉是

- A. 足阳明胃经
- B. 手少阳三焦经
- C. 手太阳小肠经
- D. 足太阳膀胱经
- E. 以上都对

**【答案】** B

3、主要用于外感风热眼病的内治法是

- A. 泻火解毒法
- B. 滋阴降火法
- C. 疏风清热法

D. 退翳明目法

E. 祛风散寒法

**【答案】C**

4、泪腺位于眼眶()的泪腺窝内

A. 正上方

B. 外上方

C. 内上方

D. 外下方

E. 内下方

**【答案】B**

5、血流不畅或瘀血停聚所致眼病的内治法是

A. 活血化瘀法

B. 疏肝理气法

C. 益气养血法

D. 软坚散结法

E. 祛湿法

**【答案】A**

6、眼科时复病的主要发病特点是

A. 猝感疔气, 邪犯白睛

- B. 畏光流泪, 时作时止
- C. 热泪如涌, 眵多似脓
- D. 变化迅速, 病势凶险
- E. 目痒难忍, 呈周期性发作

**【答案】** E

7、为预防近视, 应注意营养均衡, 勿过食

- A. 肉类
- B. 鱼类
- C. 柑橘类水果
- D. 含钙高的食物
- E. 甜食. 软食

**【答案】** E

8、每只眼有()条眼外肌

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 8

**【答案】** D

9、患者 65 岁, 双眼冷泪长流, 拭之又生, 泪水清冷稀薄, 多因于

- A. 肝肾两亏, 约束无权
- B. 肝经实热, 泪窍失利
- C. 肝血不足, 外感风邪
- D. 脾肾阳虚, 收摄失司
- E. 以上都不是

**【答案】** A

10、患者, 男, 28 岁, 车祸外伤后 3 个月, 视盘色淡近苍白, 头痛健忘, 舌暗红有瘀点, 脉细涩。下列哪一方剂适用

- A. 四物五子丸
- B. 逍遥散
- C. 归脾汤
- D. 桃红四物汤
- E. 明目地黄汤

**【答案】** D

11、西医学之近视眼, 相当于中医之

- A. 能远怯近症
- B. 能近怯远症
- C. 视矇
- D. 青盲

E. 眯目外障

**【答案】** B

12、青风内障类似于西医什么类型的青光眼

A. 开角型青光眼

B. 闭角型青光眼

C. 继发性青光眼

D. 原发性青光眼

E. 绝对期青光眼

**【答案】** A

13、下列哪种疾病为眼科急重症

A. 针眼

B. 胞生痰核

C. 风赤疮痍

D. 睑弦赤烂

E. 眼丹

**【答案】** E

14、患者双目珠干涩, 黑睛星翳时隐时现, 伴有头晕. 口干. 心烦失眠, 舌红少苔, 脉细数, 应采用以下何种方法

A. 退翳明目法

B. 补益肝肾法

- C. 滋阴降火法
- D. 益气养血法
- E. 以上都不是

【答案】C

15、视锥细胞数量在何处最多

- A. 黄斑中心凹
- B. 黄斑鼻侧 1mm
- C. 黄斑颞侧 1mm
- D. 视网膜周边部
- E. 黄斑中心凹旁 0.5mm

【答案】A

16、麻痹性斜视时

- A. 双眼眼位上斜
- B. 双眼眼位外斜
- C. 患眼眼球斜向麻痹肌作用方向
- D. 患眼眼球斜向麻痹肌作用方向的对侧
- E. 患眼眼位不稳定

【答案】D

17、患者,男,46岁。患凝脂翳,现头目疼痛,畏光流泪,经查见抱轮红赤,黑睛生翳,表面污浊,如覆薄脂,舌红,苔薄黄,脉浮数,辨证属何证型

- A. 热重于湿证
- B. 湿重于热证
- C. 风热壅盛证
- D. 里热炽盛证
- E. 正虚邪留证

【答案】C

18、患眼自觉涩痛畏光,泪热眵结,白睛上小泡样颗粒隆起,其周围赤脉怒张;兼有口渴鼻干,便秘溲赤;舌红苔黄,脉数有力。属于

- A. 肺经燥热
- B. 肺阴不足
- C. 肺脾两虚
- D. 肝肾两虚
- E. 脾胃湿热

【答案】A

19、通睛,相当于西医学的哪种疾病

- A. 共同性内斜视
- B. 共同性外斜视
- C. 麻痹性斜视
- D. 动眼神经麻痹
- E. 上睑下垂

**【答案】** A

20、天行赤眼暴翳治疗应

A. 心肺同治

B. 肝肾同治

C. 心肝同治

D. 肝肺同治

E. 肺脾同治

**【答案】** D

21、以下哪项不是眼的附属器

A. 眼睑

B. 眼眶

C. 结膜

D. 晶状体

E. 泪器

**【答案】** D

22、眼睑的中医名称有

A. 胞睑

B. 眼胞

C. 睛帘



D. 约束

E. 目卑

【答案】 ABDE

23、消渴目病增殖期的标志性眼底变化是(据 1984 年我国制定 DR 分期标准,眼底出现新生血管为增殖期)

A. 微动脉瘤

B. 斑片状出血

C. 视网膜新生血管

D. 视网膜棉絮状斑

E. 黄斑水肿

【答案】 D

24、络阻暴盲者,外眼端好,猝然盲无所见,见情志抑郁,胸胁胀满,头痛眼胀,舌有瘀点,脉弦,治宜

A. 行气活血,通窍明目

B. 补气养血,化瘀通络

C. 清热疏肝,降逆和胃

D. 滋阴养血,柔肝息风

E. 滋阴降火,平肝息风

【答案】 A

25、眉棱骨痛时按压此处有压痛

- A. 睛明
- B. 丝竹空
- C. 阳白
- D. 攒竹
- E. 瞳子髻

**【答案】** D

26、眼内容物包括

- A. 房水. 玻璃体
- B. 房水. 晶状体. 视网膜
- C. 房水. 晶状体. 玻璃体
- D. 晶状体. 玻璃体. 脉络膜
- E. 房水. 晶状体

**【答案】** C

27、“目,肝之外候也。”上述论述引自()

- A. 《太平圣惠方·眼论》
- B. 《诸病源候论·目病诸候》
- C. 《素问·金匱真言论》
- D. 《灵枢·大惑论》
- E. 《审视瑶函·内外二障论》

【答案】B

28、下列哪一种眼病与疔气犯目有关

- A. 风赤疮痍
- B. 暴风客热
- C. 天行赤眼暴翳
- D. 漏睛疮
- E. 凝脂翳

【答案】C

29、患者 25 岁, 视力急降至失明, 伴目珠转动痛, 眼底视盘充血水脚; 易怒烦躁, 口苦胁痛, 失眠少寐; 舌红苔黄, 脉弦数。宜采用下列何方加减治疗

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 逍遥散
- C. 四物汤
- D. 白薇丸
- E. 以上都不是

【答案】A

30、组织学中角膜分为五层, 受损后形成不透明瘢痕影响视力主要的是

- A. 上皮细胞层
- B. 基质层
- C. 内皮细胞层

D. 后弹力层

E. 前弹力层

**【答案】** B

31、生理盲点中心位于

A. 注视点鼻侧  $15.5^\circ$  , 水平线上  $1.5^\circ$

B. 注视点颞侧  $15.5^\circ$  , 水平线下  $1.5^\circ$

C. 注视点鼻侧  $15^\circ$  , 水平线下  $1.5^\circ$

D. 注视点颞侧  $15^\circ$  , 水平线上  $1.5^\circ$

E. 注视点颞侧  $15^\circ$  , 水平线上  $1.5^\circ$

**【答案】** B

32、患者,女,65岁。素患漏睛,一周前突发头目剧痛,畏光难睁,经查见白睛混赤,神水混浊,黑睛凹陷深大,凝脂肥厚,并伴口苦,溲黄,便秘,舌红,苔黄,脉弦滑数,宜选下列何方加减治疗

A. 新制柴连汤

B. 托里消毒散

C. 四顺清凉饮子

D. 滋阴退翳汤

E. 加味修肝散

**【答案】** C

33、单眼骤然起病,上胞下垂,伴有目偏视,视一为二症状,兼见头晕. 恶心,舌淡苔白腻,脉弦滑,宜采用下列何方加减治疗

- A. 三仁汤
- B. 补中益气汤
- C. 正容汤
- D. 镇肝熄风汤
- E. 右归饮

【答案】C

34、《证治准绳》：“谓被物打触,物大则状大,物小则状小,若尖细之物触伤浅小者,可治可消。若粗厉之物伤大而深,及缺损神膏者,虽愈亦有瘢痕。若触及破膏者,必有膏汁或青黑色或白色如痰者流出,为害尤急”所描述的是下列哪种疾病

- A. 异物入目
- B. 热烧伤
- C. 真睛破损
- D. 辐射性眼损伤
- E. 撞击伤目

【答案】C

35、房水总量约占眼内容积的(

- A. 0.01
- B. 0.02

C. 0. 03

D. 0. 04

E. 0. 05

**【答案】** D

36、眼眶由几块骨组成

A. 6 块

B. 7 块

C. 8 块

D. 9 块

E. 10 块

**【答案】** B

37、混睛障的翳障形态特征是：

A. 黑睛表层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阳性

B. 黑睛深层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阴性

C. 黑睛深层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阳性

D. 黑睛深层呈地图状灰白色混浊, 荧光素染色阴性

E. 黑睛表层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阴性

**【答案】** B

38、天行赤眼的主要病因是

- A. 肺火上攻
- B. 猝感疠气之毒
- C. 湿热蕴蒸
- D. 风热上袭
- E. 肝火上攻

【答案】B

39、胎风内障的病因是

- A. 外伤
- B. 先天
- C. 年老
- D. 中毒
- E. 辐射

【答案】B

40、患者双眼昏矇日久,渐至失明,视盘色淡白,口眼干涩,头晕耳鸣,腰酸肢软,烦热盗汗,舌红苔薄白,脉细。宜选用何方

- A. 八珍汤
- B. 逍遥散
- C. 归脾汤
- D. 四物五子丸
- E. 明目地黄汤

**【答案】E**

41、糖尿病最常见. 最严重的并发症为

- A. 白内障
- B. 虹膜睫状体炎
- C. 视网膜病变
- D. 青光眼
- E. 角膜结膜炎

**【答案】C**

42、与七情过激有关的眼病有

- A. 绿风内障
- B. 青风内障
- C. 圆翳内障
- D. 高风内障
- E. 漏睛

**【答案】AB**

43、黄斑部樱桃红斑见于

- A. 视网膜中央静脉阻塞
- B. 视网膜静脉周围炎
- C. 视网膜中央动脉阻塞



D. 视网膜色素变性

E. 糖尿病性视网膜病变

**【答案】C**

44、漏睛疮的病因是

A. 火疳缠绵不愈, 渐侵及黑睛而成

B. 心经蕴热, 复感风邪所致

C. 恣嗜烟酒, 过食肥甘之品而生

D. 屈光不正, 白睛涩痛所致

E. 风沙阳光长期刺激而成

**【答案】B**

45、肝劳的主要临床表现如头眼胀痛等, 常在以下哪种情况下出现

A. 晨起后

B. 劳动后

C. 游泳后

D. 患肝病后

E. 久视后

**【答案】E**

46、青盲病机的关键是

A. 玄府闭塞, 脉络不通

- B. 先天禀赋不足
- C. 邪毒外袭
- D. 七情所伤
- E. 酒色过度. 目力过劳

【答案】A

47、患者双眼外视端好, 视物昏蒙, 兼有胁胀. 胸闷, 脉弦, 治则应是以

- A. 补益肝肾法
- B. 活血化瘀法
- C. 滋阴降火法
- D. 疏肝理气法
- E. 以上都不是

【答案】D

48、黑睛生翳, 病至后期, 风热已除, 遗留翳障者, 宜用

- A. 加减拨云退翳散
- B. 海藏地黄散
- C. 知柏地黄汤加退翳药
- D. 羚羊钩藤汤
- E. 养阴清肺汤加味

【答案】A

49、关于早产儿视网膜病变表现,下列哪项不是

- A. 视网膜嵴
- B. 视网膜外纤维血管组织增生
- C. 视网膜脱离
- D. 视网膜血管化与非血管化区域之间存在分界线
- E. 视网膜出血. 水肿

**【答案】** E

50、头目胀痛,眼珠变硬可由于

- A. 火热上炎,清窍受扰,经络壅滞
- B. 肝胆热毒炽盛,上攻黑睛
- C. 脾失健运,水湿停聚化痰
- D. 元气衰惫,肝肾精血亏损,目窍失养
- E. 气逆化火,引动肝风,风火上扰

**【答案】** E

51、《银海指南》的作者是

- A. 顾锡
- B. 马化龙
- C. 王子固
- D. 邓苑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706040034141010050>