

胸外科考试题

一、单选题

- 1 胸部损伤后咯血或痰中带血提示：C
- A：气胸
- B：血胸
- C：肺或支气管损伤
- D：食管损伤
- E：损伤性窒息
- 2 开放性胸部损伤诊断的主要依据是：D
- A：胸部皮肤裂伤
- B：气管或食管裂伤。
- C：肋骨骨折刺破胸膜
- D：胸壁创口与胸膜腔相通。
- E：开放性肋骨骨折
- 3 胸部损伤外科治疗原则是：E
- A：纠正酸碱平衡失调
- B：纠正电解质紊乱
- C：给予脱水利尿剂
- D：给予止痛，输血
- E：纠正循环，呼吸功能障碍
- 4 胸部损伤下述哪种情况为剖胸探查手术适应征：D
- A：气胸肺萎陷超过 30%
- B：多根多处肋骨骨折
- C：胸部爆震伤
- D：进行性血胸
- E：损伤性窒息发绀严重
- 5 能出现反常呼吸的肋骨骨折是：D
- A：两根肋骨骨折
- B：两根以上肋骨骨折
- C：双侧肋骨单根骨折
- D：多根多处肋骨骨折
- E：多发性肋软骨骨折
- 6 多根多处肋骨骨折急救要点主要是：B
- A：输血补液，防治休克
- B：控制反常呼吸，保持呼吸道通畅
- C：立即行开胸探查术
- D：加压给养
- E：镇静，镇痛
- 7 创伤性窒息最常见的原因是：C
- A：胸部撞击伤
- B：胸部摔伤
- C：胸部暴力挤伤
- D：胸部扑打伤
- E：胸部高压气浪冲击伤

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

8 进行性血胸是指：E

A：损伤后 DIC

B：血胸量大于 500ml

C：血胸量大于 1000ml

D：胸腔闭式引流一次放出血量达 500ml

E：闭式引流后，引流量每小时大于 200ml，持续 3 小时

9 损伤性血胸，胸腔内积血不凝固的原因是：E

A：多种凝血因子的减少

B：胸腔内渗出液稀释

C：主要是凝血酶原减少

D：腔静脉出血

E：肺、心脏、膈活动去纤维蛋白作用

10 开放性气胸的病理生理改变,下述哪项错误的是:E

A：伤侧负压消失

B：伤侧肺萎陷

C：肺内部分气体对流

D：纵隔扑动

E：伤侧有反常呼吸

11 开放性气胸患者呼吸困难最主要的急救措施是：E

A：吸氧

B：输血补液

C：气管插管行辅助呼吸

D：立即剖胸探查

E：迅速封闭胸部伤口

12 患者胸部外伤 2 小时.查体:脉搏 120/分,血压 12/8kPa,右胸可触到骨擦感和皮下气肿,叩诊鼓音,呼吸音消失,急救处理是：B

A：输血,补液,抗休克

B：立即胸腔排气

C：胶布固定

D：应用升压

E：氧气吸入

13 右血胸患者,急诊入院.查体:脉搏 120 次/分,血压 10.7/6.7kPa 气管左移,输血同时作右胸闭式引流术,第 1 小时引流量 200ml,第二小时为 250ml,第三小时为 180ml,血压虽经输血不见回升,此时最有效的处置是：C

A：继续输血补液

B：给止血药

C：剖胸探查止血

D：闭式引流加负压吸引

E：给血管活性药

14 病人胸部受伤，急诊入院，经吸氧，呼吸困难无好转，有发绀，休克。查体：左胸饱满，气管向右移位，左侧可触及骨擦音，叩之鼓音，听诊呼吸音消失，皮下气肿明显，诊断首先考虑是 C

A 肋骨骨折

BX 力性气胸

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

- C 肋骨骨折并 X 力性气胸
- D 血心包
- E 闭合性气胸

15 一 X 力性气胸患者，急诊入院。X 线片见左肺完全萎缩，纵隔向右移位，立即给左锁中线第二肋间置闭式引流，引出大量气体，但病人呼吸困难不见好转，左呼吸音消失，皮下气肿有扩延，此诊断应考虑 A

- A 支气管或肺广泛裂伤
- B 食管裂伤
- C 引流管位置过高
- D 血心包
- E 并发血胸

16 男，35 岁。车祸伤 2 小时。体格检查：左侧第五肋骨折，左则胸腔积液，为其行胸腔闭式引流正确的部位是 D

- A 锁骨中线第二肋间
- B 腋前线第八肋间
- C 腋后线第十肋间
- D 腋中线与腋后线之间第 6—8 肋间
- E 切口沿肋骨下缘

17 男，34 岁，右胸车祸伤 1 小时，呼吸困难，发绀。查体：右前胸可见反常呼吸运动。病人吸气时，下列哪些病理生理变化是不正确的 C

- A 软件胸壁内陷
- B 纵隔移向健侧
- C 伤侧膈肌上升
- D 静脉回流受阻
- E 二氧化碳滞留

18 男性，38 岁，车祸伤半小时。查体：发绀，烦躁不安，呼吸困难。左胸第 5 肋间处见直径约 4cm 不规则创口并可闻及气体进出声。此病例的病理生理改变是 A

- A 纵隔扑动造成循环衰竭
- B 急性肺水肿导致气体交换降低
- C 纵隔向健侧移位，伤侧肺代偿性膨胀
- D 胸膜腔内压力不断升高导致呼吸衰竭
- E 吸气时健侧胸膜腔内压力增高，纵隔摆向伤侧

19 脓胸纤维板剥除术的适应证 A

- A 病程短的慢性脓胸，肺内无病变
- B 急性包裹性脓胸
- C 肺内有病灶，肺不能复 X
- D 伴支气管胸膜瘘
- E 病程久，肺有纤维变性

20 急性脓胸在病程上超过几周为慢性脓胸 B

- A 3 周
- B 6 周
- C 12 周
- D 24 周
- E 48 周

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

21 急性多房性脓胸最适应的治疗方法是 D

- A 大量抗生素治疗
- B 胸腔穿刺排脓
- C 胸腔闭式引流
- D 开胸清除脓汁，闭式引流
- E 胸廓改形术

22 急性脓胸经胸穿刺后，脓汁又迅速增多，其适当的治疗方法，是 C

- A 加大抗生素用量
- B 增加胸穿次数
- C 胸腔闭式引流
- D 周身支持疗法
- E 开胸手术清除脓汁

23 诊断急性脓胸最可靠的依据，是 D

- A 高热，胸痛
- B X 线所见胸部致密影
- C 白细胞升高
- D 胸穿抽出脓液
- E 抗生素治疗有效

24 急性脓胸并发支气管胸膜瘘者，首选用的治疗，是 B

- A 胸腔穿刺排脓
- B 胸腔闭式引流术
- C 开放引流
- D 瘘口缝合
- E 病肺切除

25 男患，11 岁。发热，胸痛，咳嗽约 2 周，近 5 天有呼吸困难。体温 39℃，脉搏 120 次/分，呼吸 30 次/分，胸片见：第七肋高度有液平面，胸穿抽出稀薄脓汁，治疗方法主要是 C

- A 周身抗生素治疗
- B 周身支持疗法
- C 胸腔闭式引流
- D 胸腔穿刺排脓
- E 胸腔内注入抗生素

26 男性，19 岁。寒战，发热，咳脓痰 3 天。体温 40℃，X 线胸片示右肺下叶大片致密影，右胸腔积液。体格检查中不应该有的体征是 D

- A 气管移向健侧
- B 右胸叩诊浊音
- C 右胸活动度小
- D 右胸肋间隙变窄
- E 右肺呼吸音减弱

27 男性幼儿，4 岁。发热，咳脓痰 2 周。体温波动于 38℃—39℃，X 线胸片示右肺下叶大片致密影，右胸腔积液。最常见的致病菌为 E

- A 链球菌
- B 厌氧菌
- C 肺炎球菌
- D 大肠杆菌

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

E 葡萄球菌

28 肺癌较常见的类型，是 D

A 腺癌

B 未分化癌

C 肺泡细胞癌

D 鳞状细胞癌

E 小细胞肺癌

29 下列哪项对肺鳞癌不正确 C

A 肺癌中最常见

B 常为中心型

C 生长迅速，病程短

D 对放疗，化疗较敏感

E 血行转移发生晚

30 肺癌的转移方式中，下列何者正确 D

A 鳞癌发生血行转移出现较早

B 肺泡细胞癌，早期血行淋巴转移

C 腺癌早期发生淋巴转移，血行转移较晚

D 未分化癌早期出现血行，淋巴转移

E 淋巴转移只发生肺癌同侧

31 肺癌常见的症状，是 C

A 脓性痰

B 白色泡沫样痰

C 血痰

D 胸闷，气短

E 肺部有干罗音

32 对放疗最敏感的肺癌是 A

A 小细胞未分化癌

B 鳞癌

C 腺癌

D 肺泡细胞癌

E 以上均不敏感

33 放射疗法禁忌，下列哪项错误 E

A 呈现恶病质者

B 有广泛转移

C 高度肺气肿

D 癌性空洞，肿瘤过大

E 肺门转移切除未彻底

34 男性，40 岁。20 年前患过肺结核外，平素健康，近 3 个月来有刺激性咳嗽，痰中偶有血丝，有时发热。X 线示：右肺上叶前段有 2cm × 2.5cm 的块状阴影，边缘不整呈分叶状，痰查脱落细胞 3 次均阴性，诊断首先考虑 D

A 肺结核

B 肺脓肿

C 肺囊肿

D 肺癌

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

E 肺良性肿瘤

35 男性，49 岁。刺激性咳嗽 5 个月，视物不清 10 天。胸片示左肺上叶尖段边缘直径 8cm 不规则块状阴影。此病变造成的颈交感神经综合征不包括 D

A 面部无汗

B 瞳孔缩小

C 眼球内陷

D 声音嘶哑

E 上眼睑下垂

36 男性，37 岁。右上叶肺癌切除术后 24 小时，肺癌的非转移性全身症状即逐渐消失。此类症状不包括 E

A 骨关节痛

B 重症肌无力

C 男性乳腺增大

D cushing综合征

E 颈交感综合征

37 男性，29 岁。刺激性咳嗽 1 个月，头痛 10 天。胸片显示左肺门块状阴影，颅脑 CT 发现颅内占位性病变。考虑肺癌脑转移，肺内原发癌最可能的病理类型，是 C

A 鳞癌

B 腺癌

C 小细胞癌

D 大细胞癌

E 细支气管肺泡癌

38 关于晚期肺癌压迫侵犯临近器官、组织或发生远处转移时，下列征象不正确的是 C

A 侵犯膈神经，引起同侧膈肌麻痹

B 侵犯喉返神经，引起声带麻痹，声音嘶哑

C 骨关节病综合征

D 侵犯胸膜，引起胸膜腔积液

E 侵入纵隔，压迫食管，引起吞咽困难

39 男性，30 岁。低热，咳嗽并痰中偶带血丝 20 天，胸片显示右肺上叶不 X。最可能的诊断是 A

A 肺癌

B 肺脓肿

C 肺结核球

D 支气管肺炎

E 纵隔淋巴肉瘤

40 男性，65 岁。低热，咳嗽并痰中带血丝 3 个月。胸片显示左肺上叶不 X，少量胸膜腔积液。为确诊，进一步检查应首选 D

A 胸部 CT

B 剖胸探查

C 胸腔镜检查

D 支气管镜检查

E 经胸壁穿刺活组织检查

41 男性，35 岁。刺激性咳嗽并痰中带血丝 6 个月。胸片示左肺中央型块影，左肺上叶不 X，左胸腔中量积液，右纵隔阴影增宽，轮廓呈波浪形。右侧的病变应考虑是肺癌的 A

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

- A 交叉转移
 - B 直接扩散
 - C 细胞脱落种植
 - D 经肺循环血行转移
 - E 经体循环血行转移
- 42 食管癌好发部位，是 C
- A 颈部食管
 - B 胸部食管上段
 - C 胸部食管中段
 - D 胸部食管下段
 - E 腹部食管
- 43 食管癌病理分型，哪项是错误的 C
- A 缩窄型
 - B 蕈伞型
 - C 梗阻型
 - D 髓质型
 - E 溃疡型
- 44 食管癌的典型症状，是 E
- A 胸骨后烧灼感
 - B 食管内异物感
 - C 咽下食物硬噎感
 - D 咽下食物停滞感
 - E 进行性吞咽困难
- 45 食管癌早期诊断简易而有效的方法，是 C
- A X 线食管钡透
 - B 食管镜检查
 - C 带网气囊检查
 - D 气管镜检查
 - E 同位素扫描
- 46 早期食管癌的病变 X 围，是 A
- A 限于粘膜层
 - B 侵入或侵透肌层
 - C 远处淋巴结转移
 - D 其他器管转移
 - E 病变长度超过 5cm
- 47 食管炎与早期食管癌的鉴别，主要方法是 C
- A 胸骨后灼痛
 - B 食管钡透粘膜紊乱
 - C 脱落细胞检查
 - D 免疫诊断方法
 - E 试验治疗
- 48 早，中期食管癌常用的手术方法是 C
- A 食管胃转流术
 - B 食管癌切除，用结肠食管重建术

- C 食管癌切除，用胃食管重建术
- D 食管癌切除，用空肠食管重建术
- E 胃造瘘术

49 食管癌病人有持续性胸背痛，多表示 B

- A 癌肿部有炎症
- B 癌已侵犯食管外组织
- C 有远处转移
- D 癌肿较长
- E 食管气管瘘

50 男性，50 岁。咽部异物感 1 月，肝炎病史 20 年。查体：锁骨上未触及肿大淋巴结，肝脾不大。进一步检查，首先应考虑 D

- A 食管镜
- B 胸部 CT
- C 腹部超声波
- D 食管 X 线钡餐透视
- E 带网气囊食管脱落细胞检查

51 男性，52 岁。6 个月前发现进食哽噎感，其后症状逐渐加重，近 3 周只能进全流质，体重减轻，体力下降。查体：脉搏 80 次/分，血压 17/12kPa，体温 36.5℃，消瘦，颈、锁骨上淋巴结未触及，化验正常，食管钡剂造影，于食管中、下段见 8cm 狭窄，粘膜破坏，其诊断是 E

- A 贲门失弛缓症
- B 食管良性肿瘤
- C 腐蚀性食管灼伤
- D 食管炎
- E 食管癌

52 病人，22 岁。吞咽不畅，胸骨后沉重不适，症状时轻时重，时有呕吐，吐出食管潴留的食物，病史 2 年，用药症状无缓解，作食管钡剂造影，食管下端呈鸟嘴样狭窄，该病人诊断是 C

- A 食管癌
- B 食管良性肿瘤
- C 贲门失弛缓症
- D 食管炎
- E 食管憩室

53 男性，54 岁，进行性吞咽困难已半年，食管钡透见中段食管有 6cm 长狭窄，管壁僵硬，粘膜破坏，最适宜的治疗方法 D

- A 放射疗法
- B 化学疗法
- C 激光疗法
- D 放疗和手术切除
- E 胃造瘘术

54、男性，50 岁，吞咽困难 6 个月。食管 X 线吞钡检查可出现“半月征”压迹，食管镜检查可见肿瘤表面光滑，正常，最可能的诊断是 C

- A 食管癌
- B 贲门失弛缓症

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

- C 食管良性肿瘤
- D 食管炎
- E 食管静脉曲张

55、男性，70岁。吞咽困难3个月。食管钡透：中段有3cm的不规则食管充盈缺损，取活体组织病检为鳞癌。心电图有ST段下降，T波倒置，肺功：严重障碍，其治疗方法为D

- A 药物治疗
- B 根治性手术切除
- C 姑息性手术
- D 放射治疗
- E 胃造瘘术

56 男性，40岁。平时喜欢饮热开水及热粥，近5个月有进食困难，并逐渐加重。钡餐检查：食管中段有5cm狭窄，粘膜断裂，最可能的诊断是 A

- A 食管癌
- B 食管瘢痕性狭窄
- C 食管炎
- D 贲门失弛缓症
- E 食管静脉曲张

57 一贲门失弛缓症患者，病史10余年，近一月症状加重，反复呕吐，其治疗方法为 E

- A 少食多餐
- B 饭后散步
- C 应用平滑肌松弛药
- D 扩X疗法
- E 食管下段及贲门肌层切开

58 对纵隔描述不正确的是 E

- A 纵隔内有心脏、大血管、食管、气管、胸腺
- B 以胸骨角与第4胸椎下缘的水平连线为界，纵隔分成上，下两部分
- C 在气管，心包前面的间隙为前纵隔
- D 在气管，心包后面的称后纵隔
- E 原发性纵隔肿瘤以恶性多见

59 神经源性肿瘤多见于 B

- A 前纵隔
- B 后纵隔
- C 上纵隔
- D 下纵隔
- E 中纵隔

60 关于胸腺瘤不正确的是 C

- A 好发于前上纵隔
- B 可合并重症肌无力
- C 多不采取手术治疗
- D 多为良性
- E 与自身免疫机制有关

61 下列哪种纵隔肿瘤的治疗方法不正确 C

- A 胸腺瘤采取手术治疗
- B 胸腔镜下行神经源性肿瘤切除

- C 恶性淋巴源性肿瘤手术切除
- D 胸骨后甲状腺肿行手术切除
- E 畸胎瘤行手术治疗

62.开放性气胸产生纵隔摆动主要是由于：（）

- A．伤侧胸膜腔负压消失
- B．呼气与吸气时两例胸膜腔压力差不同
- C．健侧胸膜腔负压增加
- D．健侧肺萎陷
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：B

63.一患者在人群拥挤时跌倒，遭到踩踏致伤。检查发现头.颈.上胸部点状出血，考虑：（）

- A．皮肤挫伤
- B．肺挫伤
- C．肺爆震伤
- D．创伤性窒息
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：D

64.诊断 X 力性气胸最充分的证据是：（）

- A．呼吸困难伴有严重皮下气肿
- B．伤侧胸部呈高调鼓音
- C．伤侧呼吸音消失
- D．胸膜腔抽出高压气体
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：D

65.关于脓胸下列哪一项是错误的？（）

- A．脓胸多为继发性感染
- B．结核性脓胸多属慢性脓胸
- C．脓胸的病程分早.中.晚三期
- D．脓胸的主要症状是高烧.胸痛
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：C

66.除手术外，上段食管癌最有效的治疗方法是：（）

- A．化疗
- B．放疗
- C．免疫治疗
- D．放置食管支架
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：B

67.如食管癌病人的进行性吞咽困难症状突然消失，提示：（）

- A．食管癌穿孔
- B．食管痉挛解除
- C．部分癌肿坏死脱落
- D．食管水肿消退
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：C

68.周围型肺癌最常见的 X 线表现是：()

- A．薄壁空洞
- B．肺野周围孤立性圆形块影
- C．肺叶不 X
- D．肺野周围小片轮廓模糊影
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：B

69.在闭合性气胸时，当肺压缩小于多少时，如无症状，可暂予观察。() A． 40%

- B． 20%
- C． 30%
- D． 15%
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：C

70.下述临床表现哪项诊断肋骨骨折最可靠”()

- A．局部疼痛
- B．损伤部位肿胀
- C．损伤部位间接压痛
- D．听到胸部有骨擦音
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：D

71.结核性脓胸，肺出现结核病变，治疗方法是：()

- A．胸腔穿刺排脓
- B．脓胸纤维板剥脱术
- C．开放引流
- D．闭式引流
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：A

72.食管癌手术食管切除 X 围应在距癌肿：()

- A． 1～2cm
- B． 2～3cm
- C． 3～4cm
- D． 5～8cm (>5cm)
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：D

73.闭合性肋骨骨折，说明肺或支气管有损伤的一项是：()

- A．伤侧肺呼吸音减弱
- B．伤侧肺有啰音
- C．伤侧皮下气肿
- D．透视伤侧胸腔积液
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：C

74.在多发性损伤的急救处理中，应首先处理的紧急情况是：()

- A．X 力性气胸

- B．四肢骨折
- C．肺挫伤
- D．肋骨骨折
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：A

75.胸膜下界在锁骨中线处相交于：（）

- A．第六肋
- B．第八肋
- C．第十肋
- D．第九肋
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：B

76.胸部损伤中对呼吸和循环生理危害最显著的是：（）

- A．开放性气胸
- B．纵隔及皮下气肿
- C．X 力性气胸
- D．闭合性气胸
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：C

77.急性全脓胸闭式引流的最佳部位是：（）

- A．锁骨中线第二肋间
- B．胛线第七肋间
- C．腋前线第六肋间
- D．腋中后线第七或八肋间
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：D

78.早期中央型肺癌诊断率最高的检查方法是：（）

- A．纤维支气管镜检查
- B．纵隔镜检查
- C．转移灶活组织检查
- D．胸水检查
- E．发生于 50 岁以上男性的肺癌

显示答案 正确答案：A

79.Pancoas瘤是指：（）

- A．癌肿位于肺门处
- B．癌肿侵犯喉返神经
- C．癌肿产生某些内分泌物质
- D．癌肿引起肌无力
- E．癌肿位于上叶顶部胸廓入口处

显示答案 正确答案：E

80.贲门失弛缓症在消化道钡餐上的典型征象是：（） 让我再想想！

- A．食管高度扩 X
- B．有液平面
- C．有充盈缺损

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706111143122011030>