

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

实用临床护理三基模拟题与答案

1、道德是由以下哪项因素决定的：（ ）

- A、文化基础
- B、物质基础
- C、经济基础
- D、环境因素

答案：C

2、急性肾衰竭病人接受血液透析治疗时蛋白质摄入量应为：（ ）

- A、0.5g/kg·d
- B、1.0~1.2g/kg·d
- C、1.2~1.3g/kg·d
- D、0.8g/kg·d

答案：B

3、人工喂养的适应证，除外哪项：（ ）

- A、母亲患急、慢性传染病
- B、半乳糖血症的婴儿
- C、严重肝、心脏疾病不宜哺乳
- D、急性乳腺炎

答案：D

4、有关使用血管活性药物的注意事项错误的是：（ ）

- A、使用血管活性药物须用微量输液泵给药
- B、监测生命体征：根据血压、心率等参数的变化，随时调整血管活性药物的滴速
- C、血管活性药物应尽量从周围静脉输入
- D、采用专用通路输入血管活性药物，不要与测量中心静脉压或其他输液、输血在同一条通路

答案：C

5、最简便有效的预防尿路感染的方法是：（ ）

- A、多饮水>2500ml/d，勤排尿
- B、口服抗生素
- C、休息
- D、碱化尿液

答案：A

6、以下皮肤科外用药物剂型的选择，错误的是：（ ）

- A、 急性渗出性皮肤损害选择振荡剂
- B、 亚急性皮肤损害选择油剂或糊剂
- C、 慢性皮肤损害选择软膏
- D、 有皮肤破损以瘙痒为主的选择酊剂

答案：D

7、乙型肝炎的传播途径，正确的是：（ ）

- A、 进食污染的食物
- B、 呼吸道传播
- C、 体液、血液传播
- D、 饮用污染的水

答案：C

8、过氧化氢稀释液应现配现用，常温下使用不宜超过：（ ）

- A、 2 天
- B、 3 天
- C、 7 天
- D、 10 天

答案：A

9、皮肤科封包法换药治疗顽固的肥厚性皮炎，每次封包时间一般不超过：
（ ）

- A、 5 小时
- B、 6 小时
- C、 7 小时
- D、 8 小时

答案：D

10、肿瘤病人出现下列哪种情况应给予保护性隔离：（ ）

- A、 白细胞计数低于 $4.0 \times 10^9/L$
- B、 白细胞计数低于 $3.0 \times 10^9/L$
- C、 白细胞计数低于 $2.0 \times 10^9/L$
- D、 白细胞计数低于 $1.0 \times 10^9/L$

答案：D

11、成人经鼻气管插管的深度为：（ ）

- A、 导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 $27\text{cm}+2\text{cm}$
- B、 导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 $22\text{cm} \pm 2\text{cm}$
- C、 导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 $25\text{cm} \pm 2\text{cm}$
- D、 导管尖端至鼻尖的距离，通常成人为 $29\text{cm} \pm 2\text{cm}$

答案：A

12、护士在制定计划中列出“3 天内病人自觉腹胀症状减轻”，这是：（）

- A、 护理诊断
- B、 护理措施
- C、 护理目标
- D、 护理评价

答案：C

13、人口老龄化是指：（）

- A、 社区团体中老年人增加
- B、 老年人年龄划分新标准。
- C、 老年人口数占总人口数的 10%以上
- D、 社会人口结构中老年人口占总人口的比重不断增加的过程

答案：D

14、孙先生，60 岁。因骨折卧床已 3 周，体质虚弱，近日骶尾部皮肤出现水疱并有破溃，上面附有少量黄色渗出液，护士观察后认为是压疮。该病人的压疮属于哪一期：（）

- A、 淤血红润期
- B、 炎性浸润期
- C、 浅度溃疡期
- D、 坏死溃疡期

答案：C

15、肠瘘非手术治疗期间引流的最佳体位是：（）

- A、 平卧位
- B、 头低足高位
- C、 端坐卧位
- D、 低半卧位

答案：D

16、确定护理诊断时应注意：（）

- A、 护理诊断是关于病人疾病所引起的生理问题
- B、 一个疾病只有一项护理诊断
- C、 一项护理诊断针对一个护理问题
- D、 一项护理诊断说明一种病理改变

答案：C

17、PPD 注射后 72 小时测皮肤硬结直径为 5~9mm，提示结果为：（）

- A、 阴性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706143051200010141>